

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली



3021

क्रम संख्या

काल नं०

खण्ड

२५ १
ज १५

स्वास्थ्य और दीर्घायु

स्वास्थ्य और दीर्घायु

सामान्य रोगों के कारणों और उन की रोक-थाम और चिकित्सा पर सरल व सुबोध भाषा में एक विवरण

लेखक

डॉक्टर ए. सी. सेल्मन, एम.डी.

(भली भाँति पुनरीक्षित और बहुत अधिक परिवर्द्धित)

प्रकाशक

ऑरिएंटल बायर्मेन पब्लिशिंग हाउस,
सोल्जबरी पार्क, पना-१.

शुद्धि-पत्र

हमें खेद है कि इस संस्करण में छापे की कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं। पाठकों से निवेदन है कि वे दिए हुए शुद्ध-रूपों के अनुसार इन भूलों को ठीक कर लें :—

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध रूप जो छपा है	शुद्ध रूप जो होना चाहिये
२५	१ (शीर्षक)	जावन	जीवन
२८	१ (शीर्षक)	झरार	झरौर
३२	१	कूप्रभाव	कूप्रभाव
४४	२४ (शीर्षक)	ह्वास-प्रस्वास	ह्वास-प्रश्वास
५९	१, २, ३.	हीहूडियां, हीहूड	हीहूडियां, हूहूडी
६३	२०	उठायें	उठाइयें *
६७	१३	फंसाए-फंसाए	फंसाए-फंसाए
६८	२	कुल्छें	कुल्छें
७३	६	चताएं	चंताएं
७७	४	मध्यपटल	मध्यपटल
८०	२०.	एक,	'एक'—नहीं होना चाहिये
८०	अन्तिम	विकास	निकास
८६	१८ (शीर्षक)	यांव	यान
९१	३३	महंजी	महंजी
९४	८	मुख्यतः	मुख्यतः
९६	७ अंष्टक में	कृमि	कृमियों
९९	४, ८, ९	पहें, हंकाई	पहें.. हंकाई
१०६	१ (शीर्षक), २	मक्खी, कखी	मक्खी, मक्खी
१०७	२	मक्खियों	मक्खियों
१०८	२५	प्राप्त	प्राप्त
१११	२२, २५ (अन्तिम)	परतु, खान-पीने	परन्तु, खाने-पीने
११२	१५	अट्ठाईस	अट्ठाईस
११५	३२	दीवारों	दीवारों
११६	२६-२७	आर्जरांल	आर्जरांल
१२१	२	पड.	पकड़.
१२३	१	नचें	नीचें
१२५	१४	चाहिए	चाहते
१२८	३	किस-	किसी
१२९	२, २७	आंर, पीत-पत्तन	आंर, पीत-पत्नी
१३१	२२	का	काँ

अथ पृष्ठ ३५१ पर देखिये ।

प्रस्तावना

अपने आधारभूत मौलिक सिद्धान्तों के सर्वथा अपरिवर्तित रहने पर भी वैद्यक शास्त्र सदा अन्वेषण में संलग्न रहता है। सन् १९२४ ई. में "स्वास्थ्य और दीर्घायु" का अंग्रेजी में प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था तब से अंग्रेजी में १८ अन्य संस्करण निकल चुके हैं और यह ग्रंथ दीक्षणी एशिया की बंगला, बर्मी, गुजराती, हिन्दी, कनाड., खासी, लुछाई, मलयालम, मराठी, सिंधली, तामिल, तेलगु, और उर्दू, आदि अनेक भाषाओं में अनुवादित हो चुका है।

यह पुस्तक जैसी प्रथम प्रकाशन के समय थी, अब भी वैसी ही है, परन्तु अन्तरिम काल में 'चिकित्सा शास्त्र' में अनेक नवीन अन्वेषण व आविष्कार हुए तथा पीनीसिलिन और 'सल्फन' नामक औषधियों ने कुछ विशेष बीमारियों तथा संक्रामक रोगों में क्रांति पंदा कर दी।

"स्वास्थ्य और दीर्घायु" के अंग्रेजी के १८ वें संस्करण में औषधि, विटामिन एवं पोषक तत्वों संबंधी उन नवीनतम अन्वेषणों का समावेश कर दिया गया है जो इस ग्रंथ में वर्णित विशेष रोगों पर लागू होते हैं। वर्तमान चिकित्सा व्यवसाय के साथ समन्वय के लिये कुछ अध्याय पूर्णतः फिर से लिखे गये हैं। इस के अतिरिक्त विवरण व विस्फोट जैसे विषयों पर कुछ खंड जोड़ दिये गये हैं। ये ही सब विशेषताएँ हिन्दी अनुवाद में मिलेंगी।

पूर्ववर्ती संस्करणों द्वारा दीक्षणी एशिया में हजारों परिवारों को आशातीत लाभ हुआ है। अतः प्रस्तुत संस्करण का प्रकाशन इस आशा और विश्वास के साथ किया जा रहा है कि यह हिन्दी-भाषी जनता के हेतु स्वास्थ्य एवं जीवन संबंधी पथ-प्रदर्शक के रूप में बरदान सिद्ध होगा।

"स्वास्थ्य और दीर्घायु" पुस्तक का उद्देश्य डॉक्टर का स्थान लेना नहीं है, बरन् रोगों के लक्षण एवं निदान से परिचित कराते हुए अपने पाठकों को सुयोग्य चिकित्सकों के द्वारा ही इलाज करवाने तथा डॉक्टरों, दवाखानों और अस्पतालों से यथोचित महत्त्व प्रदान करने का परामर्श एवं प्रेरणा देना ही हमारा लक्ष्य है।

—प्रकाशक

प्रथम संस्करण, १,५०० प्रतियां, रोजस्टर्ड सितम्बर १५, १९२८
द्वितीय संस्करण, ६,००० प्रतियां, रोजस्टर्ड जून १७, १९३०
तृतीय संस्करण, ५,००० प्रतियां, रोजस्टर्ड जुलाई २, १९५१
चतुर्थ संस्करण, ४,००० प्रतियां, रोजस्टर्ड अक्टूबर ४, १९५४
पंचम संस्करण, ७,००० प्रतियां, रोजस्टर्ड फरवरी १५, १९६१

ओरिएंटल वाचमैन पब्लिशिंग हाउस,
सॉल्जबरी पार्क, पूना-१.

द्वारा

सर्वाधिकार सुरक्षित

ओरिएंटल वाचमैन पब्लिशिंग हाउस,
सॉल्जबरी पार्क, पूना-१.

से

बी. राजू द्वारा मीढ़ित व प्रकाशित

विषय सूची


अध्याय

पृष्ठ

१. जीवन—हमारी सब से बहुमूल्य सम्पत्ति	२५
२. शरीर की साधारण रचना व व्यवस्था	२८
३. स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा भोजन	३१
४. पाचन-संस्थान	३६
५. दन्त-स्वास्थ्य	४१
६. स्वास्थ्य के लिए श्वास-प्रश्वास	४४
७. परिश्रमण-संस्थान	५०
८. उत्सर्जन-संस्थान	५३
९. हीड्डियाँ और मांस पीशियाँ	५८
१०. चेतना-संस्थान	७१
११. सुनना और देखना	७५
१२. प्रजनन-संस्थान	७९
१३. सुरासार और तम्बाकू	८८
१४. स्वास्थ्यप्रद-भोजन	९४
१५. रोगों के कारण	१०१
१६. आप की छत्र—मक्खनी	१०६
१७. दीर्घायु का रहस्य	१०८
१८. गर्भाधान तथा शिशु-जन्म सम्बन्धी समस्याएँ	१११
१९. परिवार-नियोजन	१२४
२०. छोटें बच्चों की देख-रेख	१३२
२१. घर पर रोगी की सेवा-शुश्रूषा	१४३
२२. बच्चों के रोग	१६५
२३. उचित बाढ.	१७३
२४. सामान्य संक्रामक रोग	१७७
२५. पाचन-संस्थान के रोग	१९६
२६. कृमियों द्वारा फैलने वाले रोग	२०९
२७. हीनान्न रोग (Food Deficiency diseases)	२२२
२८. पशुओं द्वारा फैलने वाले रोग	२२६
२९. नाक और गले के रोग	२३४
३०. फेफड़े के रोग	२३९
३१. गुप्त रोग (मधुन जन्म व्याधियाँ)	२५०
३२. स्त्रियों के रोग	२५३
३३. चर्म-रोग	२५७
३४. आंख और कान	२६४
३५. नासर (कैंसर)	२६९


अध्याय**पृष्ठ**

३६. विविध प्रकार के सामान्य रोग	२७४
३७. विीकरण और विस्फोट	२८१
३८. सूइयां और जीवाणु-विकास-अवरोधक औषधियां (Injections and Antibiotic)	२९१
३९. पोलियो (Polio) या शिशु-पक्षाघात	२९३
४०. आकस्मिक घटनाओं में प्राथमिक सहायता या चिकित्सा	३०१
४१. शरीर रूपी मन्दिर	३३०
परीक्षक: पिछले अध्यायों में अभीष्ट नुसखों का सूचीपत्र	३३३




वक्षःस्थल और उदर-गह्वर के वृहत् यंत्र—प्रथम पारत

०. हृदयावरणा (हृदावरक झिल्ली); १. चालिका ग्रंथि (कंठस्थ पिंड); २. दायां फेफड़ा (फेफुन); ३. बायां फेफड़ा; ४. श्वासपटल (वक्षोदर मध्यस्थ पेशी); ५. यकृत का दाहिना भाग; ६. यकृत का बायां भाग; ७. आमाशुय (जठर); ८. बड़ी आंत का आड. भाग; ९. छोटी आंत (क्षुद्र अंत्र); १० अवग्रहाम स्थलांत्र (बड़ी आंत का द्विवक्र भाग); ११.. २१. मूत्राशय




द्वितीय परत

१. श्वास-नीलका (कंठ-नाल); २. पित्ताशय; ३. उद्दामी बृहदन्त्र (बड़ी आंत का ऊपर की ओर जाना वाला भाग); ४. आप्रपृच्छ; ५. वीर्य बाहक नीलका; ६. अधोगामी बृहदन्त्र (बड़ी आंत का नीचे की ओर जाना वाला भाग); ७. अवग्रहाम स्थलांत्र (बड़ी आंत का द्रुवक भाग); ८. हृदय; ९. यकृत; १०. आम्लाशय (जठर); ११. पाकाशय द्वार; १२. पक्वाशय (ग्रहणी); १३. स्थूल आप्राशय ।




प्रतीय परत

१. महाधमनी की कमान; २. फुफ्फुस-धमनी; ३. फुफ्फुस-रक्त-वाहीनयाँ और छोटी श्वास-वाहीनयाँ; ४. फुफ्फुसावरणा; ५. श्वासपटल (वक्षोदर मध्यस्थ पेशी); ६. प्लीहा और प्लीहा की रक्त वाहीनयाँ; ७. दाएँ वृक्क (मूत्रपिंड) के ऊपर की ग्रंथि; ८. दाहिनी ओर का वृक्क; ९. बाईं ओर का वृक्क; १०. मूत्र-वाहक; ११. क्लोम-ग्रंथि (स्वादुपिंड); १२. मलाशय (गुदा)।




चतुर्थ परत

१. श्वास नालिका; २. दाहिनी ग्रीवा-धमनी; ३. बाईं ग्रीवा-धमनी; ४. महाधमनी की कमान; ५. व.ई. वायु नालिकाएं और छोटी वायु नालिकाओं की धमनी; ६. अन्न-नालिका ७. वृक्क (मूत्रपिंड) के ऊपर की ग्रंथि; ८. वृक्को में के प्याले के आकार के गह्वर; ९. बाईं ओर का वृक्क (मूत्रपिंड); १०. मूत्र-वाहक; ११. वंक्षण-द्वार; १२. यकृत-शिराएं ।




मनुष्य शरीर की मांस-पेशियाँ

१. खरबच्छदा (कनपटी की) पेशी; २. गले की एक चपटी पेशी; ३. कंधे की त्रिकोणी पेशी; ४. उरछादनी (बहुस्थल के ऊपरी भाग में फैली हुई) बृहत् पेशी; ५. बांह के सामने के भाग में कूहनी को मोड़ने वाली द्विशिरस्क पेशी; ६. बांह के ऊपरी भाग की, बांह को प्रसारित करने वाली त्रिशिरस्क पेशी; ७. अग्रबाहुओं की आकृचक पेशियाँ; ८. उदरच्छदा बीहस्था पेशी (उदर की बाहरी तिरछी पेशी); ९. जाघ की बाहरी और की पेशी; १०. पर-पर-चटनेवाली पेशी; ११. सरल आँधी पेशी (यह टाँग फैलाने में सहायक होती है); १२. उर-प्रसारणी बीहस्था (यह घटने को सीधा करने में सहायक होती है); १३. उर-प्रसारणी मध्यस्था पेशी (यह टाँग सीधी करने में सहायक होती है); १४. जघासम्मुखा पेशी (पिंडली की भीतरी हड्डी से सम्बन्ध); १५. चक्षुपट तथा कपाली पेशी; १६. चक्षुपट सीमलक पेशी; १७. चवर्ण पेशी (निचलने जबड़े में होती है और चवाने में सहायक होती है); १८. कंधे की त्रिकोणी पेशी; १९. अक्षक पेशी (सिर को पीछे को और दाए-बाए करने और स्क्न्धास्थि को घूमने में सहायक होती है); २०. हंसली (कटीस्थ); २१. उरछादनी लघु पेशी (उत्तंज स्नायु); २२. बांह के ऊपरी भाग में कूहनी को मोड़ने वाली द्विशिरस्क पेशी; २३. अग्रबाहु की आकृचक पेशियाँ; २४. उदरच्छदा मध्यस्था पेशी; २५. उदरच्छदा सरल पेशी; २६. जाँघ की केन्द्रीभमुख आकृचणी पेशी; २७. उर-प्रसारणी बीहस्था पेशी; २८. पिंडली की पेशी; २९. प्रसारणी अन्तस्था जघा पेशी।




अस्थिपंजर




सिर की खड़ी काट

१. वृहत् मस्तिष्क; २. लघु मस्तिष्क; ३. लम्ब नाडी; ४. स्तम्भना; ५. शीर्षस्थ-
ग्रन्थि; ६. कपाल की हड्डी का खोखला भाग; ७. नासा-गह्वर; ८. कड़ा ताल; ९. अन्न-
नालिका; १०. स्वरयंत्र; ११. बाईं स्वर-रज्जु; १२. श्वास-नालिका।




स्त्री के वीस्त (पेड.) गह्वर के अंग

१. अंत्र: २. गर्भाशय: ३. मूत्राशय: ४. विटपास्थि: ५. मूत्रमार्ग: ६. भगवत्कर (भगनामा): ७. डिम्ब-प्रणाली (रजोवाहक नालिका): ८. बीजाण्डकोश (डिम्बाशय): ९. झालर-दार छोटी नालिकाएँ: १०. प्रिकीस्थ (डिम्बास्थ): ११. गुदास्थि: १२. गर्भाशय जीवा: १३. मलाशय: १४. योनि: १५. मलद्वार।




गर्भिणी

A. मलाशय; B. यकृत; C. पित्ताशय D. योनि ।




पुरुष के वीस्तिगहवर के अंग

१. अंत्र; २. मूत्राशय; ३. विटापीस्थि; ४. लिंघ के स्पंज समान खोखले भाग;
 ५. मूत्रमार्ग; ६. वीर्यपिंड; ७. प्रिक्रीस्थि; ८. गुदास्थि; ९. मलाशय; १०. वीर्य की धौलियां
 (शुक्र प्रीपकार); ११. पारिष-ग्रीय; १२. मलद्वार ।




नेत्र-रचना

१. वृश्चपटल; २. मध्यपटल; ३. रक्त-वाहीनयां; ४. दृष्टि नाडी तन्तु; ५. आँख के ढंले से निकलती हुई महाधिरा; ६. "सिलिजरी" स्नायु (पेंडी); ७. पुतली; ८. कृष्ण-मण्डल ।




कान और उस की हीड्डियां


१. बाह्य कर्ण; २. कर्ण-नीलका; ३. कान का पर्दा; ४. कर्ण-कम्बु (कान का संस्त्राकृत भाग); ५. कम्बु-कर्ण नीलका; ६. नेहाई; ७. रकाब; ८. घन (हर्थाड.१) ।



द्विलिङ्ग-प्रवाह में गले की दशा




तालुङ्ग-प्रवाह में गले की दशा




नेत्र रोग

१. पलकों का प्रदाह अथवा नेत्र-प्रदाह; २. अंजनी या गुहरी; ३. नेत्रच्छद ग्रंथि के बढ़ जाने से आँख के पपोटे में सूजन; ४. क्षुभ्रपटल-प्रदाह (यह रोग संक्रामक है); ५. कर्नीनका (पारदर्शक पर्दे) का फोड़ना; ६. अनपक्ष (नाखून); ७. मोतिया-बिन्दु; ८. कृष्णमण्डल (उपतारा) प्रदाह।




1




2



3




4




5




6



7



8




9




10

चर्म-रोग


१. लाल-ज्वर; २. छोटों माता (खसरा); ३. मोतिया-चंचक; ४. शीतला; ५. बिस्सपिका (भैंसिया दाद); ६. बिम्बिका रोग; ७. जुलपीत्ती (आम-वाल); ८. ज्वर-नाशक "अण्टीपाइरीन" के प्रयोग के कारण त्वचा में निकल आने वाले दाँने; ९. आँप्रक ज्वर (मियादी बुखार); १०. धूप-रोग (शीनाद)।



स्तन, जीह्वा तथा ओंठ में नासूर (कैंसर)



दबाव-बिन्दु,



जीवन - हमारी सब से बहुमूल्य सम्पत्ति

जीवन मनुष्य की सब से बहुमूल्य सम्पत्ति है और उस के बाद स्वास्थ्य का नम्बर आता है। स्वास्थ्य के बिना यदि जीवन की सारी नहीं तो बहुत कुछ उपयोगिता अवश्य जाती रहती है और इस के अतिरिक्त मनुष्य सांसारिक सुख भी नहीं उठा सकता। यदि उस का शरीर स्वस्थ नहीं, तो वह अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर सकता, जिस कार्य में उसे सुख मिलता है वह उसे नहीं कर सकता, जिस भोजन में उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, वह उस का उपयोग नहीं कर सकता।

रोगी मनुष्य स्वयं ही पीडा और कष्ट नहीं भोगता और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, बीत्क घर के एक-दो लोगों को अपना निजी काम त्याग कर उस की देख-भाल में अपना समय बिताना पड़ता है। इस प्रकार वह दूसरों पर भार बन जाता है क्योंकि उन्हें उस की सेवा सुझा करनी पड़ती है और उस के भोजन और कपड़े का प्रबंध करना पड़ता है।

रोगी दूसरों के लिये भय का कारण

इन सब बातों के अतिरिक्त रोगी अपने अडांस-पडांस के लोगों के लिये भी एक प्रकार के भय का कारण बन जाता है क्योंकि बहुत से रोग आसानी से एक दूसरे को लग जाते हैं। बहुधा ऐसा देखने में आता है कि परिवार के एक सदस्य के रोगी होने के पश्चात्, दूसरे सदस्यों को भी यह रोग लग जाता है और उन्हें चारपाई की शरणा लेनी पड़ती है। अधिकतर वह रोग उस परिवार से दूसरे घरों में भी पहुंच जाता है जिस के परिणाम स्वरूप उस समाज के रोगी व्यक्ति अपना काम भली भाँति नहीं कर सकते जिस से आर्थिक हानि होती है और सब से बड़ी बात तो यह कि कितनी ही जानों का नुकसान भी हो जाता है।

इस के अतिरिक्त जब एक बार स्वास्थ्य गिर जाता है, तो एक ही दिन में फिर पहले जैसा नहीं हो सकता। यह सोचना बड़ी भूल है कि यह रोग साधारण सा है और दवा की कुछ खुराकें खा लेने पर ठीक हो जायगा। बहुत से रोग तो ऐसे होते हैं जिन का निवारण करने में बहुत समय और धन लग जाता है। इस दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का महत्व जानना चाहिए।

प्रत्येक मनुष्य का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने शरीर का ध्यान रखे और उसे आरोग्य रखे। यह वह कर्तव्य है जो उसे प्रथम अपने लिये, और फिर अपने परिवार, अपने

पड़ोसियों और अपने देश के प्रति पालन करना चाहिये और विशेषकर अपने सृष्टा के लिये तो यह उचित ही है। यह सोचना हमारी भूल है कि रोग देवताओं, भूत-प्रेतों या जलवायु के कारणा जाता है और उसे रोक नहीं जा सकता; और तो और जीना-मरना तक भाग्य के हाथ में नहीं।

बीमार पड़ने का कारण

स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करने के कारणा ही मनुष्य किसी-न-किसी रोगका शिकार रहता है। परन्तु स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर के और शरीर की सफाई की और ध्यान देकर उन रोगों में से ८० प्रतिशत रोगों से बचा जा सकता है, जिन से अधिक संख्या में लोग पीड़ित रहते हैं; और सभी के हृदयों में पाई जाने वाली दीर्घायु की इच्छा पूर्ण हो सकती है। इस के विपरीत स्वास्थ्य के नियमों की उपेक्षा करने से आदमी को वे सभी आपत्तियाँ आ घेरती हैं, जिन से सभी लोग भयभीत रहते हैं, और वे आपत्तियाँ हैं—विभिन्न प्रकार के रोग और समय से पहले मृत्यु !

शरीर की ओर कम ध्यान दिया जाता है

साधारणतः जब तक लोग स्वस्थ रहते हैं, तब तक अपने शरीर की रक्षा की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं, परन्तु जब वे रोगी और दुर्बल हो जाते हैं और मृत्यु उन के निकट आ जाती है, तब उन्हें अपने शरीर की रक्षा की पड़ती है, परन्तु तब पानी नसर से ऊँचा हो चुकता है। यह वही बात हुई कि जब चोर चोरी कर गया, तब द्वार बन्द करने का ध्यान आया। शरीर की रक्षा करने का समय होता है युवावस्था। यह कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिये कि बच्चा हृष्ट-पुष्ट हो यह आवश्यक है कि उस के उत्पन्न होने से पूर्व ही उस का ध्यान रखा जाए। माता-पिता को अपने स्वास्थ्य पर यथोचित ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि निर्वल और रोगी माता-पिता के बच्चे भी हृष्ट-पुष्ट और बलवान् नहीं हो सकते।

शायद इस पुस्तक के पाठक युवावस्था के हों। कदाचित् उन में से बहुत से व्यक्तियों के शरीर दुर्बल हों और कुछ रोग-ग्रस्त भी हों। इस दशा में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इस पुस्तक के पाठक स्वास्थ्य के नियमों को पढ़ कर न केवल स्वस्थ शरीर का ध्यान रखना सीखें, बल्कि यह भी जान लें कि रोग ग्रस्त शरीर को किस प्रकार पुनः स्वस्थ बनाया जा सकता है। इस पुस्तक का उद्देश्य यह है कि पाठक को इतनी जानकारी हो जाए कि वह रोग को दूर रख सके और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। इस पुस्तक के अध्ययन से इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जो व्यक्ति स्वयं चिकित्सक न हो वह भी रोगों की चिकित्सा कर सके। निस्सन्देह श्रम्य जैसे रोग में तो किसी चतुर डॉक्टर को बुलाना आवश्यक ही है क्योंकि कोई भी पुस्तक अनुभवी डॉक्टर का स्थान नहीं ले सकती।

रोग के कारण

बहुत से लोग अज्ञानता के कारणा यह सोचते हैं कि रोग देवयोग से होता है। परन्तु डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि रोग कुछ मुख्य कारणों के फलस्वरूप

होते हैं। कुछ रोग यथोचित और विधीवत् भोजन न मिलने से हो जाते हैं, और बेरीबेरी (beri beri) उन्हीं में से एक है। बहुत से रोग शरीर में विष फैल जाने से हो जाते हैं। यह बहुधा उन लोगों को होता है जो विद्यासलाह बनाने के कारखानों में काम करते हैं। मलत आदतों द्वारा भी रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे अपरिध्य आहार से अजीर्ण का रोग हो जाता है। उपरोक्त कारण संसार के दशोच्च रोगों तक ही सीमित हैं, शेष के ९ अंशों का कारण रोग-उत्पादक कीड़े, होते हैं।

मनुष्य के सब से बड़े, छत्र

रोग उत्पन्न करने वाले कीड़े, मनुष्य के सब से बड़े, छत्र हैं। प्रतिदिन ये लाखों मनुष्यों की हत्या करते हैं। इन कीड़ों से सदी-जुकाम, तपीदक (क्षय रोग), निर्मोचन्या, दस्त, पीचछ, मोतीझरा, (मियादी बुखार; आंत्रिक ज्वर) हैजा, हनुन्तभ, काली खांसी, मलेरिया, क्रेट., मिल्टी वाली महामरी (प्लेग) और बहुत से अन्य रोग होते हैं। इस सूची को पढ़, कर मालूम होगा कि संसार में बहुत सी मर्तों रोगों के इन कीटाणुओं से होती हैं।

रोगों के कीटाणु दो प्रकार के होते हैं। एक वनस्पति से और दूसरे चतुष्पदों से उत्पन्न होते हैं। रोगों के ये कीटाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई नहीं देते। बहुत से कीटाणु तो इतने छोटे होते हैं कि सूक्ष्मदर्शक-यंत्र (स्पर्दबीन) में उन का आकार सहस्रगुना बड़ा करने पर भी वे राई के दाने के बराबर दिखाई देते हैं।

रोग के कीटाणुओं की वृद्धि बहुत जल्दी होती है। अनुकूल दशा में हजे अथवा मोतीझरा के कीटाणु दस घंटे में दस लाख हो जाते हैं। इतने सूक्ष्म और लाखों की संख्या में होने के कारण ये जीवृत्ता से दूर-दूर तक फैल जाते हैं। ये कीटाणु कुओं के पानी में, नदी और तालाबों में, सड़कों और मकानों के फर्शों और दीवारों की धूल में, यहाँ तक कि हमारे खाद्य पदार्थों और पीने के पानी में भी पाए जाते हैं। कहा जा सकता है कि घनी बीस्तियों में रोगों के कीड़े, सब ओर पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह सीखना उचित है कि किस प्रकार इन्हें नष्ट किया जाए। इस पुस्तक के अन्य अध्यायों में इन विषयों का वर्णन किया जाएगा।




शरीर की साधारण रचना व व्यवस्था

शरीर के तीन मुख्य भाग हैं, सिर, धड़, ऊपर और नीचे के अंग। धड़ में बड़। खोल (देह गृहा) होता है जिस में प्रायः सब मुख्य इंद्रियां होती हैं। यह खोल ऊपर और नीचे के भागों में एक पतली पटल द्वारा विभाजित है। इस दिवारूया पटल को श्वासपटल या अन्तर्पटल (Diaphragm) कहते हैं। पृष्ठ १६ देखिये। ऊपर का भाग छाती (वक्षःस्थल) कहलाता है। इस में दिल और फेफड़े हैं और इस के पीछे के भाग में श्वासनलीका और अन्ननलीका, आमाशय छोटी और बड़। आंतें और क्लोम-ग्रंथि परस्पर मिल कर काम करते (यकृत), आमाशय, तिल्ली, क्लोम-ग्रंथि, छोटी और बड़। आंतें हैं। इस के बाहर पीछे की ओर गुर्दे (वृक्क) हैं।

शरीर के प्रत्येक अंग का अपना मुख्य प्रकार्य है और प्रत्येक अंग अवयव कहलाता है। कई अवयव मिल कर काम करते हैं। उदाहरणार्थ—भोज-पाचन-क्रिया में मुंह, दांत, अन्ननलीका, आमाशय छोटी और बड़। आंतें और क्लोम-ग्रंथि परस्पर मिल कर काम करते हैं। इन को सामूहिक रूप से पाचन-क्रिया के अवयव कहते हैं। नाक, श्वासनलीका और फेफड़े, मिल कर शरीर में स्वच्छ वायु का प्रवेश कराते हैं और जीवान्तक वायु (कार्बन-डाई-ऑक्साइड) को बाहर निकालते हैं (देखिये अध्याय ६); और इस कारण इन को श्वास-प्रश्वास के अवयव कहते हैं। हृदय या रक्ताशय और सब छोटी-बड़। रक्त-वाहिनीयां परस्पर शरीर में स्थिर पहुंचाने का कार्य करती हैं, इस कारण वे रक्त का दाग कराने वाले (रक्त-परिमरण) के अवयव कहलाती हैं। गुर्दे, त्वचा, फेफड़े, कलेजा और बड़। आंत मिल कर शरीर के मल को दूर करते हैं, और इस कारण उन को सफाई करने वाले (उत्सर्जक) अवयव कहते हैं। मस्तिष्क एवं पीठ का बांसा (मृष्मन्ता) और छोटे-बड़े, तन्तु (चंताएं) शरीर के अन्य अवयवों से काम कराते हैं तथा उन पर नियंत्रण रखते हैं—इन्हीं से मिल कर स्नायु-मंडल (चंता-संस्थान) बनता है। इन अवयवों के अतिरिक्त हीड्रडयां हैं जिन से अस्थिपंजर बना हुआ है और जिन के सहारे शरीर का ढांचा खड़ा रहता है; और पेशियां हैं जो शरीर के दूसरे भागों को चलाती हैं।

यदि शरीर के सब भागों की रक्षा की जाए और उन की सब आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, तो शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा।



शरीर के अंग

१. माथा २. कनपटी ३. कपोल (गाल) ४. जबड़ा ५. गर्दन ६. ठूँड़ ७. श्वास-नीलिका ८. हाथ ९. अंगुली १०. अंगुली ११. बांह (भुजा) १२. कोहनी १३. बगल १४. दाहिनी छाती १५. वक्षःस्थल १६. बाईं छाती १७. बांह २०. उदर २१. यकृत (कलेजा) २२. प्लीहा (तिल्ली) २३. उरुस्थान (Groin) २४. वीर्य प्रदेह २५-२६. क्लेश २७. टांग का ऊपर-वाला भाग या जांघ २८. घुटना २९. पिंडली ३०. गट्टा ३१. पांव ३२. टांग

स्वास्थ्य के छः नियम

शरीर की रक्षा के निमित्त जो बातें आवश्यक हैं और जिन से हमारा स्वास्थ्य बना रह सकता है, उन का सार निम्नलिखित छः नियमों में है:

१. शरीर के लिए उचित भोजन और पानी आवश्यक है।
२. शरीर को अधिक सूर्य-प्रकाश तथा स्वच्छ वायु की आवश्यकता है।
३. शरीर के लिए निरन्तर अपने अन्दर से मल आदि निकालते रहना आवश्यक है।
४. शरीर की रक्षा आवश्यक है जिस से सर्दी या गर्मी का इस पर आक्रमण न हो सके।
५. शरीर के लिये प्रतिदिन उचित व्यायाम और विश्राम आवश्यक है।
६. शरीर को सदा विषले पदार्थों और रोग-उत्पादक कटाणुओं से सुरक्षित रखना आवश्यक है।

इन छः नियमों पर ध्यान देने से रोगों की रोक-थाम होती और दीर्घायु प्राप्त होती है, परन्तु इन में से एक के प्राप्ति भी उदासीन होने से रोग-ग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है।



स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा भोजन



साधारणतः आसित दर्जे के व्यक्त "क्षुधा" शब्द का अर्थ भोजन की इच्छा समझते हैं। वास्तव में क्षुधा स्वाद और गंध संबंधी इन्द्रिय जनित इच्छाओं का संयुक्त रूप है। इस का वास्तविक कारण पूर्वतः नहीं समझा जा सकता और स्वाद की इच्छा की अपेक्षा इस की विस्तृत व्याख्या अधिक कठिन है। भोजन के अभाव से ही भूख एवं क्षुधा का अनुभव होता है। खाद्य पदार्थ के द्वारा इन दोनों प्रकार की इन्द्रिय-जनित इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तन्मये उपभोग से विषय-रस क्षीण हो जाती है परन्तु भूख बनी रहती है। अन्ननाशका से खाद्य पदार्थ गुजरने पर भूख ज्ञात हो जाती है, परन्तु क्षुधा का अस्तित्व फिर भी बना रह सकता है। पेट खाली हो जाने पर भूख पुनर्जीवित हो जाती है, परन्तु वह तुरंत ही एकट नहीं होती। इस प्रकार क्षुधा मुख्यतः स्वाद एवं गंध पर आधारित ज्ञानोन्द्रिय संबंधी समस्या है। जब इस की संतुष्टि हो जाती है तो उत्तेजना लुप्त हो जाती है। इस अंतिम निष्कर्ष का अनेक दृष्टियों से बड़ा व्यावहारिक महत्व है।

१. यदि भोजनके आरम्भमें अत्यंत म्वादिष्ट या मीठी वस्तुओंका प्रयोग किया जाए तो पोषण कार्य के लिये आवश्यक पर्याप्त मात्रा में खाना खा लेने से पूर्व से ही क्षुधा की पूर्णतया निवृत्ति हो सकती है। यह बात बहुधा उन बच्चों में देखी जाती है जो खाना खुरकाने के पूर्व ही भोजनान्तर प्रयोग किए जाने वाले मिष्ठान्न अथवा फल खा लेते हैं।

२. लगातार बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन का प्रयोग करने वाले व्यक्ति भोजन के अधिक स्वास्थ्यप्रद पदार्थों का महत्व नहीं जान पाते और इस प्रकार अधिक पोषक आहार से ही संतुष्ट नहीं हो पाते।

३. कोई भी व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में सामान्यतया अच्छा भोजन कर सकता है और शरीर की आवश्यकतानुसार पर्याप्त परिमाण में पोषक पदार्थ प्राप्त कर लेने के पश्चात् सुस्वाद तथा भूख की उत्तेजित करने वाली वस्तुएं खाने के प्रलोभन में पड़ कर जरूरत से ज्यादा खा लेता है। सामान्य रूप से लोग ऐसा कर बैठते हैं।

४. बहुत चटपटे भोजन से क्षुधा जनित लालसा के समनार्थ उत्तेजक द्रव्यों की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार निस्संदेह अधिक मसालेदार भोजन, मिठाई इत्यादि के प्रयोग तथा मद्यक पेयों में परस्पर निमग्नतात्मक निरन्तर संबंध होता है।

५. साधारणतया मिठाई का बहुत अधिक प्रयोग करने के प्रभाव की ओर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। बच्चे इस का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो लोग मिठाई के अधिक खाँकीन होते हैं उन्हें भोजन में तब तक स्वाद ही नहीं आता जब तक बहुत मीठा न कर लिया जायें। यह आदत बढ़ कर उस सीमा तक पहुँच सकती है जहाँ बच्चा आवश्यक भोजन की परवा ही नहीं करता। इस प्रकार, कभी-कभी लोगों के कथनानुसार उन की "भूख बीचप्र सी" हो जाती है और माता-पिता अपने बच्चों की सामान्य भोज्य पदार्थों के प्रति रुचि या अरुचि का कारण नहीं समझ पाते।

रूग्णावस्था में तथा रोगों की रोकथाम की दृष्टि से भोजन का उचित समन्वय एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भोजन के लिये उचित पदार्थों को एकत्र करने में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन में अम्ल तथा क्षार युक्त वस्तुओं का संतुलित मात्रा में समावेश हो। अम्ल उत्पादक भोज्य पदार्थ वे हैं जो जलाये जाने पर ऐसी राख में परिवर्तित हो जाते हैं जिन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है। ऐसे पदार्थ मांस, अंडे, तथा अनाज आदि हैं। दूसरी ओर क्षार युक्त भोज्य पदार्थ वे हैं जिन की भस्म क्षारीय होती है। इस प्रकट क्षार युक्त पदार्थ अम्ल वाले पदार्थों के विपरीत होते हैं और उचित मात्रा में देने पर एक दूसरे के प्रभाव को व्यर्थ कर देते हैं। क्षारीय पदार्थ शाक-भाजी, फल और दो फांक वाली फलियाँ होती हैं। कुछ खाने की वस्तुएँ ऐसी भी होती हैं जिन में अम्ल अथवा क्षार किसी की भी अधिकता नहीं होती। माँड, चीनी, चर्बी और तेल इसी प्रकार के पदार्थ हैं। संतुलित भोजन के निर्माण में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि उस में क्षार युक्त पदार्थ अम्ल युक्त पदार्थों के बराबर अथवा उस से अधिक हों। हमें ऐसा भोजन चुनने का प्रयत्न करना चाहिये जिस से पाचन मार्ग में यथासंभव जीवाणु-विद्रावण अथवा किण्वीकरण की अधिकता न होने पावे। दैनिक भोजन चुनने में भोजनों की ऐसी साधारण तालिका सहायक हो सकती है, जिस में परिमित मात्रा में दूध भोजन सम्मिलित हो, और खाने समय बहुत अधिक पानी पीने की आवश्यकता न पड़े। हमारा लक्ष्य भोजन को इस प्रकार संयुक्त करना होना चाहिये कि बहुत अधिक किण्वीकरण न्यूनतम हो जाय और पाचन क्रिया अधिक सुगम हो जाय जिस से भोजन एक पदार्थ पाचन-क्रिया में दूसरे के मार्ग में बाधक न हो सके। अच्छे पाचन के लिये भोजन के निम्नीलीखत पदार्थों की संयोजना हितकर होगी:

१. अन्य पदार्थों के साथ अनाज।
२. अन्य भोजन सामग्री के साथ गिरियाँ।
३. अन्य भोज्य पदार्थों के साथ अंडे।
४. अनाज और गिरी के साथ फल।
५. अनाज और कम अम्लीय पदार्थों के साथ दूध।
६. अनाज और गिरियों के साथ शाक-भाजी।

उत्तम पाचन कार्य के लिए निम्नीलीखत भोजन की संयोजना प्रतिकूल होती है।

१. अधिक मात्रा में दूध और चीनी।
२. शुद्ध शाक-भाजी व फल।

३. तीव्र अम्लों के साथ दूध ।
४. पकाये हुये फल तथा दूध और चीनी ।
५. माड. (स्टार्च) के साथ तीव्र अम्ल ।
६. एक बार के भोजन में अनन्क प्रकार के खद्य पदार्थ ।
७. किसी भी प्रकार की असंगत मिलावट ।


इस में संदेह नहीं कि भोजन के साथ उत्तेजक पदार्थों का सेवन, खाने, पीने के संबंध में एक अत्यंत हानिकर आदत है । इस प्रकार के सब से अधिक वर्ज्य उत्पादन मद्यसार तथा कैफीन युक्त पदार्थ हैं । कुछ समय पूर्व मद्यसार को कतिपय मनुष्य भोज्य पदार्थ समझते थे परन्तु इस की निम्नांकित विशेषताएं मद्यसार के भोज्य पदार्थों में वर्गीकरण का अवश्य निबंध करती हैं :

१. इस का स्थानीय संतापक कार्य ।
२. शरीर के तंतु-जाल पर इस का विनाशक प्रभाव ।
३. केन्द्रीय नाडी मंडल (चेता-संस्थान)
४. इस की हानिकर आदत बनाने की प्रवृत्ति ।

इन्हीं कारणों से मद्यसार भोजन में न गिना जा कर विशों में ही गिना जाता है । यह देखा गया है कि मद्यसार से बौद्धिक क्षमता क्षीण हो जाती है, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है और साधारण कार्य करने की योग्यता भी कमजोर पड़ जाती है । वस्तुतः यह स्नायुमंडल को उसी प्रकार संज्ञाहीन कर देता है जैसे 'क्लोरोफॉर्म', 'ईथर' तथा अन्य चेतना हीन करने वाले पदार्थ करते हैं, क्योंकि इस से पेट, रक्त परिरक्षण और हृदय शिथिल हो जाते हैं तथा रोग निरोधक शक्ति सीमित हो जाती है । जीवन बीमा कम्पनियों को ज्ञात हुआ है कि मद्य का सामान्य प्रयोग भी आयु कम कर देता है । एक ही उम्र और परिस्थित के मद्य सेवन न करने वाले लोगों की अपेक्षा साधारण मात्रा में मद्यपान करने वाले के खतरों का आसत ८६% अधिक रक्षित जाता है ।

चाय और कॉफी, कैफीन युक्त पदार्थों के प्रातिनिधि हैं । सामान्यतया तैयार किये हुए कॉफी के एक प्याले में सक्रिय एवं अत्यंत हानिकर उत्तेजक पदार्थ कैफीन, डेट, से तीन ग्रैन तक होती है । चाय के एक प्याले में उसी शक्तिशाली द्रव्य की एक या दो ग्रैन की मात्रा उपस्थित होती है । दवा की एक खुराक में एक से पांच ग्रैन तक कैफीन होती है । चाय या कॉफी के दो तीन प्याले पीने वाले को कैफीन की दवा के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली पूरी खुराक से अधिक मात्रा प्राप्त हो जाती है । इस दवा की बड़ी मात्रा जहर का विषिष्ट प्रतिरूप है । इस के प्रयोग से ऐसी आदत बन जाती है जिस से छटकारा पाना बहुत कठिन होता है । चाय में कैफीन के अतिरिक्त "टैनिनएसिड" नाम का दूसरा हानिकर पदार्थ होता है जो पाचन संस्थान पर बड़ा स्तंभक प्रभाव डालता है । यह स्तंभक कार्य पाचन के लिये अत्यंत हानिकर होता है क्योंकि जिस भाग को भी यह छूता है, उस में रक्त संचार धीमा कर देता है ।

राई, मिर्च, अदरक, मांस के मसाले, लॉग तथा अन्य मसालों का भोजन के रूप में कोई भुक्त नहीं । उन का तो केवल भूख और पाचन को उत्तेजना देने के कारण ही



बल का यह बल वनस्पति की वन है !

घोड़ा बहुत मूल्य समझा जाता है। इन वस्तुओं के उत्तेजक प्रभाव का कारण यह है कि इन में एक ऐसी चरपराहट होती है जो निरिश्चन तौर पर अन्न-मार्ग की इन्फ्लेमिक इन्फ्लेक्सी पर आक्रमक प्रभाव डालती है। इन का भ्रूख पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिस से अधिकता से भिच्च-मसाले प्रयोग करने वाले व्यक्ति की सामान्य स्वास्थ्यप्रद भोजन की ओर रुचि कम हो जाती है। इन पदार्थों से भोजन स्वादिष्ट हो जाने के कारण, अधिक खाना खाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी चरपरी वस्तुओं के भोजन के साथ ग्रहण करने का प्रभाव सदा उत्तेजक ही होता है ऐसा नहीं क्योंकि अनेक बार इन के प्रयोग से खिन्नता ही होती है। बं घोड़े, बहुत विषय युक्त होते हैं, अतः जिगर और गुर्दे के समान शरीर के अन्य उत्सर्जक अवयवों पर अधिक बोझ डाल देते हैं। स्वास्थ्य मनुष्यों के उन की आवश्यकता नहीं और रोगी व्यक्तियों पर उन का आसानी से हानिकर प्रभाव पड़ जाता है। निरोग अथवा रोगी के दैनिक भोजन में इन की कोई भी उपयोगिता नहीं है अतएव स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहने वाले व्यक्तियों के भोजन में उन का स्थान नहीं होना चाहिये।

भोजन के समय पानी, नींबू का अर्क, फलों का रस या अन्य पेय पदार्थों का अधिक प्रयोग पाचन क्रिया में हानिकर प्रभाव डालता है। हाँ, घोड़ा सा द्रव पदार्थ भोजन के साथ ग्रहण करने से कोई हानि नहीं होती बशर्ते कि भोजन नीलका में खड़ा वस्तुओं के प्रवाहित करने की दृष्टि से ग्रहण न किया गया हो। द्रव पदार्थों का अधिक प्रयोग और लार तथा पाचक रस के कार्य को धीमा कर देता है और स्वभावतः भोजन चबाने में भी रुकावट डालता है। अधिक मात्रा में पानी पीने का उचित समय प्रातःकाल अथवा भोजनों के मध्याह्नतर का होता है।

प्रातःकाल और सायंकाल के भोजन के मध्य ५ घंटे का अवकाश आवश्यक है। इस से उदर को दूसरे भोजन से पूर्व पहिले भोजनकी सफाई करने का समय मिल जाता है। कुछ लोगों को दिन में केवल दो बार भोजन करने से पर्याप्त लाभ हो सकता है। यदि दिन में तीन बार भोजन किया जाय तो सायंकाल का भोजन सब से हल्का होना चाहिए। यद्यपि यह वाणिज्य संसार के लोगों की सामान्य आदत के विलकुल विपरीत है, परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य अवश्य है। तीसरे अथवा सायंकाल के भोजन में फलों की तरह हल्के पदार्थ होने चाहिये इस संबंध में एक बार के भोजन करने में कितना समय लगता है यह भी विचारणीय है। काम की अधिकता और दबाव के कारण आसित व्यक्ति को खाना खूब चबा कर खाने में पर्याप्त समय लगा कर उस से अधिकतम लाभ उठाने का अवसर नहीं मिलता। यदि भोजन करने में १० या १५ मिनट की अपेक्षा आध घंटा लगाया जाय तो भोजन के उचित प्रयोग की दिशा में अच्छा परिणाम दिखाई दे और पाचक संबंधी कठिनाइयाँ बहुत कम हो जाएँ।

प्रयोगशाला तथा व्यावहारिक अनुभव से ज्ञात होता है कि जब भोजन करने समय कोई व्यक्ति कार्य के बोझ से दबा हुआ अथवा चिंतित होता है तो उस की पाचन क्रिया में रुकावट पड़ती है। अतः खाने समय काम-धंधे की बातों अथवा दूसरी परेशानियों को दूर रखना चाहिए। भोजन को उत्तम ढंग से पचाने के लिये खाना खाने समय पढ़ना तथा अध्ययन करना भी प्रतिवृत्त होता है। भोजन के लिये प्रसन्नता और चिंता रोहित दृष्टायेँ सर्वोत्तम होती हैं। भोजन परीक्षण के ढंग का भी शरीर द्वारा भोजन के प्रयोग पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। साफ-सुथरे और क्षुधावर्धक ढंग से प्रस्तुत किया गया भोजन भूख को तीव्रतर करता है, और इस प्रकार उत्तेजना प्राप्त कर के पाचन-क्रिया अपना कार्य सुचारु रूप से करती है। दूसरी ओर यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि पाचन का मोस्तक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुधा कहा जाता है कि यदि जीवन स्वच्छ हो तो विचार भी स्वच्छ होने और इस में संदेह नहीं कि मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा करने के लिए अच्छी शारीरिक अवस्था अनिवार्य आवश्यक है।



पाचन-संस्थान



हमारा शरीर नाना प्रकार के पदार्थों के संयोग से रचा गया है। हीड़-हड्डियों में एक प्रकार का पदार्थ है, त्वचा में दूसरे प्रकार का और चंताएँ तीसरे प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। सुषुप्ता या जाग्रत अवस्था में हमारे शरीर के कुछ अवयव निरन्तर गतिशील ही रहते हैं और मशीन के सदा चलने वाले पुर्जों की भाँति ये भी घिसते रहते हैं। इस न्यूनता और खर्च को पूरा करने के लिये पदार्थों की आवश्यकता होती है और यह कमी भोजन से पूरी हो जाती है। हम जो भोजन करते हैं उस से हमारे शरीर को नई शक्ति मिलती है जिस से हमारा हृदय धड़कता है, हाथ-पैर हिलते हैं और प्रत्येक अवयव अपना नियत कार्य करता है। चहरे गर्मी हो या सदी, हमारा शरीर सदा गर्म रहता है। हमारे शरीर को गर्म रखने वाली यह शक्ति भी भोजन से मिलती है। इस से यह पता चलता है कि जो भोजन हम करते हैं वह दो मुख्य कार्य करता है: पहले यह इंजन के ईंधन के समान हमारे शरीर को ऊष्णता और ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरे शरीर को यथोचित दशा में रखने और बढने में पदार्थों को जुटाता है।


भोजन का पचना आवश्यक है।

ऊष्णता, ऊर्जा या शरीर के विकास के लिये सम्प्री जटन के पूर्व भोजन का किया जाना और पचना आवश्यक है। भोजन को पचाने के लिये जो-जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें पाचन-क्रिया कहते हैं जो भोजन को उस पदार्थ में परिवर्तित कर देती है जिस से शरीर को ऊष्णता, ऊर्जा और विकास की शक्ति मिलती और न्यूनता की पूर्ति होती है।

अन्न-मार्ग

शरीर का वह भाग जो भोजन पचाने का काम करता है, अन्न-मार्ग कहलाता है। यह अन्न-मार्ग एक लम्बी सी नालिका है जो मुँह से आरम्भ हो कर बड़ी आंत के अन्त अर्थात् गुदाद्वार तक चली गई है। इस के मध्य का भाग मुँह-मुँह सा रहता है। वयस्क मनुष्य में यह तीस फुट लम्बा होता है। इस अन्न-मार्ग के विभिन्न भागों के नाम इस प्रकार से हैं—मुँह, अन्ननालिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत।

खाना सब से पहले मुँह द्वारा शरीर में जाता है। मुँह में इसे दांतों द्वारा अच्छी तरह से चबाना चाहिए। चबाते समय यह लार में मग्न जाता है जो लारोत्पादक पिंडों की तीन जोड़ियों द्वारा उत्पन्न होता है लार-रस पाचन-क्रिया में सहायता देता है। अतः खाने को जल्दी-जल्दी निगलना नहीं चाहिए, बल्कि चबाने में काफी समय लगाना चाहिए जिस से आमाशय में प्रवेश करने के पूर्व वह पाचन रस में भली भाँति मिल जाय। जब भोजन निगला जाता है तो वह अन्न-नालिका द्वारा आमाशय में जाता है।



सिर के कटे हुए इस भाग में दिखाए गए हैं एक ओर के तीनों लारोत्पादक पिंड (लार-ग्रान्थियां) और उन से सम्बद्ध मुंह में लार लाने वाली नलिकाएँ ।

१. निचले जबड़े की हड्डी मांस निकाल दिया गया है । २. जीभ के नीचे के लारोत्पादक पिंड की नलिका जिस का मुंह, मुंह के निचले भाग में खुलता है । ३. निचले जबड़े की हड्डी । ४. जीभ के नीचे का लारोत्पादक पिंड (ग्रंथि) ५. कान के पास वाला लारोत्पादक पिंड की नलिका जिस का मुंह, ऊपर वाली, पीछले से दूरी, बड़ी दाढ़ के ठीक सामने, कपोल में से मुंह में खुलता है । ६. कान के पास वाला लारोत्पादक पिंड (ग्रंथि) । ७. निचले जबड़े में के लारोत्पादक पिंड की नलिका जिस का मुंह, मुंह के निचले भाग में खुलता है । ८. निचले जबड़े में का लारोत्पादक पिंड (ग्रंथि) ।

आमाशय

आमाशय स्नायुओं की एक पोली रंगी जैसा है और अन्ननलिका के निचले-सिर पर होता है । पृष्ठ १७ पर दिखे हुए चित्र को देखने से उस स्थान और आकार का पता चल जायेगा । बयस्क मनुष्य के आमाशय में डेढ़ से दो सेर तक पानी आदि समा सकता है । आमाशय की भीतरी सतह देखने में मुंह के भीतरी सतह जैसी होती है । यह भीतरी सतह एक प्रकार का रस उत्पन्न करती है जो जठर-रस कहलाता है । यह जठर-

रस एक प्रकार का छटटा अम्ल होता है और मूंह की लार की भाँति पाचन-क्रिया में सहायक होता है और भोजन को शरीर के उपयोग के लिये तैयार करता है।

यदि हम आमाशय की भीतरी सतह का जठर रस-साव देखें, तो वह ठीक वंसा दिखाई देगा जैसा पसीने के समय हमारी त्वचा दिखाई देती है। जिस प्रकार हमारे शरीर की त्वचा पर पसीने के बिन्दु, अन्दर से उभरते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जठर रस के कण सतह पर उभरते हुए जान पड़ते हैं।

आमाशय को अपना काम ठीक तरह से करने के लिये यह आवश्यक है कि भोजन अच्छी तरह पका हुआ हो और चबाया गया हो।

जब कभी किसी तरह की शराब या नष्ट वाली चीज पी जाती है, तो उस से आमाशय के अन्दर के भाग को हानि पहुँचती है। चाय और तम्बाकू पीने से भी आमाशय में बिनाह. पड़ा हो जाता है। लाल मिर्च, अदरक, और पान-सुपारी भी आमाशय के भीतरी भाग को हानि पहुँचाती हैं। यदि काली मिर्च, अदरक, लाल मिर्च आदि कड़े चीज मूंह में रक्खी जाय तो मूंह जलने लगता है, परन्तु हम ऐसी जलन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा मूंह झाल खाने का अभ्यास हो चुका होता है, जैसे लोहार के हाथ गर्म वस्तुओं के पकड़ने के अभ्यस्त होने के कारण कड़े गर्म वस्तु पकड़ने में जलन अनुभव नहीं करते; और फिर इतनी गर्म चीजें मूंह में अधिक देर तक रक्खी भी नहीं जा सकतीं। गर्म मसालों से आमाशय के अन्दर की सतह को मूंह जलने की अपेक्षा अधिक हानि होती है; और आमाशय मूंह की भाँति उन चीजों को जल्दी ही अपने अन्दर से बाहर नहीं निकाल सकता; अब वे चाहे आमाशय में एक घंटा रहें या कई घंटे रहें तब तक वह जलता रहता है। ये मसाले शरीर के लिये तोनक भी लाभदायक नहीं होते। वे केवल हानि पहुँचाते हैं, इस कारण उन्हें कभी नहीं खाना चाहिए।


छोटी आंत

३० मिनट से लेकर कई घंटे तक जब भोजन आमाशय में रह चुकता है, तो इस की अधिक मात्रा छोटी आंत में चली जाती है। भोजन के आमाशय में रहने का यह समय उस के गुण तथा इस बात पर निर्भर होता है कि वह किस प्रकार तैयार किया और चबाया गया है। छोटी आंत बीस फुट लम्बी एक नालिका है जो आमाशय में गुड़ी-गुड़ी रहती है।

एक छोटी नालिका यकृत (कलेज) और पित्ताशय के बीच में स्थिर है जो छोटी आंत के ऊपरी छोर पर स्थित है। पित्त रस, जो कलेज में तैयार होता है वह इस नालिका में से हो कर छोटी आंत में जाता है। यह पित्त रस भोजन को शरीर के लिये पोष्टिकारक बनाने के लिये अत्यंत उपयोगी होता है। एक और छोटी नालिका क्लोम में निकलती है और छोटी आंत के ऊपरी छोर पर स्थित है। जो रस इस क्लोम में बनता है वह इस नालिका द्वारा छोटी आंत में जाता है और भोजन की पाचन-क्रिया में प्रमुख सहायता देता है।

बड़ी आंत

जब तक छोटी आंत का सामान नीचे के छोर पर पहुँच कर बड़ी आंत में प्रवेश करने लगता है, तब तक भोजन का प्रायः सम्पूर्ण पोष्टिकारक भाग शरीर की पोष्ट के लिये रक्त में



अन्न-मार्ग

१. नासा-गह्वर २. तालु ३. मुख-गह्वर (मुख-गुहा) ४. जीभ ५. अन्न नीलिका ६. पित्तशय ७. यकृत (कलेजा) ८. पक्वाशय ९. बड़ी आंत का ऊपर की ओर जाने वाला भाग १०. स्पूल आंत्राशय ११. कीम-सदृश आंत्रपुच्छ १२. कंठ में से खुला हुआ नाक का सिरा १३. कंठ में से खुला हुआ मुख-गह्वर का सिरा १४. कंठ में से खुला हुआ स्वर-यंत्र का सिरा १५. आमोशय १६. तिल्ली १७. क्लोम-ग्रन्थि १८. बड़ी आंत का आठ. भाग १९. बड़ी आंत का नीचे से उतरने वाला भाग २०. छोटी आंत २१. मलाशय

प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत में जो पचा हुआ भाग जाता है वह मुख्यतः अपाच्य पदार्थ होता है। बड़ी आंत में नीचे उतरते समय इस पदार्थ में कड़े परिवर्तन होते हैं। इस में विघटन और मल पदार्थ बनते हैं। प्रति दिन मल का निकल जाना अति आवश्यक है, अन्यथा ये विघटन पदार्थ रक्त में प्रवेश कर के सारे शरीर में फैल जाते हैं जिस से श्वास में दुर्गंध आने लगनी, सिर में पीडा होनी और दूसरे रोग लग जायेंगे। जिन लोगों को कब्ज रहता है उन के मुंह से निकलने वाली दुर्गंध ठीक उस गंदे पदार्थ की दुर्गंध जैसी होती है। इस से यह सिद्ध होता है कि कब्ज वाले व्यक्ति के पेट का साराहीन पदार्थ और मल सम्पूर्ण शरीर में प्रवेश करता है। यह बात सब जानते हैं कि वे दुर्गंध पूर्ण विष कितने हानिकारक होते हैं।

पचने हुए भोजन का अभिशोषण

जब भोजन पूर्ण रूप से पच चुकता है, तो वह पानी के समान तरल बन जाता है। आमाशय और छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाली रक्त वाहिनीयाँ इस तरल को कुछ उसी प्रकार चूस लेती हैं जैसे झक्कर मिला हुआ जल मोटे कपड़े की कड़े तहों को बनी धली में से छनता है।

जब पचा हुआ भोजन रक्त में मिल कर शरीर के प्रत्येक अवयव में पहुँच जाता है, तो फिर ऊर्णता और ऊर्जा उत्पन्न कर के यह वही काम देता है जो इंसान में कोयला। रक्त जब शरीर के अस्वस्थ अवयवों में से छे कर घूमता है, तब पचने हुए भोजन के सार-रस से उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करता है।

इस से पता चलता है कि हमारा शरीर उस भोजन से बना है जो हम करते हैं। अतः स्वस्थ व स्वच्छ शरीर रखने के लिये स्वच्छ व शुद्ध भोजन करना चाहिये। कितने अचरज की बात है कि गेहूँ, चावल और दूसरे पदार्थ जो हम खाते हैं, वे स्नायु, हड्डी और चेतनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। यह स्पष्ट है कि स्वर्ग में जो यीशुमान और सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं उस ने मनुष्य के शरीर की योजना और रचना सोच-समझ कर ही की है; क्योंकि ऐसे सुन्दर और उच्च कौट के ढंग से हमारे शरीर को स्वस्थ, नर्म और शक्तिशाली रखने की योजना संयोग या मनुष्य-बौद्ध की रचना नहीं हो सकती थी।

पानी पीने का महत्व

भोजन का अवीक्षित भाग जब बड़ी आंत में पहुँचता है तब वह प्रायः अर्ध तरल पदार्थ के समान होता है। छोटी आंत उस का सम्पूर्ण सार-रस चूस चुकती है और जब वह इस दशा में होता है कि शरीर से बाहर निकाला जाए क्योंकि जब वह छोटी आंत के काम का नहीं रहता। जब बड़ी आंत भोजन के इस अवीक्षित भाग से पानी के अंश को शोषित कर लेती है। और यह दूब भाग गुदों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का अन्तिम परिणाम यह होता है कि बड़ी आंत का कुछ मल प्रायः दृढ़ हो जाता है। बड़ी आंत का इस मल के आने वाला भाग सिक्कता है और पीछे वाला भाग

चाँड़ा होता है और इस प्रकार वह धीरे-धीरे आग की ओर ढकेल दिया जाता है, यहाँ तक कि वह बड़ी आंत के निचले भाग में पहुँच जाता है, यहाँ पर वह कुछ समय तक रहता है और फिर गदानल में से छे कर मल द्वार से बाहर निकल जाता है।

जब तक शरीर इस साखीन पदार्थ को बाहर निकाल-फेंकने के योग्य नहीं हो जाता, तब तक वह बड़ी आंत में ही रहता है। जो लोग कम पानी पीते हैं, उन के शरीर में यह साखीन पदार्थ बड़ी आंत में पहुँच कर बिलकुल सूख जाता है; अतः बड़ी आंत को अपना काम करने के लिये पर्याप्त जल प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों को कब्ज होने का भय रहता है, अर्थात् मल शरीर में से देर में निकलता है। इस कारण बड़ी आंत के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पानी खूब पीजिये।

અધ્યાય ૬

दन्त-स्वास्थ्य

[illegible]

बच्चा जब छः साल मात्र का हो जाता है, तो उस के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। टाई वर्र की आयु में दूध के पूरे बीस दांत निकल आने चाहियें। जब बच्चा छः साल का हो जाता है, तब उस के पक्के दांत निकलने आरम्भ हो जाते हैं।

छोटे बच्चों के दाँतों का ध्यान रखना चाहिये और उन्हें साफ रखना चाहिये। ये दाँत उन समय तक रहने चाहिये, जब तक कि पक्के दाँत इन का स्थान न लेने लगे।


पक्के दाँत बत्तीस होते हैं। १७ या १८ वर्ष की अवस्था तक पिछली चार दाढ़ें नहीं निकलती। जीवन के अन्त तक इन पक्के दाँतों को मुँह में रहना चाहिए।

दांतों का कार्य

दांतों का काम भोजन को चबाना है अर्थात् उस को सूक्ष्म कणों में पीस कर तार में सात देना है जिस से भोजन पच सके। दांत बोलने में भी सहायता देते हैं क्योंकि जब वे गिर जाते हैं तो कई शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं हो सकता। दांतों का उपयोग यद्यपि आवश्यक है; उन की दृष्टा से स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

दांतों का सङ्गना

सड़नेवाले दांतों में कीटाणु एकत्र हो जाते हैं जिस के कारण देह के अनेक भाग गंभीर रूप से होते हैं। यदि कोई अच्छे स्वास्थ्य की अभिलाषा करे तो वह अपने दांतों को अच्छी दशा में रखे।




दांतों की रचना सम्बन्धी रेखा-चित्र

- A 1. आकाच या दन्तवष्ट (Enamel) 2. दान्तन (Dentine) 3. सीमेंट (Cement)
 4. दन्त अस्थिवष्ट (Dental Periosteum) 5. निचले जबड़े की हड्डी
 6. दन्त-मज्जा-गह्वर B¹ 1. दांत की चोटी 2. दांत की गर्दन 3. दांत की जड़.
 4. दन्त-मज्जा-गह्वर B² दाढ़, C 1. दांत की चोटी जिस पर का कड़, सफेद और
 चमकदार पदार्थ (दन्तवष्ट) घिस गया है। 2. गर्दन 3. जड़. 4. मज्जा-गह्वर

भाोजन के कण दांतों के बीच मसूड़ों या दांतों की सतह के छेदों में अटक जाते हैं। ज्योंही कड़े, मसूड़ों के किनारों में उत्पन्न होने लगते हैं, त्योंही मसूड़े ढीले पड़ने लगते हैं और दांतों के बीच की खाई बढने लगती है, तब कड़े से बहुत उत्तम स्थान मिल जाता है और ये इतनी अधिक संख्या में बहने लगे होते हैं कि बहने पीप भर जाती है। इस दशा में जब कोई बर्तन या ठोड़ी चीज खाई जाती है तो दांत दुखने लगते हैं। अन्त में वे इतने ढीले हो जाते हैं कि किसी काम के नहीं रहते और उन्हें उखड़वाना आवश्यक हो जाता है।

पान-सुपारी खाना मसूड़ों के लिए हानिकारक है। पान के साथ जो चूना खाते हैं उस से मसूड़े, सिकुड़ कर ढीले पड़ जाते हैं, जिस से दांत सड़ने और गिरने लगते हैं। पान और तम्बाकू दांतों की ओम्हा बिगाड़ डालते हैं और मुंह को भद्दा बना देते हैं।

दांतों को सुन्दर बनाए रखने के हेतु अन्न में दूध, ताजे फल, हरी तरकारियां तथा बेहू आदि अनाज के पदार्थ सम्मिलित करने चाहिए।



दांतों की जड़ में पीप पड़ जाना रोग का सामान्य कारण होता है, और जाने चला कर भयंकर-भयंकर रोग पैदा कर देता है ।

दांतों की रक्षा कैसे करें ?

जब कोई दांत खोखला होने लगे तो जल्दी ही दांत के डॉक्टर से उसे भरवा लेना चाहिए जितनी जल्दी यह काम हो सके उतनी ही जल्दी करा लेना चाहिये, क्योंकि छोटे छेद भरवाने में कम खर्च और कम पीडा होती है । जब छोटे छेदा होता है और दांत भरवाया नहीं जाता, तो केवल यही दांत नहीं, बल्कि इधर-उधर के दांत खराब हो जाते हैं । कम से कम दांतों को दो बार ब्रश से साफ करना चाहिये और जब कोई खराबी हो, तो तत्क्षण डॉक्टर से उस का इलाज करा लेना चाहिये । हम के विपरीत यह उचित नहीं कि आदमी दांत की पीडा सहता रहे और अंत में उसे दांत उखड़वाने और नकली दांत लगवाने में पंसा खर्च करना पड़े । नकली दांत असली दांतों के कार्य का केवल एक अंश ही पूरा कर सकते हैं ।

स्वास्थ्य के लिए श्वास-प्रश्वास

मनुष्य कई हफ्तों तक भोजन के बिना और कई दिन तक जल के बिना जीवित रह सकता है, परन्तु यदि वायु का आना-जाना रुक जाये, जैसे डूबते या दम घुटते समय होता है, तो कुछ ही क्षणों में प्राणान्त हो जाए। इस से यह स्पष्ट है कि स्वच्छ वायु का मिलते रहना शरीर के लिये कितना आवश्यक है।

हम श्वास लेते समय अपने फेफड़ों में प्राणवायु (ऑक्सीजन) भरते हैं। प्राणवायु अदृश्य वायु है। जब हवा फेफड़ों में प्रविष्ट होती है, तो उस हवा की प्राणवायु रक्त में मिल जाती है और शरीर के सम्पत्त भागों में फैल जाती है वायु का महत्वपूर्ण भाग प्राणवायु है जिस की आवश्यकता शरीर में जीवन देने और ऊष्णता और ऊर्जा उत्पन्न करने में पड़ती है। जो वायु हम फेफड़ों में खींच कर ले जाते हैं उस में प्राणवायु प्रचुर मात्रा में होती है, परन्तु जो श्वास हम बाहर निकालते हैं उस में प्राणवायु बहुत कम होती है और वह फिर अन्दर ले जाने योग्य नहीं रहती।


जो वायु फेफड़ों में से बाहर निकाली जाती है उस में प्राणवायु की न्यूनता तो होती ही है, साथ-ही-साथ उस में भोजन का विपर्ल अंश भी होता है जो 'दिस्त्राई' नहीं देता। यह बात तो सभी जानते हैं कि यदि बहुत से लॉन किसी कमरे में हों और सब दरवाजे-खिड़कियाँ थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बन्द कर दिए जाएं, तो उन के रक्तन में बाहर से अन्दर आने वाले को तुरन्त दुर्गन्ध आएगी; और उस कमरे में के बहुत से अन्य लोगों के सिर में पीडा होने लगेगी और सिर चक्कराने लगेंगे। दुर्गन्ध, स्मिग्-दुर्गन्ध और सिर का चक्कराना इन सब का एक मात्र कारण है फेफड़ों में से निकली हुई विपर्ल वायु !

अतः घर के प्रत्येक कमरे में एक-एक या अधिक खिड़कियाँ खोली चाहिए। ये खिड़कियाँ इतनी बड़ी हों कि सूरज की रोशनी और ताजी हवा आसानी से अन्दर आ सके। खिड़कियों के सामने न तो कपड़े, टांगे जाएं और न ही पर्दे हों, क्योंकि इन दोनों चीजों से सूर्य प्रकाश और स्वच्छ वायु के प्रवेश में बाधा पड़ती है।

श्वास-प्रश्वास के अवयव

जिस वायु को हम श्वास के साथ अन्दर ले जाते हैं, वह नाक के नथनों से हो कर गल-कोष (कंठ) के पिछले भाग में पहुँचती है और फिर वहाँ से गले के निचले भाग पर से प्रवेश करती है। श्वास-नलिका एक बड़ी नलिका है जो गले के सामने वाले भाग को छूने से मालूम हो सकती है। श्वास नलिका अपने निचले भाग पर दो शाखाओं में विभक्त हो गई है, उस

की एक शाखा दायें फेफड़े में तथा दूसरी बायें फेफड़े में चली जाती है। फेफड़े वायु की असंख्य छोटो-छोटो थैलियों के बने हुए हैं। अगले पृष्ठ के चित्र को देखिये। श्वास लेना वायु की इन थैलियों को भरना और खाली करना है।



नाक और गला


बिंदू-रेखा वाला तीर भोजन-मार्ग दिखा रहा है। सामान्य रेखा वाला तीर वायु-मार्ग दिखा रहा है।

कम्यु-कणी नीलिका का मुँह २, श्वास-मार्ग का पर्दा ३, अन्न-नीलिका
४, श्वास-नीलिका ५, स्वर-यंत्र

श्वास लेना

एक मिनट में प्रायः १६ या १८ बार सांस लेते हैं। प्रत्येक बार श्वास लेते समय हृदय चार बार धड़कता है। व्यायाम करने से और बुखार के समय श्वासन-गति बढ़ जाती है।

प्रत्येक जीवधारी, चाहे वह पशु हो या वनस्पति, श्वास लेता है। बाइबल की "उत्पत्ति" नामक पुस्तक के दूसरे पर्व में जो वृत्तांत मनुष्य की रचना का है वह यह है—"परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से रचा और उस के नयनों में जीवन का श्वास फूंक दिया,



श्वास-प्रश्वास के अवयव

१. स्वर-यंत्र २. श्वास-नालिका ३. बड़ी वायु-नालिका ४. फेफड़ा

बस मनुष्य एक जीता-जागता प्राणी बन गया।" बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर "सब को श्वास और जीवन देता है।" और "प्रत्येक मनुष्य का जीवन" उसी के हाथ में है। स्वर्ग में बंठा हुआ सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हमारे श्वास को अपने अधिकार में रखता है। इस बात का प्रमाण यह है कि जब हम सो जाते हैं, तब भी हमारे फेफड़े, निरन्तर स्वच्छ वायु को भीतर खींचते और विषैली वायु को बाहर निकालते रहते हैं। सोते समय हम बिल्कुल अचेत हो जाते हैं; और यदि हमें अपने श्वास की भी देख-भाल करनी पड़ती, तो नींद आते ही हम मर जाते। श्वास लेना और हृदय का धड़कना दोनों ही अनीच्छक गतियाँ कहलाती हैं। वे दोनों चेंता-संस्थान के एक भाग पर अवलम्बित हैं। परन्तु यह कहना कि श्वास लेना अनीच्छित और स्वचालित गति है इस को स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि हमें इस



बैठने का उचित ढंग



बैठने का अनीचित ढंग

प्रकार का कोई उतर नहीं मिलता कि चेंता-संस्थान का एक भाग हृदय की गति और श्वास को कैसे चलायमान रखता है और वह गतियाँ आरम्भ ही कैसे हुईं। श्वसन-क्रिया के मूल नियंत्रण और अद्भुत अनुकूलन-योग्यता पर ध्यान देने से केवल एक निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य से बाहर और उस से बड़ी कोई ऐसी शक्ति है जो भीतर श्वास पर नियन्त्रण रखती है जिस से मनुष्य जीवित रहता है। वह शक्ति है—ईश्वर। वह परमात्मा जो इतनी दयालुता से हमारी देख-भाल करता है, वही आराधनीय है।

बैठने और खड़े होने का ठीक रीति

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हम सीधे बैठें और सीधे खड़े हों जिस से जब हम श्वास लें तो फेफड़ों को यथोचित रूप से फैलाने के लिये स्थान रहे। इस प्रकार शरीर को स्वच्छ वायु अधिक मात्रा में मिलती रहती है। पीठ को आगे की ओर झुका कर खड़े, खेंना या बंठना स्वरूप ही नहीं दिखाई देता, बरन् फेफड़ों को पूर्ण रूप से फैलने का अवसर



खड़े, खेने का उचित ढंग



खड़े, खेने का अनुचित ढंग

नहीं देता; शरीर पर्याप्त मात्रा में वायु प्राप्त नहीं करता, जिस के परिणाम स्वरूप वह दुर्बल हो जाता है और सर्दी और तपेदिक जैसी बीमारियों का उस पर जल्दी आक्रमण हो जाता है।

घर के अन्दर काम करने वालों, विशेषकर बैठ कर काम करने वालों, को दिन में कई बार सीधे खड़े, खेने की और लम्बी-लम्बी सांसें लेने की आदत डालनी चाहिये जिस से फेफड़ों को स्वच्छ वायु मिले और विषैली जीवाणु वायु (कार्बन डाइऑक्साइड) पूर्ण रूप से बाहर निकल जाय। ठीक तरह से बैठने और खड़े, खेने के चित्रों द्वारा। जीवाणु वायु उस विषैली वायु को कहते हैं जो श्वास से बाहर निकली हुई वायु में होती है।

गलत तरीके से सांस लेना

वायु का स्वाभाविक प्रवेश-मार्ग है नाक। नाक के अन्दर अनगिनत सूक्ष्म बाल होते हैं जो सांस के साथ अन्दर जानेवाली धूल और कीड़ों को रोक लेते हैं। नाक द्वारा अन्दर प्रवेश करत समय वायु गीली और गर्म हो जाती है। जब कोई व्यक्ति मुँह से सांस लेता है, तो गलक्लेप (कंठ) में जाने से पूर्व वह गर्म और गीली नहीं होती जिस से यह गलक्लेप (कंठ) सूख जाता है और अधिक कफ निकलने लगता है; इस से जुकाम और खांसी

छे जाती है। जो बच्चा मुँह से सांस ले, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिस से वह नाक और गले का निरीक्षण करे और यदि गले-ग्रंथियाँ (adenoids) हों तो उन को निकाल डाले। (इन का कारण, इन की रोकथाम, और चिकित्सा २९ वें अध्याय में बताई गई है।)

तम्बाकू और मोदरा से श्वास-प्रश्वास के अवयवों को हानि पहुँचती है

तम्बाकू का धुआँ श्वास-प्रश्वास के अवयवों के प्रत्येक भाग को हानि पहुँचाता है। यह नाक के भीतर की झिल्ली, गले, फेफड़ों और श्वास-नालिका की झिल्ली को फुला देता है। यह फेफड़ों की झिल्ली को इस प्रकार हानि पहुँचाता है कि तर्पीदक फेफड़े में नासूर (कैंसर), और दूसरी बीमारियों के लगने की सम्भावना छे जाती है।

शराब किसी प्रकार की भी क्यों न हो, शरीर को हानि ही पहुँचाती है। जब कोई व्यक्ति मोदरा सेवन करता है, तो पीने के थोड़ी देर पश्चात् उस के मुँह से दुर्गन्ध आने लगती है। इस का कारण यह है कि जब शराब रक्त में प्रवेश करती है और फेफड़ों में जाती है, तो फेफड़े उस विष से जल्दी-जल्दी छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जानते हैं कि शराब पीने वाले निर्माणियाँ और तर्पीदक के बहुत जल्दी शिकार बन जाते हैं; और जब उन को इन में से कोई रोग लग जाता है, तो उन लोगों की अपेक्षा वे बहुत देर में छुटकारा पाते हैं जो शराब नहीं पीते। इस से यह सिद्ध हो जाता है कि शराब से फेफड़ों को हानि पहुँचती है।

सार

१. आप के घर में रात-दिन पूरी-पूरी रीति से वायु का आना जाना रहे।
२. दिन के समय जितनी देर तक छे सके, उतनी देर तक बाहर स्वच्छ वायु में रोहूँ और रात्रि में सोने वाले कमरे की खिड़कियाँ खोल दीजिये जिस से स्वच्छ वायु आनी रहे।
३. श्वास लेते समय प्रत्येक बार फेफड़ों को हवा से पूर्ण रीति से भर लीजिये। ऐसा करने के लिये सीधे बैठना और सीधे खड़े होना चाहिए।
४. धूल से भरी वायु सांस के साथ अन्दर न ले जाइये।
५. तम्बाकू का किसी भी रूप में उपयोग न कीजिये।
६. किसी प्रकार की भी शराब न पीजिये।
७. सदा नाक से सांस लीजिये।
८. कमर को कभी कस कर न बाँधिये।
९. प्रतिदिन कई बार लम्बी-लम्बी सांसें लेने की आदत डालिये।
१०. कभी मुँह ढक कर न सोइये।

परिभ्रमण-संस्थान



जब सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा रक्त की एक बूंद की परीक्षा की जाती है, तब उस में बहुत से छोटे-छोटे गोल लाल कण दिखाई देते हैं जो लाल रक्त कण कहलाते हैं। इस के अतिरिक्त बहुत से छोटे इबेत कण भी रक्त की बूंद में होते हैं और इन को इबेत रक्त कण कहते हैं। जिस प्रकार छोटी-छोटी गोल सी मछलियां जल में तैरा करती हैं, उसी प्रकार ये लाल और इबेत रक्त कण भी रक्त की धारा में तैरते हैं।

पचा हुआ भोजन भी रक्त में मिल जाता है। रक्त प्राणवायु को जो फेफड़ों द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और पचे हुए उस भोजन को जो आमाशय व आंतों द्वारा ठीक किया जाता है शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है और जिस भाग में जो कमी होती है उसे पूरी करता है। यह शरीर के प्रत्येक भाग से हानिकारक पदार्थों को और दूषित वायु को फेफड़ों, गुदों और त्वचा में ले जाता है जहाँ से वे श्वास, मूत्र और पसीने द्वारा बाहर निकाल दिये जाते हैं।


हृदय और रक्त-वाहिनीयां

हृदय के संकुचित होने से रक्त निरंतर रक्त-वाहिनीयां में बहता रहता है। हृदय मनुष्य की बन्द मुट्ठी के बराबर और अन्दर से खोखला होता है। वह एक ऐसे शक्तिशाली पम्प का काम देता है जिस से रक्त शरीर के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाता रहता है।

वयस्क मनुष्य का हृदय एक मिनट में प्रायः ७० बार धड़कता है। व्यायाम से यह और भी जल्दी-जल्दी धड़कने लगता है; और ज्वर होने पर भी इस की गति अधिक बढ़ जाती है।

हृदय द्वारा पम्प हो कर रक्त फेफड़ों में जाता है जहाँ वह स्वच्छ प्राणवायु पाता है और दूषित वायु त्यागता है। स्वच्छ रक्त हृदय को लाट जाता है और फिर वहाँ से शरीर के समस्त भागों को पहुंचाया जाता है। परन्तु जब रक्त हृदय को वापिस आता तब उस में दूषित पदार्थ भरे होते हैं, अतः उस को फेफड़ों में मंजना आवश्यक है। इस प्रकार परिभ्रमण पूर्ण होता है और शरीर में प्राण रहते हैं।

जब कभी शरीर के किसी भाग में जाने से रक्त रोक दिया जाता है तो वह भाग निजीव हो जाता है। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक अंग का जीवित रहना



पौरुषमरा-संस्थान

रक्त अवयवों में पोषक तत्वों को पहुँचाता है और वहाँ से व्यर्थ तत्वों को निकालता है। इस संस्थान के द्वारा ही जीवान्तक वायु (कार्बन डायऑक्साइड) फेफड़ों में से बाहर निकलती है और इस के स्थान पर प्राण-वायु (ऑक्सीजन) अन्दर आती है।

१. फेफ़्स-धमनी (अच्छ रक्त) २. फेफ़्स-शिरा (ख़ूब रक्त) ३. यकृत में होने वाला पौरुषमरा (यकृत द्वारा रक्त-गालन) ४. वृक्क-धमनी (नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थ) ५. वृक्क-शिरा (विशुद्ध रक्त) ६. मुख्य शेषान्त्रक (iliac) धमनी ७. निचला मध्यान्त्र त्वच् (Inferior Mensenteric) ८. महाधमनी ९. अधोजगु धमनी १०. त्रीवा-धमनी

पर ही अवलम्बित है। हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य के रचीयता, परमात्मा ने कहा था “सब प्राणियों का जीवन रक्त ही में है।”

रक्त और हृदय में हम परमात्मा की शक्ति के कितने ही प्रमाण पाते हैं। जब बच्चा माता के गर्भ में ही होता है तभी से हृदय धड़कने लगता है और तब से ८० या ९० वर्ष की आयु तक एक मिनट में ७० बार धड़कता है। हृदय जीवनदायक रक्त खींच कर शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँचाता रहता है। इस के धड़कने की बागदोर हमारे हाथों में नहीं है। वह तो स्वर्ग में परमात्मा है जिस ने मनुष्य को बनाया और जो सदा हृदय को धड़काता रहता है चाहे हम सोते हों या जागते हों।

जब शरीर के किसी भाग को कोई चोट पहुँचती है तो रक्त ही उस को अच्छा करता है। जब रोग उत्पादक कृमि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तब ये रक्ताणु जिन्हें का बर्णन अभी किया जा चुका है निहत्त सिसपियों की भाँति पहरा देते हैं और उन कीड़ों को पकड़ कर नष्ट कर देते हैं। जब रोग के कीड़े अधिक संख्या में और अधिक विषलते होते हैं या शराब, तम्बाकू या किसी और कारण से रक्त कण निर्मल हो जाते हैं, तब ये रक्त कण कीड़ों को नष्ट करने में असमर्थ हो जाते हैं।

चूँकि रक्त में ही जीवन है और वही हमें चंगा करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम में अच्छा रक्त हो। रक्त उस भोजन से बनता है जो हम खाते हैं। यदि भोजन स्वच्छ और अच्छा है तो रक्त भी निर्मल होगा। यदि घटिया प्रकार का हो या आवश्यक मात्रा से कम हो तो रक्त कणों को पर्याप्त आहार नहीं मिलता और इस का परिणाम यह होता है कि शरीर का प्रत्येक भाग दुःख सहता है। बहुत अधिक मात्रा में स्वच्छ जल पीने से रक्त के मूल और विषलते पदार्थ साफ हो जाते हैं। अच्छे रक्त के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है। शराब और तम्बाकू लाल तथा श्वेत दोनों प्रकार के रक्त कणों को हानि पहुँचाते हैं और रक्त की जीवनदायिनी शक्ति और स्वस्थ करने की क्षमता को नष्ट कर डालते हैं।




हर दिन हम भोजन करते हैं और पानी पीते हैं। यह भोजन हमारे शरीर में जलता है और कुछ राख या व्यर्थ पदार्थ छोड़, जाता है जिससे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। शरीर या उस के कुछ अवयव निरन्तर बीतझील रहते हैं और जब कोई वस्तु बीतझील रहती है तो उस का कुछ भाग अवश्य घिसता रहता है जिस से व्यर्थ पदार्थ जमा हो जाया है। इस व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकाल देना चाहिये क्योंकि यदि यह साफ न किया जाए, तो यह पदार्थ विष बन कर शरीर को हानि पहुँचाता है और रोग फैलाता है। व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम वक्कों (गुदा) का है।

वृक्क सेम के आकार के दो अवयव हैं। ये उदर-बह्वर की, पिछली दिवाल में आने की ओर जुड़े हुए हैं—एक सेर, दुँड के एक ओर और दूसरा दूसरी ओर है (पृष्ठ १६ के चित्र को देखिये)। जब वृक्कों में रक्त बहता है, तब वे विपरीत सारहीन पदार्थ के कुछ भाग को छान डालते हैं। जब वृक्कों द्वारा रक्त में से अलग किए सारहीन पदार्थों तथा रक्त में से चूने हुए पानी के यौग से मूत्र बनता है। प्रत्येक वृक्क में से निकलने वाली एक-एक नलिका द्वारा यह मूत्र मूत्राशय में पहुँचता है और वहाँ इकट्ठा होता रहता है यहाँ तक कि जब मूत्राशय पर दबाव पड़ने लगता है, तो हमें पेशाब करने की आवश्यकता होती है और तभी यह बाहर निकाल दिया जाता है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति आध सेर से लेकर डेढ़ सेर तक मूत्र निकालता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है और यथेष्ट मात्रा में जल पीता है, तो मूत्र का रंग हल्के पीले रंग का होना चाहिये; यह था यह पानी के समान साफ होता है। यदि यह लाल या भूरा हो, तो यह बात स्पष्ट होती है कि जल बहुत कम पिया गया।

प्रत्येक उस रंग में जिस में ज्वर रहता है दूध का काम अधिक बढ़ जाता है और यह अत्यावश्यक है कि रंगी को स्वच्छ अल अधिक मात्रा में पीने को दिया जाय। पानी को उस के पास रखना अच्छा है जिस से रंगी बार-बार बिना कष्ट के पी सके।

शराब, तम्बाकू, काली मिर्च, पान-सुपारी अदरक वृक्क के लिये हानिकारक होती हैं। वृक्क का यह भी काम है कि रक्त में जो भी उपरोक्त प्रकार के हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दे। रक्त से यह हानिप्रद पदार्थ निकलते समय वृक्क का भी हानि पहुँचती है।



वृक्क और मूत्राशय


वृक्क दो अवयव हैं जो उदर-गह्वर की पिछली दिवाल में जाने की ओर जुड़े हुए हैं और महाधमनी और निचली महाशिरा द्वारा पृथक हैं। वृक्कों में से मूत्र, मूत्र-वाहकों में ले जाया जाता है।

त्वचा

त्वचा अर्थात् चमड़ी शरीर के उस ऊपरी भाग को कहते हैं जिस से शरीर के भीतर के अंगों की रक्षा होती है। इस की तुलना अस्तर बाल वस्त्र से हो सकती है क्योंकि इस में भी ऊपर दो परतें होती हैं। जब अकस्मात् खोलता हुआ पानी त्वचा पर गिर जाता है तो इन दो परतों के बीच में छाले पड़ जाते हैं।

त्वचा की भीतरी परत में असंख्य छोटी-छोटी पसीने की ग्रन्थियाँ होती हैं। इन में से प्रत्येक में एक नालिका होती है जो त्वचा के ऊपर तक पहुँचती है। पसीना केवल पानी ही नहीं है बल्कि इस में नमक और सारहीन पदार्थ भी मिले रहते हैं जो मूत्र के सारहीन पदार्थों के समान होते हैं।

यदि बुर्दे और त्वचा इन सारहीन पदार्थों को बाहर न निकालें, तो छीघ, ही स्वयमेव बिष फैल जायेगा। शरीर की प्रत्येक ग्रन्थि में से निरन्तर पसीना निकलता रहता है; नमी और व्यायाम से अधिक पसीना निकलता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये थोड़ा बहुत



त्वचा की खड़ी कट


A. स्नेह-ग्रन्थि (बाल की जड़. पर चिकनाई उत्पन्न करने वाली ग्रन्थि) B. त्वचा पर बालों को खड़ा कर देने वाली पेशी C. स्वेद-ग्रन्थि की नालिका D. बाह्य त्वचा E. बाह्य और अन्तरत्वचा के बीच की त्वचा F. अन्तरत्वचा G. बाल की जड़. H. स्वेद-ग्रन्थि J. स्नेह-कोष

व्यायाम करना उचित है जिस से पसीना अच्छी तरह निकले, इस से न केवल त्वचा ही स्वस्थ और सक्रिय रहती है, बल्कि रक्त भी साफ और निर्मल रहता है।

स्वच्छता के लिये गरम पानी और साबुन का उपयोग करना अच्छा है। ठंडे पानी से स्नान करने के पश्चात् तौलिये से शरीर खूब रगड़ कर पोंछने से शरीर को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है और सर्दी तथा दूसरे रोगों की आक्रमण नहीं कर सकते। ठंडे पानी से नहाने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है।

स्वस्थ लोग रोग से बचने के लिए प्रतिदिन स्नान करते हैं। जल्दी-जल्दी नहाने रहने से न केवल त्वचा पर से जमा हुआ मल दूर हो जाता है, बल्कि ऐसे रोग-उत्पादक कीटाणु भी दूर हो जाते हैं जिन का त्वचा पर पता तक नहीं लगता। स्नान द्वारा पसीने के साथ निकला हुआ मल भी दूर हो जाता है।

साथ वाले चित्र में गांव के लोगों के लिए नहाने का एक सरल व साधारण रास्ता बताया है।



फव्वारे के स्नान का घर पर बनाया हुआ साधन

बीमार लोगों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए ताकि बीमारी के समय त्वचा पर जमा हो जाने वाला मल दूर हो जाए। बहुत से बीमार लोग प्रतिदिन स्नान करने से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते हैं। यदि बीमार को ठीक तरह से स्नान कराया जाये तो उसे सदा लवने का क़र नहीं रहता। पानी गरम होना चाहिए। पहले दाहिनी बांह धोइये और उसे पोंछकर ठीक दीजिए फिर बाई बांह धोइये और उसे पोंछकर ठीक दीजिये; इस के बाद छाती के सामने का भाग धोइये और पोंछ कर ठीक दीजिये; इसी प्रकार सारे शरीर को धोइये।

चूंकि त्वचा को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं और चूंकि उस का प्रभाव स्वास्थ्य और व्यक्ति की छविल-सुरत पर बहुत पड़ता है, इसलिए उसे बहुत अच्छी स्थिति में रखना चाहिए। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि त्वचा को ज़रा सा ऊपर से स्वच्छ रखा जाए, अपितु उसे अन्दर भी साफ़ रखना चाहिए, अर्थात् तन्मास और अन्य छानकरक वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि त्वचा को उन्हें बाहर निकल के देने में कष्ट होता है।

बाल और त्वचा की तेल क्रोधियां

प्रत्येक बाल की जड़ में एक छोटी गांठ होती है जिस में से तेल निकलता है। यह त्वचा के ऊपर आ जाता है और उसे सुखने या उस में झुर्रियां पड़ने से रोकता है। यह तेल बालों को भी चिकना करता रहता है। सिर के बालों को चिकना रखने और इन्हें जल्दी-जल्दी बढ़ाने के लिये सब से उत्तम उपाय यह है कि इन्हें प्रति दिन ब्रश से अच्छी तरह झाड़-ा जाए। समय-समय पर इन्हें गरम पानी और साबुन से धो कर इन की धूल और तेल को भी दूर करना चाहिये।

हड्डियाँ और मांस पेशियाँ

५९ पृष्ठ पर दिया चित्र आस्थीपंजर का है। मानव आस्थीपंजर में २०६ हड्डियाँ होती हैं। शिशु की हड्डियाँ बड़ी संख्या में होती हैं और इस कारण इन का विशेष ध्यान रखना चाहिये जिस से वे कुर्बल न हो जायें। यदि पैदा होने के पश्चात् बच्चे को एक ही ओर लिटाये रखा जाए, तो उस का सिर बंदना हो जायगा, अर्थात् एक ओर जाने का उमर जायेगा और दूसरी ओर चपटा हो जाएगा। बच्चे को कुछ घंटों तक एक करबट लिटाए रख कर दूसरी करबट लिटाना चाहिए। स्कूलों में बच्चों के लिये कुर्सियाँ ऐसी होने चाहियें कि उन की पीठ को सहारा मिल सके, और इतनी नीची हों कि चाहियें कि उन के पैर फर्श पर आराम से रह सकें। बहुत से बालकों की कमरें इसीलिए झुकी हुई होती हैं कि पाठशाला की कुर्सियाँ बहुत ऊँची होती हैं और उन में पीठ के सहारे के लिए कुछ नहीं होता।


यदि बच्चे धीरे-धीरे बढ़ें और उन की हीड्डियां छोटी और निबल हों, तो इस का कारण यह होता है कि उन्हें उचित भोजन नहीं मिल रहा है। उन्हें इस प्रकार का भोजन देना चाहिये कि उन की हीड्डियां बनें। गेहूं के बने हुए पदार्थ, मटर, सेम, दाल, साग और इन के साथ दूध विशेष मिला में देना चाहिये।

जिस स्थान पर दो हीड़ियां जोड़, बनाने के लिये आपस में मिलती हैं वहां वे परस्पर पृष्ठ सन्धि बन्धनों द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। कभी-कभी जब ये जोड़, बलपूर्वक हिलाये जाते हैं, तब ये सन्धि बन्धन टूट जाते हैं। इसी को हम मोच कहते हैं।

कमी-कमी हीड्डयां टूट जाती हैं। यदि टूटी हुई हड्डी का ठीक तरह से ध्यान रखा जाय तो वह अपने आप उसी प्रकार जुड़ जायेगी जैसे पंख, काँट टूटी हुई हाल स्वयं जुड़ जाती हैं। अध्याय ४० में मोच और टूटी हड्डी की चिकित्सा बताई गई है।

मांस पीछ्यां


यदि त्वचा और उस के नीचे की चर्बी निकाल दी जाय तो शरीर का आकार वसा ही दिखाई देगा जैसा चित्र में पृष्ठ १३ पर दिखाया गया है। जीवित पेड़ी लाल रंग की होती है। नाय या बकरी की मांसपेड़ी लाल होती है। शरीर में ५०० से कुछ ऊपर पीछियाँ हैं, और ये आकार और परिमाण में विभिन्न हैं। मांसपेड़ी के चित्र को देख कर पता चलता कि इन में से कुछ गोल हैं, कुछ लम्बी हैं, कुछ छंटी हैं, कुछ बड़ी हैं और कुछ नन्हीं-नन्हीं हैं। पीछियाँ अंगों एवं शरीर के दूसरे भागों को गतिशील करती हैं। यह बात नहीं कि जब हम चलते-फिरते हैं तभी पेड़ी को काम करना पड़ता है, बल्कि सीधा खड़ा होते समय भी पेड़ी को निरन्तर संकींचत होना पड़ता है। बहुत से लोग खड़े होते या



शरीर की हड्डियाँ

१. खाँपड़ी २, ३. जबड़े की हड्डियाँ ४. शिराधारस्थ (गर्दन की पहली कशेरुक) और कीलकास्थ (गर्दन की दूसरी कशेरुक) ५. हंसली (जत्र) ६. कंधे की हड्डियाँ ७. ८. ९. पसलियाँ १०. प्रखंडास्थ (बाजू की हड्डि) ११. अग्रबाहू की दोनों अस्थियाँ १२. कूल्हे की हड्डि १३. उंगीलियों की हड्डियाँ १४. घुटने की हड्डि १५. पिछली की पिछली हड्डि १६. टखने (गट्टे) की हड्डि १७. तलबे की हड्डियाँ १८. पाँव के अंगूठे और उंगीलों की हड्डियाँ १९. पिछली की अगली हड्डि २०. जाँघ की हड्डि २१. कलाई की हड्डियाँ २२. अग्रबाहू की भीतर की ओर की हड्डि २३. अग्रबाहू की बाहर की ओर की हड्डि

बैठते समय पीठ की पंखी को ढीला कर देते हैं जिस के परिणाम स्वरूप पीठ में कबड निकल आता है, कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं। यह न केवल मनुष्य को कुरूप बनाता है, बल्कि इस से छाती के पोल की दीवार फेफड़ों को दबाने लगती है जिस से लम्बी सांस लेना कठिन हो जाता है। कुर्सी पर बैठते समय या पढ़ने की मेज पर झुकते समय शरीर को सीधा रखना चाहिये। खड़े होते समय बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिये। गर्दन सीधी रहे और ठूढ़ी उठी रहे। पेट के सामने की दीवार गाल की ओर न निकलने पाए वरन् अन्दर की ओर ही रहनी चाहिये।



कूल्हे की उत्तल-सीध: जांघ की हड्डी
और बीस्त-गह्वर

जांघ की हड्डी बीस्त-गह्वर में अपने
स्थान पर : अस्थि-मज्जा भी दिखाई
गई है।


सीधे बैठने या खड़े होने को जितना महत्व दिया जाए कम है। हम उचित भोजन द्वारा अपना रक्त भले ही स्वच्छ बनाये रखें, परन्तु यदि बलत ढंग से खड़े, रहने या बैठने की आदत पड़ गई, तो रक्त शरीर के सम्पूर्ण भागों में यथोचित रीति से दौरा नहीं कर सकेगा और फिर रोगी हो जाना निश्चित है। माता-पिता और अध्यापक को देखते रहना चाहिये कि बच्चे सीधे बैठें और सीधे ही खड़े हों।

कसरत (व्यायाम) से पीड़ाओं का विकास होता है

शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिये कसरत करना नितान्त आवश्यक है। कसरत करते समय हृदय जल्दी-जल्दी धड़कने लगता है, इस कारण शरीर के प्रत्येक भाग को रक्त पर्याप्त मात्रा में पिलाने लगता है। कसरत करते समय लोग जल्दी-जल्दी श्वास लेते हैं और इस प्रकार और अधिक प्राण-वायु शरीर के प्रत्येक अवयव में पहुँच जाती है। यदि शरीर की पीड़ायाँ कसरत न करें तो भीस्तिष्क भी कमजोर हो जाता है। यदि कोई अच्छी स्मरण शक्ति का इच्छुक हो और ध्यान लगा कर पढ़ना और पढ़ा

हुआ यदि रखना चाहता है, तो उस को शरीर की पेशियों को प्रतिदिन कसरत करवानी चाहिये।

लोहार की बांह भरी-भरी और पुष्ट इसीलिये होती है कि वह निरन्तर उस से काम करता रहता है। पहाड़ी कुलियों की टांगें इस कारण भरी-भरी और शक्तिशाली होती हैं कि वे अधिक चलते फिरते हैं। इस के विपरीत बहुत से छात्रों और व्यापारियों की बांहें, टांगें और सारा शरीर बहुत कमजोर रहता है क्योंकि वे अधिक बैठते हैं और अपनी बांहें और




बांह की पेशियां

झांगों से काम नहीं लेते। बहुत से लोग सोचते हैं कि शिक्षित लोगों के लिये काम करना आवश्यक नहीं है बल्कि केवल कुली वर्ग को ही अपने हाथों से काम करना चाहिये। यह बहुत बड़ी गलती है। शारीरिक परिश्रम करना बड़े गरव की बात है। शारीरिक व्यायाम लड़कियों और स्त्रियों के लिये भी उतना ही आवश्यक है जितना लड़कों और

पुरुषों के लिये । प्रत्येक व्यक्ति को नरम और कमजोर पेशी होने पर दुर्बल आनी चाहिये ।

जब ईश्वर ने मनुष्य के शरीर की रचना की, तो वह जानता था कि शरीर को शक्तिशाली और स्वस्थ रखने में किस-किस चीज की आवश्यकता होगी । अतः शरीर के पोषण के लिये उस ने न केवल भोजन की अवस्था की, बरन् यह धर्म भी रखी कि भोजन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को काम करना और शारीरिक परिश्रम करना आवश्यक है । व्यायाम नाना प्रकार के होते हैं, परन्तु उन में से सर्वोत्तम हैं बागीचा बनाना या बटुई का काम जैसे साधारण कार्य । चलना, दौड़ना, तैरना भी व्यायाम की अच्छी विधियाँ हैं ।



गर्दन और सिर की पेशियाँ

कुछ देर तक अपने पेट-ने-लिखने की मंजों पर चुपचाप बैठे रहने के पश्चात् बच्चों का श्वास-प्रश्वास धीमा पड़ जाता है, और प्रत्येक बार सांस अन्दर ले जाने समय बहुत कम हवा फेफड़ों में जाती है । मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता और बच्चा भली-भाँति पेट-लिख नहीं सकता । इस कारण अध्यापकों को बीच-बीच में बच्चों को छुट्टी दे देनी चाहिये जिस से वे बाहर निकल कर दौड़ें, और खेलें-कूदें । इस प्रकार के खेल और मनोरंजन के अतिरिक्त बच्चों से श्वास-प्रश्वास और अंगों को फैलाने का व्यायाम दोपहर से पूर्व ३ या ४ मिनट तक एक-दो बार और तीसरे पहर को फिर एक-आध बार

करवाना चाहिये । ऐसी कसरतों से हृदय जल्दी-जल्दी धड़कने लगता है और बच्चे जल्दी-जल्दी लम्बी हवासें लेते हैं और इस कारण उन के मीस्तष्क और भी तेजी से काम करने लगते हैं ।

शक्ति बढ़ाने के लिये व्यायाम

प्रत्येक व्यायाम सीधे खड़े रहने की स्थिति से आरम्भ होता है । एड.यां मिली रहें; पंजे जरा-जरा खुले रहें; शरीर कमर पर से सीधा रहे और पांटा आगे की ओर झुका हुआ हो । कंधे सीधे हों, बांहें स्वाभाविक रूप से नीचे लटकती रहें । प्रत्येक क्रिया धीरे-धीरे और ठीक ढंग से की जाय, जल्दी या असावधानी से कोई कसरत न हो । पहले तीन आरम्भिक व्यायाम बहुत साधारण ढंग के हैं ।


पहले अपनी दोनों बांहें उठा कर एक सीध में ले आइये,* फिर, उन्हें सीधा सिर के ऊपर ले जाइये और फिर धीरे-धीरे उन्हें नीचे लाइये । फिर, बांहें ऊपर उठाइये और कोहनीयों को पीछे कर के हाथ कमर पर रख लीजिए और फिर दोनों ओर नीचे कीजिये । इस के बाद, एक बार फिर बांहें को ऊपर उठाइये और फिर कोहनीयों को पीछे कर के नदून के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को छुड़िये । प्रत्येक कसरत को कई बार कीजिये ।

पहला व्यायाम:— दोनों बांहें एक सीध में ऊपर उठाइये, शरीरलियों को ऊपर की ओर कर के बांहें को जितना हो सके पीछे ले जाइये, इस स्थिति में धीरे-धीरे एक से दस तक गिनते हुए, हर गिनती पर, दोनों ओर एक-एक ऐसा पूरा घंटा बनाइये जिस का व्यास लगभग बरह इंच हो; इस व्यायाम में यह आवश्यक है कि बांहें को कड़ा और कंधों को एक सीध में रक्खा जाए । दस तक गिनती समाप्त हो जाने पर उल्टी दिशा में एक-एक कर के, दस बार पहले जैसे घेरे बनाइये । (देखिये चित्र १)

दूसरा व्यायाम:— पहले की भाँति अपनी बांहें को एक सीध में उठाये; फिर लम्बी सांस लेते हुए बांहें को इस प्रकार और ऊपर उठाइये कि पहली स्थिति की लाइन के साथ नई स्थिति की लाइन ४५ डिग्री का कोण बनाए; और एड.यां भी ऊपर उठाइये जिस से आप केवल पंजों के बल पर ही खड़े रह सकें । तब धीरे-धीरे सांस निकालते समय, पहले की ही स्थिति में वापस लाँट आइये; पाँव पूरी तरह धरती पर जमे रहें और बांहें सीधी रहें । इस बात में सावधानी रखिए कि बांहें ४५ डिग्री से अधिक ऊपर न उठें और वापस आते समय पहली स्थिति से नीचे न आएँ । (देखिये चित्र २)

तीसरा व्यायाम:— पहले की तरह बांहें को एक सीध में ऊपर उठाइये और फिर हाथों को नदून के पीछे इस प्रकार रखिये कि अंगुठों के बाद बस्ती उंगलियाँ एक दूसरे को छूती रहें और दोनों कोहनीयों पीछे को अकड़ती रहें । इस स्थिति में धीरे-धीरे शरीर को कमर पर से आगे की ओर जितना हो सके उतना झुकाइये । फिर पहले की भाँति सीधे खड़े हो जाइये

*नोट:— बांहें को एक सीध में लाने या उठाने का तात्पर्य यह है बांहें को इस प्रकार ऊपर उठाना कि ये दोनों ओर सीधी हो कर कंधों की सीध में आ जायें और पृथ्वी के समानांतर रहें । (चित्र १ के अनुसार)




चित्र १ डंडा: इस व्यायाम में पीठ कड़ी रखी जाए और कूल्हे घंसने न पाएं—इस स्थिति में शरीर को इतना नीचे लाइये कि फर्श को छूने लगें, फिर जागे की ओर बलपूर्वक उभरते जाइये यहाँ तक कि बांहें बिल्कुल सीधी हो जाएं ।


चित्र २. इस व्यायाम में पहले फर्श पर चित लेट जाइये और दोनों बांहों को जागे की ओर पूरी तरह सीधा कर लीजिये । इस स्थिति में उदर-पोंछियों को सिकोड़ते हुए कूल्हे के ऊपर बाले शरीर को ऊपर उठाइये और फिर हाट की उंगलियों से पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश कीजिये । पूरे व्यायाम में टांगें सीधी और कड़ी रहें ।



चित्र ३. टांग की पोंछियों का व्यायाम : बांहें सीधी नीचे लटकी रहें । सारा भार बायें पैर पर डाल कर शरीर जागे को कीजिये और दाएं पैर को अपने सामने फर्श पर अच्छी तरह जमा लीजिये । इस के बाद दायें पैर पर सारा भार डाल कर और बायें पैर को जागे जमा कर शरीर को जागे को कीजिये ।



चित्र ४. कंधे का व्यायाम : टांगें चढ़ी कर के खड़े हो जाइयें । फिर कमर पर से शरीर को इस प्रकार आगे को झुकाइयें कि दाहिनी बांह सीधी फर्श की ओर आए और बाईं सीधी ऊपर चली जाए और दोनों बांहें रौंद की हड्डी के साथ समकोण बना लें । कमर झुकी रहे । इस के बाद दाहिनी बांह ऊपर उठा कर और बाईं फर्श की ओर ला कर यह व्यायाम कीजिये ।



चित्र ५. वक्षःस्थल की पीडियों का व्यायाम फर्श पर चित लेंट जाइए । बांहों को वक्षःस्थल के ऊपर सीधा कर लीजिये, और फिर उन्हें फर्श की ओर धीरे-धीरे इस प्रकार नीचे लें जाइयें कि फर्श पर जाकर वे रौंद की हड्डी के साथ समकोण बनाए रखें । बांहों को अलग करते और नीचे लें जाते समय लम्बी सांस लीजिये । फिर बांहों को पहले की स्थिति में धीरे-धीरे लें जाइयें परन्तु इस समय सांस रोके रीखिये ।

और शरीर को पीछे की ओर कीजिए । ऐसा करते समय झटके के साथ आगे पीछे नहीं झुकना चाहिये और जल्दी भी नहीं करनी चाहिए । यह पूर्ण क्रिया (आगे को झुकना, फिर सीधे खड़ा होना और फिर शरीर को पीछे को मोड़ना) पांच बार कीजिए । (देखिये चित्र ३)

पार्श्व व्यायाम:- बांहों को पहले की भाँति एव सीध में उठाइयें । बहईं शरीर को ऊपर उठाइयें फिर, बाईं बांह उठा कर दाहिनी बांह इस प्रकार नीचे को लाइयें कि वह शरीर के पास आ जाए और बाईं बांह सीधी सिर के ऊपर पहुँच जाए । फिर कमर पर से अपना शरीर धीरे-धीरे दोनों ओर इस प्रकार झुकाइयें कि दाहिनी बांह दाहिनी टांग पर से फिसलती हुई घटने या उस से नीचे तक पहुँच जाए और बहईं बांह सिर के ऊपर हवा में अर्धवृत्त

बनाती हुई इस प्रकार झुके कि उंगलियां दाहिने कान को छूने लगें। फिर पहली स्थिति में आ जाइये और फिर दूसरी ओर भी शरीर को उक्त रीति से झुकाइये अर्थात् इस बार बाईं बांह टांग पर से फिसलती हुई घुटने या उस से नीचे तक पहुँच जाए और बाईं बांह सिर के ऊपर हवा में अर्धवृत्त बनाती हुई इस प्रकार झुके कि उंगलियां बायें कान को छूने लगें। इस व्यायाम को पांच बार कीजिए। (देखिये चित्र ४)

पाँचवां व्यायाम:— (अ) बांहें पहले की भाँति एक सीध में ऊपर उठाइये। बायें पैर को दायें पैर से १२ इंच दूर रखिये। मूट्ठियों को धीरे-धीरे छाती की ओर ले जाइये और बांहें को कंधीनियों पर से नीचे को कीजिये। फिर मूट्ठियों को ऊपर उठाते हुए बनलों में ले जाइये, और इस के साथ-ही-साथ सिर को इस प्रकार पीछे को कीजिये कि छत दिखाई देने लगे। सिर को पीछे को करते समय लम्बी सांस लीजिये और जब फिर सिर सीधा करने और बांहें को एक सीध में अर्थात् मूल स्थिति में लाने लगे, तो सांस छोड़ते जाइये। (देखिये चित्र ५)


(ब) फिर बिना आराम किये हथेलियां नीचे कर के बांहें को कंधों पर से सीधा उठाइये, फिर बांहें को नीचे करते हुए कमर पर से शरीर को आगे की ओर झुकाइये (सिर सीधा रहे और आंखें सामने को रहे) यहाँ तक कि शरीर उस स्थिति पर पहुँच जाए जहाँ



चित्र १.



चित्र २.



चित्र ३.




चित्र ४.


से वह और आगे झुक न सके और बांहें दोनों किनारों के पार कर जायें और पीछे की ओर की जितनी ऊपर उठ सकती हों, उठी हुई हों, नीचे जाते समय लम्बी सांस लेनी चाहिए और सीधा होते समय सांस को बाहर निकालना चाहिये। इन (अ) और (ब) व्यायामों को पांच-पांच बार कीजिये। (देखिये चित्र ६)

छठ व्यायामः— दायें पैर को इतना दूर कीजिये कि एंड.यां १२ इंच की दूरी पर हो जायें। बांहों को ऊपर उठा कर एक सीध में लाइयें। सारा भार पंजों पर रख कर घटनों को मोड़िये और खरिर को एंड.यां तक नीचे ले आइयें, परन्तु थक, जितना सीधा रह सके उतना सीधा रखिये। इस व्यायाम को दस बार कीजिये। (देखिये चित्र ७)

सातवां व्यायामः—पहले की भांति बांहों को ऊपर उठा कर एक सीध में लाइयें। फिर उन्हें सिर के ऊपर झुलकल सीधा खड़ा कर लीजिये। इस के बाद दोनों हाथों की उंगलियां आपस में इस प्रकार फंसा लीजिये कि बांहें कननों को छूने लगें। अग्रे उंगलियों को फंसाए-फंसाए हवा में एक ऐसा पूरा वृत्त बनाइयें जिस का व्यास लगभग चौबीस इंच का हो। ध्यान रहे कि इस क्रिया में खरिर केवल कमर पर से ही झुके। इस क्रिया को पांच बार कीजिये। इस के बाद इसी क्रिया को पांच बार उल्टी दिशा में कीजिये।



चित्र ५.



चित्र ६.


इस पूर्ण व्यायाम को धीरे-धीरे, परन्तु ठीक-ठीक, करना चाहिए। शरीर केवल कूल्हों पर से ही चारों ओर घूमे। (देखिये चित्र ८)

आठवां व्यायाम:— (अ) दायां पैर इतनी दूर खिसकाइये कि एगड.यां १२ इंच की दूरी पर हो जाय। बांहों को सीधा उठाइये और शरीर को कूल्हे पर से बाईं ओर घुमाइये, परन्तु बांहें सीधी ही रहें, यत्न तक कि चोहरा बाईं ओर घूम जाय, दाहिं बांह सीधी आगे की ओर रहे और बाईं बांह सीधी पीछे की ओर। (देखिये चित्र ९)

(ब) इसी स्थिति में शरीर को कमर पर से झुकाइये जिस से दाहिं बांह नीचे की ओर जाय यत्न तक कि दायां हाथ की उंगलियां पैरों के बीच के स्थान का स्पर्श कर लें और बाईं बांह ऊपर उठ जाय। दायां घुटना थोड़ा सा मोड़ना चाहिये जिस से होच्छव स्थिति सम्भव हो सके। इस के बाद बायां पैर इतनी दूर खिसकाइये कि एगड.यां १२



चित्र ७.



चित्र ८.


हैंच की दूरी पर हो जाएं। इस बार शरीर को उक्त रीति से दाहिनी ओर घुमाइये जिस से बायां हाथ सामने आजाए और फिर नीचे जा कर उंगलियां पैरों के बीच के स्थान को स्पर्श करने लगें। हर बार मूल स्थिति में आ जाइये अर्थात् शरीर सीधा हो और बांहें ऊपर उठी हुई एक सीध में हों। इस व्यायाम का भली भाँति अभ्यास हो जाने पर (अ) और (ब) दोनों व्यायाम एक ही रीति में हो सकते हैं।

(अ) और (ब) को पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर १० बार कीजिये (देखिये चित्र १०)

नवां व्यायाम:— बांहों को ऊपर उठा कर एक सीध में लाइये। फिर उन्हें ओर उठा कर बिल्कुल सिर के ऊपर ले आइये अब उन्हें आगे की ओर कर के नीचे को लाइये जिस से शरीर कमर पर से आगे को इतना झुके कि बांहें दोनों पहलुओं को पार कर जाएं और जहाँ तक हो सके वहाँ तक पीछे की ओर जा कर ऊपर को चली जाएं। (व्यायाम ५ से सम्बन्धित चित्र ६ देखिये) यदि रहे कि शरीर के आगे को झुकते समय सिर ऊपर को



चित्र ९.



चित्र १०.

और आंखें सामने की रहें। इस के बाद शरीर को बिल्कुल सीधा कर लीजिये और बांहों को सिर के ऊपर ले जाइये। फिर बांहों को नीचे कंधों के बराबर एक सीध में लाइये। इस दशा में हथेलियों को ऊपर कर के बांहों और कंधों को बलपूर्वक पीछे की कीजिये। फिर बांहों को ऊपर की ओर उठाइये और इस क्रिया को फिर आरम्भ कीजिये। इस पूर्ण क्रिया को धीरे-धीरे पांच बार कीजिये। इस व्यायाम में जब शरीर आगे की झुकता है, तो फेफड़ों में से हवा बहर निकाल दीजिये और जब शरीर फिर सीधा होता जाए, तो फेफड़ों में हवा भर लीजिये।

चेता-संस्थान




शरीर में बहुत से अवयव हैं। प्रत्येक अवयव का एक मुख्य कार्य होता है। उदाहरण के लिए—आमाशय का काम भोजन को पचाना है; गर्दे विषले सारहीन पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता देते हैं; त्वचा शरीर में यथोचित नियमित रूप से ऊष्णता का संचालन करती है; तथा हृदय रीधिर का संचार करता है। प्रत्येक अवयव को नियत समय पर अपना-अपना काम करना आवश्यक है और यह भी बहुत आवश्यक है कि सब अवयव एक साथ सामंजस्यपूर्वक काम करें, नहीं तो शरीर को कोई-न-कोई रोग लग जाएगा। चेतो-संस्थान का काम यह है कि शरीर के सब भागों से नियत समय पर, उचित ढंग से और ठीक मात्रा में काम कराए।

मीस्तष्क और सुष्मना

चेतो-संस्थान या नाडी-संस्थान के दो मुख्य भाग हैं—मीस्तष्क और सुष्मना (Spinal Cord)। मीस्तष्क हड्डी के एक बक्स में सुरक्षित रहता है। हड्डी के इस बक्स को खोपड़ी या कर्पर कहते हैं।

सुष्मना वास्तव में मीस्तष्क का ही एक भाग है जो लम्बी रस्सी के समान दूर तक चला गया है। सुष्मना ऊपर से नीचे तक छोटी उंगली जितनी मोटी होती है। यह मीस्तष्क के निचले भाग (मीस्तष्क-पृच्छ) से जुड़ी हुई होती है; और खोपड़ी में से एक बड़े छेद में होकर गुजरती है। सुष्मना एक बड़े ही अद्भुत ढंग से सुरक्षित रहती है। पीठ से लगी हुई चौबीस हीड्डियां ऊपर-तले रक्खी होती हैं। इस समूह को मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड की प्रत्येक हड्डी के बीचों-बीच एक छेद होता है। ये सब छेद इस प्रकार एक-पर-एक आ जाते हैं कि एक लम्बी नीलका-सी बन जाती है। इसी नीलका में हीड्डियों की दीवार द्वारा सुष्मना सुरक्षित रहती है। सुष्मना रीठ में नीचे कमर के पतले भाग तक चली गई है।

मीस्तष्क और सुष्मना में से बहुत सी अत्यन्त सूक्ष्म चेतोएं निकल कर शरीर के समस्त भागों में फैली हुई हैं। इन चेतोओं में से कुछ तो रोश्म के बारीक-से-बारीक



सामान्य चेता-संस्थान

रेखें से भी कटती होती हैं। इन अनौपचारिक चेतनाओं का समस्त शरीर में इस प्रकार जाल-सा फैला हुआ है कि यदि महीन-से-महीन सूई भी शरीर में कहीं चुभाई जाय, तो किसी-न-किसी चेतना में अवश्य ही चुभने की जिस से पीड़ा होती है।

मस्तिष्क और सुषुम्ना के प्रकार

मस्तिष्क सुषुम्ना किसी प्रान्त के उस शासक के समान हैं जो अपनी राजधानी के कार्यालय में बैठे हैं; और शरीर के प्रत्येक भाग में फैली हुई चलाएँ बिजली के उन तारों के समान हैं जो संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए शासक के कार्यालय और राजधानी के विभिन्न मुख्य नगरों को परस्पर मिलाते हैं। जब शासक के कार्यालय में किसी नगर में घोटित घटना का समाचार प्राप्त होता है, तो शासक तत्क्षण उस नगर के अधिकारी को उचित कार्यवाही का आदेश भेजता है।

मस्तिष्क शरीर के अन्य भागों से न केवल संदेश प्राप्त ही करता है, बल्कि उन्हें अपने संदेश भेजता भी रहता है—इसी का संदेश पाकर पीछियाँ अपना कार्य आरम्भ कर देती हैं, और हृदय संदेश के अनुसार कभी तीव्र गति से और कभी मध्यम गति से धड़कता है। यदि हम चलना चाहें, तो मस्तिष्क तुरन्त टांगों की पीछियों को चलाने का आदेश देता है। यदि आँखों ने मस्तिष्क को यह समाचार भेजा कि शरीर के निकट साँप है, तो मस्तिष्क उसी समय पीछियों को यह आदेश भेजता है कि तुरन्त शरीर को वहाँ से हटाओ। यदि उंगली को चेंता मस्तिष्क तथा सुषुम्ना को यह समाचार भेजे कि उंगली किसी गरम वस्तु को छू रही है, तो मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तत्क्षण बांहों की पीछियों को यह आदेश भेजेंगे कि तुरन्त उंगली हटा लो। यदि हमारे शरीर में चेंताएँ न होतीं, तो हमें उंगली जलने का पता भी न चलता और गरम वस्तु पास से हटाने से पूर्व ही हमारी उंगली जल जाती।

मस्तिष्क साँचता है; संबंद्धानाओं का अनुभव करता है; बातों और घटनाओं को याद रखता है; प्रेम और घृणा की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है; तथा इस बात का भी निर्णय करता है कि किसी परिस्थिति विशेष में क्या किया जाए और क्या न किया जाए। यह शरीर के प्रत्येक भाग पर नियंत्रण रखता है। जब मस्तिष्क और शरीर के किसी अन्य भाग को जोड़ने वाली चेंता किसी प्रकार कट कर अलग हो जाती है, या इस में किसी प्रकार की चोट आ जाती है, तो वह भाग सुन्न पड़ जाता है अर्थात् क्रियाहीन हो जाता है और उस में किसी प्रकार की चेतना नहीं रहती। मछियों का या उन व्यक्तियों का जिन्हें गमी-रोग (आतंशक) लग जाता है, कभी-कभी आधा शरीर सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि मछ का विष और गमी-रोग का विष दोनों ही चेंताओं को नष्ट कर देते हैं।

चेता-संस्थान की स्वस्थ-रक्षा

चेता-संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए सारे शरीर को दृष्ट-पृष्ठ और शक्तिशाली होना चाहिए। चेंता-संस्थान (नाडी-संस्थान) को अच्छी दृष्ट में रखने के लिए अच्छ

व शुद्ध भोजन, स्वच्छ वायु, पर्याप्त नींद और उचित मानसिक व शारीरिक न्यायाम बहुत आवश्यक हैं ।

आदतें

जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा, करते-करते उस को करने की आदत बन जाती है । हमें चाहिए कि अपने मन में अच्छी ही बातें और अच्छे ही विचार आने दें, जिस से केवल अच्छी आदतें बनें; क्योंकि बार-बार बुरा कहने और बुरा करने से बुरी आदतें पड़ती हैं । पच्चीस वर्ष की आयु को पहुँचते-पहुँचते हमारी बहुत सी आदतें बन चुकती हैं । अतः यह कितनी महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों और युवकों को उचित शिक्षा दी जाए । उन्हें सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और मानसिक व शारीरिक निर्मलता की सीख देनी चाहिए । इस प्रकार भले आचरण का निर्माण होना । भली बातें सोचने और भले काम करते-करते जब भली आदतें बन चुकती हैं, तो फिर आसानी से रोगों से बचा जा सकता है और दीर्घायु और उपयोगी जीवन की प्राप्ति हो सकती है ।



सुनना और देखना

नेत्र एक आश्चर्यजनक अवयव है। यह जो कुछ भी देखता है, उस की प्रतीमा बना लेता है और दृष्टि-चेताएं ऐसी प्रतीमाओं की सूचना मस्तिष्क को पहुंचा देती हैं। नेत्र इतने कमल अवयव हैं कि आसानी से इनको हानि पहुंच सकती है; इसी कारण खांपड़ों के सामने बाले भाग में दो गड्ढों में सुरक्षित रहते हैं; इस के अतिरिक्त पलकों, बरीनबां और भाँहें बाहर से इन की रक्षा करती हैं।

नेत्रों की रक्षा

बच्चों की आंखों की बहुत अधिक देखभाल होनी चाहिए। (अधिसूचनार्थ अध्याय १८ देखिये)। जब बच्चा सोता है, तो उस के ऊपर मच्छरदानी डाल दीजिये जिस से मक्खियां उस की आंखों पर बैठ कर उन्हें कोई रोव न लगा जाएं। स्कूल के जिस कमरे में बालक पढ़ते-लिखते हैं वहाँ पर अच्छा प्रकाश होना चाहिये। बच्चों के बैठने की कुर्सियां इतनी नीची होनी चाहियें कि उन के पैर फर्श पर टिक सकें। डेस्क या मेज भी इतनी नीची होनी चाहिए कि जब किताब मेज पर रखी हो और बच्चा सीधा बैठे हो, तो दोनों के बीच एक फुट का अन्तर हो। बच्चों की पुस्तकें ऐसी होनी चाहियें कि उन के अक्षर बड़े-बड़े हों और छापा साफ हो। खसरा, झीतला या लाल ज्वर से अच्छा होने के पश्चात् कुछ हफ्तों तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिये क्योंकि इन रोगों से बच्चों की आंखों को हानि पहुंचती है और वे कमजोर हो जाती हैं।

किसी प्रकार की चोट अथवा रोग से आंखों को बचाने के लिए जो कुछ ऊपर कहा जा चुका है, उस के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देना चाहिए:

१. कम प्रकाश वाले स्थान में न तो कभी पढ़ना चाहिए और न ही कढ़ाई जैसा महीन काम करना चाहिये।

२. पढ़ते समय रोशनी आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस प्रकार बैठना चाहिए कि प्रकाश पीछे कंधों के ऊपर से आकर पुस्तक पर पड़े।

३. पढ़ते समय या कोई ऐसा कार्य करते समय जिस में एकाग्र-चित्त होना आवश्यक हो, थोड़ी-थोड़ी देर बाद आंखों को आराम देना चाहिये। थोड़ी देर तक उन्हें या तो बन्द कर लीजिए या खिड़की में से दूर आकाश को, हरे पेड़ों या हरी घास को कुछ मिनटों तक देखते रहना चाहिये।




आंख धोने की प्याली; आंख में दवा डालने की पिचकारी

४. जब धूल या कोई अन्य पदार्थ आंख में पड़ जाय तो आंख को मलना नहीं चाहिए, वरन् आंख को बोरिक एसिड से धोकर उसे बाहर निकालना चाहिए और यदि बोरिक एसिड पास न हो तो उबले हुए साफ पानी का उपयोग किया जा सकता है।

५. तौलिया, साबुन, चिलमची या मुंह पोंछने के कपड़े, जिन का उपयोग दूसरे व्यक्ति करते हैं उन को अपने काम में न लाइये। यदि दूखती हुई आंखों वाले व्यक्ति इन वस्तुओं का प्रयोग कर चुके हैं और आप भी उन्हीं को अपने काम में लाते हैं, तो निश्चय ही रोग आप की आंखों को भी लग जाएगा।

६. धुआं आंखों के लिए हानिकारक होता है। जिस चूल्हे पर खाना पकता हो वहां से यदि धुआं बाहर निकलने के लिए चिमनी बनी हुई न हो, तो सारा घर धुएँ से भर जाता है। जब यही बात दिन भर में तीन-तीन बार होती है, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य की आंखों को हानि पहुँचती है। बहुत धोड़े से खर्च से मामूली चिमनी बन सकती है जो धुएँ को बाहर निकालकर आप की आंखों को दुःख व हानि से बचाएगी।

७. मद्यपान और तम्बाकू के सेवन से बर्चये।



आंख के ढले की रचना


१. कर्नीनका या पारदर्शीपटल (Cornea) २. नेत्रमीण (Lens) ३. उपतारण मण्डल (Ciliary body) ४. पारदर्शीपटल और कृष्ण मण्डल के बीच का स्थान (Posterior Chamber) ५. पारदर्शक नली (Hyaloid Canal) ६. शुभ्रपटल (Sclera) ७. मद्य. पटल (Choroid) ८. नाडी पटल (Retina) ९. धमनी १०. दृष्टि-नाडी तन्तु (Optic Nerve) ११. अंध-बिन्दु (Blind Spot) १२. श्लैष्मिक-झिल्ली (Mucous Membrane) १३. नेत्रमीण का लटकता बंधन (Zonular space) १४. शुभ्रपटल और पारदर्शी पटल के मिलने का स्थान (Sclero-Corneal junction)

कानों की रक्षा

पृष्ठ १९ पर दिए हुए कान के चित्र को ध्यानपूर्वक देखने पर पता चलनेवाला कि कान के तीन भाग हैं—बाह्य का भाग, बीच का भाग, और अन्दर का भाग। बाह्यकर्ण जो सिर के बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, चींने जैसा है और इसी में से हो कर आवाज पहले बीच के भाग (मध्यकर्ण) और फिर अन्दर के भाग (आन्तर-कर्ण) में जाती है। मध्यकर्ण एक छंटी सी नीलका (कम्बु-कर्णी नीलका) द्वारा बले से

मिलता हुआ है। जुकम हो जाने पर जब किसी की नाक और गला कफ से भर जाते हैं, तो बत्तों के अन्दर का आवरण और कम्बु-कर्णी नीलका फूल जाते हैं और यह नीलका बन्द हो जाती है। बहरेपन का एक कारण यह भी होता है।

जब कम्बु-कर्णी नीलका में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तो यह दोष मध्य-कर्ण में भी पहुँच जाता है जब पीप पड़ जाती है और मध्यकर्ण में भर जाती है, तो कान में पीड़ा होने लगती है। इतनी पीप इकट्ठी हो सकती है कि कान के पर्दे पर जोर डालने लगती है और फिर उसे छेद कर बाहर निकलती हुई दिखाई देने लगती है। इस का उपचार अध्याय ३४ में दिया गया है।



इस रेखा-चित्र में कान के बाहर का, बीच का और अन्दर का भाग दिखाया गया है।

१. मध्यकर्ण २. अर्द्ध-गोलाकार नीलयां (Semi-circular Canals) ३. श्रावणी नाड़ी (Auditory Nerve) ४. कर्ण-कम्बु या कान संव्राणित भाग (Cochlea) ५. कान का पर्दा (Drum membrane) ६. कनपटी की हड्डी (कोटी हड्डी) ७. बाह्य कर्ण-नीलका (External Auditory Canal) ८. बाह्य कर्ण (Auricle) ९. छोटी-छोटी हड्डियों की श्रृंखला (Chain of ossicles)

कानों की रक्षा के लिए निम्नलिखित मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिये :

१. कान के मूल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह मूल बहुत ही कड़वा होता है और इस कारण कोई भी कान में प्रवेश नहीं कर सकता; तब, कोई भी कड़वा उड़ता-उड़ता अकस्मात् घुस जाए, तो दूसरी बात है। कान के मूल को कदापि खुरच-खुरच या कुरेद-कुरेद कर नहीं निकालना चाहिये। यदि यह मूल सख्त हो जाए और सुनने में बाधा डालने लगे, तो अध्याय ३४ में बताई हुई रीति से निकालना चाहिये। कानों में जो

बाल उभ आते हैं वे भी थूल और कीड़े। आदि को बाहर रखने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। नाई को इन्हें काटने न दीजिये।

२. यदि कोई छोटा-सा कीड़ा कान में घुस जाए, तो उस को बाहर निकालने का सब से अच्छा उपाय यह है कि तिल के या किसी और साफ मीठे गरम तेल की कुछ बूंदें कान में डाल दीजिये। इस से वह कीड़ा या तो बाहर निकल जाएगा या मर जाएगा, और फिर गरम पानी की पंचकारी द्वारा यह मरा हुआ कीड़ा बाहर निकाला जा सकता है।

३. जोर से नाक साफ न कीजिये। ऐसा करने से जोर पड़ने पर नाक और बल्ले के कृमि कम्पकणी नालिका द्वारा मध्यकर्ण में पहुँच जाते हैं और परिणाम इस का होता है बहरापन।

४. बच्चों के कानों पर कभी भी यप्पड़ आदि न मारिये। इस से कान को क्षति पहुँचती है और कान बहरा भी हो सकता है।

अध्याय १२

प्रजनन-संस्थान



परुष जननीन्द्रियां

प्रजनन तथा यौन-स्वास्थ्य-रक्षा के सिद्धांतों की चर्चा इस पुस्तक में इस कारण की जा रही है कि इन विषयों का ज्ञान न होने से लोग भयंकर-से-भयंकर रोगों के शिकार बन सकते हैं और नाना प्रकार के दुराचारों में फँस सकते हैं।

लड़का जब चौदह-प्रन्दह वर्ष का हो जाता है तो उस के शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं। वह यौवनारम्भ-काल में पदार्पण कर चुकता है। परन्तु इस अवस्था को पहुँचने के बाद ही वह पूर्ण रूप से पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर लेता, क्योंकि तरुणावस्था से पुरुषत्व को पहुँचते-पहुँचते लगभग आठ वर्ष लग जाते हैं; अतः तेइस-चौबीस वर्ष की आयु से पहले नहीं, बल्कि उस के बाद ही पुरुष हो मानसिक व शारीरिक श्रुक्तियाँ उसे विवाह करने और पिता बनने के योग्य बनाती हैं।

पुरुष जननीन्द्रियों की रचना व क्रिया

पुरुष की बाह्य जननीन्द्रियों में शिश्न या लिंग और अंडकोष या वृषण हैं। अंडकोष के अन्दर दो अण्ड या वीर्य-पिंड होते हैं।


शिश्न के आगे का छोर लगभग एक इंच लम्बा और सुपारी के आकार का सा होता है; इसे शिश्नमुण्ड या बोलचाल की भाषा में 'सुपारी' कहते हैं। जो पतली सी त्वचा इस 'सुपारी' को ढके रहती है वह ढोली होती है और आगे-पीछे को खींची जा सकती है। इस त्वचा को शिश्नच्छदा या लिंगावरणीत्वचा या फिर सीधी-सादी भाषा में 'चमड.ी' कहते हैं। यदि चमड.ी आसानी से पीछे को खींची न जा सके और 'सुपारी' पूर्ण रूप से साफ-साफ दिखाई न दे, तो समझ लेना चाहिए कि उस में कोई-न-कोई दोष है; और इस दशा में किसी ह्रींश्रयार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस 'चमड.ी' के नीचे इतने धातु सी जमा हो जाती है, और यदि जल्दी-जल्दी धोई न जाए तो इस में से दुर्गंध आने और खुजली होने लगती है। यह खुजली शिश्न को साफ न रखने के कारण ही पैदा होती है, और लड.कों में प्रायः इसी से हस्त-मंथन की आदत पड़ जाती है।

दोनों अंड त्वचा की एक रथली सी के अन्दर रहते हैं; इस रथली को अण्डकोष या वृषण कहते हैं। अंडों में शुक्रक्रीट पैदा होते हैं। ये शुक्रक्रीट इतने सूक्ष्म होते हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शक यंत्र के दिखाई नहीं दे सकते। वीर्य-स्खलन के समय ये शुक्रक्रीट एक नीलका में से हो कर मूत्राशय में पहुँच जाते हैं और वहाँ से शिश्न में होकर निकल जाते हैं। यही शुक्रक्रीट स्त्री-प्रसंग के समय स्त्री की योनि में एकाग्रित हो जाते हैं। इन में से एक का स्त्री के डिम्ब से संयोग हो जाता है; और तुरन्त ही डिम्ब बढ.ने लगता है और बढ.ते-बढ.ते दो साँ अस्सी दिन में पूर्ण रूप से विकसित शिशु का एक रूप धारण कर लेता है।

वीर्य-स्खलन

मूत्रमार्ग से जुड.ी हुई दो विच्छेप ग्रीधियाँ होती हैं—पूरुष तथा 'कॉपर' ग्रीधियाँ। यावनावस्था आरम्भ होने पर इन ग्रीधियों में—पहली में दीधया रंग का कुछ गाढ.ा-गाढ.ा सा पदार्थ और दूसरी में पानी के रंग का लेस सा*—निरन्तर पैदा होता रहता है। ये दोनों प्रकार के द्रव पदार्थ अण्डकोष, शुक्रनीलका और मूत्रप्रणाली में स्थित अन्य ग्रीधियों के साथ में मिल जाते हैं; और इन्हीं मिश्रित रूप का नाम है वीर्य। अधिक संचित हो जाने पर अविवर्हित और व्यभिचार से बचे हुए युवक का थोडा.बहुत वीर्य आप-से-आप दसवें-पन्द्रहवें दिन स्वत्रालित हो जाता है। इस प्रकार का वीर्य-स्खलन प्रायः निनीद्रित अवस्था में होता है, और हो सकता है कि कामुक स्वप्न में हो। इसे स्वप्न-दोष कहते हैं। इस प्रकार के स्वप्न-दोष कोई अस्वाभाविक दशा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि स्वाभाविक होते हैं और इन से भयभीत नहीं होना चाहिये। समाचार-पत्रों में निकलने उन विज्ञापनों पर जरा भी ध्यान न दीजिये जिन में यह कह कर हराने की कोशिश की गई हो कि इस प्रकार के स्वप्न-दोषों से काम-शक्ति नष्ट हो जाती है, और यह हो जाता है और वह हो

*इन का एक मुख्य कार्य है वीर्य के विकास में सुगमता पैदा करना।



पुरुष-जननीद्वयां

जाता है—ये सब निरी बकवास होती हैं, पैसा कमाने का साधन होता है। परन्तु हम, एक बात है कि यदि स्वयं-दोषों की संख्या बढ़ती जाए और सघरे से उठने पर सिर में पीड़ा

और शरीर में दुर्बल्य अनुभव हो, तो अवश्य ही अस्वाभाविक स्थिति होगी; और इस दशा में किसी अनुभवी चिकित्सक का परामर्श प्राप्त करना चाहिये। स्वाभाविक रूप से स्वप्न-दोष उन्हीं युवकों को होते हैं जिन के मन और शरीर दोनों स्वच्छ रहते हैं, जिन का जीवन पवित्र होता है और जो कामुक पुस्तकें नहीं पढ़ते, अश्लील चित्र नहीं देखते और कामोद्दीपक विचार मन में नहीं रखते। परन्तु हस्त-मंथन की बुरी आदत और अश्लील पुस्तकों के अध्ययन से ऐसे "स्वप्न-दोष" होते हैं जिन से शरीर में दुर्बलता आती जाती है और आगे चल कर बड़ी हानि पहुँचती है।

संयम

विवाहित युवक के लिए संयम का अर्थ यह होता है कि वह स्त्री-प्रसंग से दूर रहे। विवाहित युवक के लिए संयम का अर्थ यह होता है कि वह अपनी काम-वासना के बन्ध में न रहे, बल्कि उस को परिमित रखे। प्रत्येक युवक को संयमी जीवन व्यतीत करना चाहिये। विवाह से पूर्व कभी-कभी प्रत्येक स्वस्थ युवक को काम-वासना बहुत ही प्रबल हो उठती है, परन्तु यदि वह स्वस्थ और शक्तिशाली रहना चाहता हो, यदि जीवन में उपयोगी बनने और प्रसन्न रहने की इच्छा रखता हो, यदि सुयोग्य पत्नी और स्वस्थ बच्चों की लालसा करता हो, तो उसे संयमी रहना चाहिये। ऐसा करने के लिए आत्म-संयम की आवश्यकता होती है, अपनी इन्द्रियों को बन्ध में रखना पड़ता है। बहुत से युवक अपनी काम-वृत्तियों के वशीभूत होकर हस्त-मंथन या स्त्रियों के साथ अननुमत् सहवास करने लगते हैं। इन दोनों दुर्कर्मों में से कोई सा ही क्यों न हो, आदमी नीति-पथ से गिर जाता है, अपना आचरण भ्रष्ट कर लेता है !

हस्त-मंथन

हस्त-मंथन (अपनी शक्ति को स्वयं नष्ट करना) बड़ी ही बन्दी और विनाशकारी आदत है। जब बालक छोटा ही होता है तभी से यह लत पकड़ लेता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों की देख-रेख करने वाला नाइस्त बच्चों को बहलाने के लिए उस के लिंग को पकड़ता और सहलाता है। बाद में बच्चा स्वयं ही अपने शरीर के इस भाग को पकड़ने लगता है और इस प्रकार हस्त-मंथन सीख जाता है। बच्चों की टांगें चीर कर उसे कूल्हे पर बैठाए रखने से उस के लिंग में निरन्तर रगड़ लगती रहती है, उस में जलन पैदा हो जाती है जिस का फल यह होता है कि बच्चा अपने लिंग को पकड़ता है और फिर धीरे-धीरे हस्त-मंथन करने लगता है। प्रायः बच्चों पाठशाला में अपने साथियों से यह बुरी आदत सीख लेते हैं। बहुधा ऐसा भी होता है कि बच्चों के लिंग के आगे की चमड़ी बहुत लम्बी और लंग होती है, इस से लिंग के सिरे पर खूजली या जलन होने लगती है। बालक लिंग को पकड़ता है और हस्त-मंथन सीख जाता है। इसलिए जब कभी लड़का अपने लिंग अथवा उस के निकटवर्ती स्थान को मले या खजाए, तो

बह अच्छा होगा कि किसी अच्छे डॉक्टर से उस 'बचपन' को कटवा दिया जाए। बचपन के बाद युवावस्था में भी जब किसी युवक की हस्त-मंथन की लत नहीं छूटती, तो वह नीतिक रूप से पीतल हो जाता है; उस में आत्म-सम्मान नहीं रहता, और फिर जब तक वह अपनी गलती पर न पछताए और इस बुरी लत को छोड़ न दे, तब तक वह उपयोगी नहीं बन सकता। बचपन में ही इस आदत को रोकने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

व्याभिचार

अननुमत सहवास बहुत ही नीच, घृणित और हानिकारक कार्य है। सब से पहले तो यह एक अत्यंत गम्भीर नीतिक अपराध है। इस से स्त्री-पुरुष दोनों ही अपना आचरण छुट कर लेते हैं और पशुता के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं। अननुमत सहवास एक इतना भारी अपराध है कि इस का दण्ड भी कड़े-से-कड़ा होना चाहिए; और सच पूछिये तो व्याभिचारी व्यक्ति को जो गुप्त रोग प्रायः लग जाते हैं, उन को इस दण्ड का एक बड़ा ही समझना चाहिये। एक ही बार के अननुमत सहवास से प्रायः ऐसा गुप्त रोग लग जाता है कि वर्षों दुःख भोगना पड़ता है। इन गुप्त रोगों में हैं उपदंश-व्रण, ब्यमह (सूजाक) और गर्मी (आतशक) इन रोगों का वर्णन अध्याय ३१ में किया जाएगा।

संयमी रहने का नुर

पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, यदि अपनी काम वासनाओं को बड़ में रखना चाहे, तो उसे निम्नीलिखित नियमों का पालन करना चाहिए:

१. प्रातःदिन खुली हवा में व्यायाम कीजिये या टहलिये।
२. पर्याप्त मात्रा में ताजी हरी तरकारीयां खाइये और मांस तथा मिर्च न खाइये।
३. मादक पेयों का सेवन न कीजिये। किसी विद्वान ने लिखा है कि मादक पेयों के विरोध में सब से बड़ी बात यह है कि वे कामेच्छाओं को उत्तेजित करते हैं और आत्म-संयम की शक्ति को क्षीण करते हैं।
४. प्रचुर मात्रा में पानी पीजिये जिस से शारीरिक मल-स्राव सुगम हो जाए।
५. नित्यप्रातः स्नान कीजिये। ठंडे पानी से नहाने से कामेच्छा दब जाती है।
६. मन की स्थिति को कुछ इस प्रकार बनाइये कि मन में केवल शुद्ध विचार ही आएँ, और बात-चीत भी आप की उच्च प्रवृत्ति-उत्पन्न करने वाली हो।

अतिशय मंथन, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, महापाप है और इतना बढता जाता है कि बहुत से पुरुषों की उपयोगिता नष्ट होती जाती है। जननीन्द्रियों के प्रयोग में पराङ्मुखी प्रवृत्ति आयु को घटाती है और मृत्यु को निकट लाती है।

मासिक धर्म के दिनों में स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिये। गर्भावस्था के प्रथम सात महीनों में बहुत कम संभोग करना चाहिये, परन्तु अन्तिम दो महीनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिये क्योंकि गर्भपात का डर रहता है।

माता जननीन्द्रियां

प्रजनन के अद्भुत कार्य में यद्यपि स्त्री-पुरुष दोनों ही सहभागी होते हैं, परन्तु इस का बहुत अधिक भार स्त्री ही पर पड़ता है। प्रत्येक शिशु का जीवन यथासम्भव सुरक्षित रूप से माता के उदर ही में आरम्भ होता है; प्रत्येक शिशु अपने जीवन के प्रथम दो सौ अस्सी दिन तक माता के उदर में ही पोषित होता है। दो सौ अस्सी दिन तक उदर में ही नहीं, वरन् जन्म के पश्चात् पहले डेढ़, साल तक शिशु माता का स्तन-पान करता है, यही नहीं दूध छेड़ने के बाद भी कई वर्ष तक बच्चा माता की देख-रेख में ही रहता है —माता ही को उस का सब कुछ करना पड़ता है।

अतः यह तो स्पष्ट ही है कि बच्चों के भविष्य के निर्माण में पिता की अपेक्षा माता का हाथ अधिक होता है। वही बच्चों को जन्म देती है और उसी पर उस के पालन-पोषण का भार पड़ता है; तो क्या इस दृष्टि से पुरुषों को स्त्रियों का आधिक्य अधिक सम्मान नहीं करना चाहिये? बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में भी अधिक हाथ माता ही का होता है, तो क्या यह हमारे लिए सब से महत्वपूर्ण बात नहीं हो जाती कि हम इस का सदा ध्यान रखें कि स्त्री को अच्छी शिक्षा प्राप्त का अवसर दिया जाए जिस से वह अपने इस महत्वपूर्ण कार्य में सफल हो, उस का जीवन नीरस न बना दिया जाए और मातृत्व का भार उस पर तब तक न पड़ने दिया जाए जब तक वह पूर्ण रूप से स्त्रीत्व को प्राप्त न हो जाए?


नारी जननीन्द्रियों की रचना व क्रिया

नारी जननीन्द्रियों में डिम्बाशय (डिम्ब ग्रंथियां) और गर्भाशय दो मुख्य हीन्द्रियां हैं। डिम्बाशय दो छोटी-छोटी बादाम के आकार की सी दो ग्रंथियां होती हैं और वास्तविक रूप में नीचे की ओर गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती हैं। इन का ठीक-ठीक स्थान पृष्ठ १० पर के चित्र में दिखाया गया है। डिम्ब ग्रंथियां डिम्ब (अंडे) पैदा करती हैं। यह डिम्ब इतना छोटा होता है कि यदि एक सौ पच्चीस डिम्ब बराबर-बराबर मिला कर रख दिए जाएं, तो कीटनाई से एक इंच चौड़ा स्थान घेर सकेंगे।

डिम्ब प्रणाली चार-पांच इंच लम्बी एक नालिका है; इस का एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है और दूसरा डिम्बाशय तक चला जाता है। इसी नालिका में से हो कर डिम्ब डिम्बाशय से गर्भाशय में पहुँचते हैं।

गर्भाशय पृष्ठ १६ पर के चित्र में दिखाए गए आकार का ही होता है। कुंवारी लड़कियों (अप्रजाता स्त्रियों) का गर्भाशय लगभग पाँच तीन इंच लम्बा और पाँच इंच चौड़ा या मोटा होता है। इस का निचला संकीर्ण भाग योनि मार्ग के अन्तिम सिरों से मिला रहता है।

कुंवारी लड़कियों का योनिद्वार एक प्रकार की पतली झिल्ली द्वारा बन्द सा रहता है। इस झिल्ली को योनिच्छद या कुमारीच्छद कहते हैं, इस में मासिक धर्म के लिए एक छोटा सा छेद होता है; और यह प्रायः प्रथम सहवास में फट जाती है। हो सकता है



नारी-जननीन्द्रियां

१. बीजाण्डकोष या डिम्बाशय (Ovary) २. डिम्ब-प्रणाली या रजो-वाहक नालिका (Fallopian tube) ३. मलाशय (Rectum) ४. गर्भाशय (Womb or uterus)
५. मूत्राशय (Urinary bladder) ६. बस्तिगह्वर की हड्डी (Pelvic bone) ७. मूत्र-मार्ग (Urethra) ८. योनी

कि योनिच्छद में कोई छेद है ही न, या किसी रोग के कारण बन्द हो गया है। इस दशा में पानी के रंग का संसदार साब योनि में एकत्रित हो जाएगा और इस के कारण योनि में पीड़ा और सूजन हो जाएगी। जिस लड़की को इस किस्म की शिकायत है उसे किसी डॉक्टरनी को दिखाना चाहिए।

यावनावस्था और मासिक-धर्म

नौ वर्ष के बाद और पन्द्रह वर्ष से पहले-पहले कन्या यावनावस्था में पदार्पण कर चुकती है। इस समय उस के शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जो इस बात के सूचक होते हैं कि वह अब इस योग्य हो चुकी है कि गर्भधारण कर के सन्तानोत्पत्ति कर सके। उस की बगलों में और नाभि के नीचे वाल उगने लगते हैं, छातियां बढने लगती हैं, उस का सारा शरीर बहुत तेजी से बढने लगता है। और रजः स्राव आरम्भ हो जाता है।

हर अट्ठारहवें दिन मासिक-धर्म आरम्भ होता है और साधारणतया पांच दिन तक रहता है। रजः-स्राव के समय गर्भाशय की आन्तरिक झिल्ली के छंटे-छंटे टुकड़े, उत्तर-उत्तर के गिरते हैं। रजः-स्राव में मुख्य रूप से रक्त और इलेष्मा मिश्रित होते हैं। गर्भावस्था में और जब तक बच्चा दूध पीता है रजः स्राव बन्द रहता है। प्लेगमस वर्ष की आठवीं वर्ष की अवस्था में मासिक-धर्म बन्द हो जाता है और इस के बाद स्त्री सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकती।

यदि रजोदर्शन के प्रारम्भ से ही लड़की गर्भ धारण करने के योग्य हो जाती है, तो इस का यह तात्पर्य नहीं कि तुरन्त उस का विवाह कर के मातृत्व का भार उस पर डाल दिया जाए। उस का यह अधिकार है कि बाल्यावस्था से युवावस्था तक उस का स्वाभाविक रूप से शारीरिक और मानसिक विकास हो। इस के बाद ही उसे मातृत्व का भार संभालना उचित होगा। विवाह की सब से अच्छी आयु अट्ठारह वर्ष से तेईस वर्ष तक होती है।


याव-स्वास्थ्य की रक्षा के सिद्धांत

प्रत्येक माता को जननीन्द्रियों के प्रकार्य, उन की सफाई और उन की रक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिये। जहाँ तक उन की समझ में आ सके वहाँ तक प्रत्येक माता को अपनी लड़कियों को याव-सम्बन्धी बातें उचित ढंग से समझा देनी चाहियें। इन बातों के बता देने से कन्या का स्वास्थ्य और चरित्र सुरक्षित रहेगा।

बालिका कितनी ही छोटी क्यों न हो, यह आवश्यक है कि उस की नाभि के नीचे के अंगों को सदा साफ रक्खा जाए जिस से ऐसा न हो कि वे गंदे हो जाएं और उन में खजली होने लगे और बालिका उन्हें रगड़ने लगे। हो सकता है कि इसी प्रकार हस्त-मथ्यन की आदत पड़ जाए।

बच्चों को, चाहे वह लड़का हो या लड़की, कभी नंगा नहीं फिरने देना चाहिये। बालक और बालिका को एक ही बिस्तर में साथ-साथ नहीं सोने देना चाहिये। बच्चे कितने ही छोटे क्यों न हों, साथ सोने से बुरी आदतें सीख लेते हैं।

जब कन्या यावनावस्था को प्राप्त हो जाए और रजः स्राव आरम्भ हो जाए, तो उस की माता को उसे यह भली भाँति समझा देना चाहिये कि रजः स्राव के दिनों में सदा बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए सावधान रहे। यावनावस्था को प्राप्त होने वाली कन्या से अधिक काम नहीं कराना चाहिये और उसे रात को ना-ना, दस-दस घंटे तक सोने दिया जाए।



अण्डाशय (बीर्य-पिण्ड) की रचना सम्बन्धी रेखा-चित्र

हिमबाण्डय की आहारी काट

रजः साव के समय साफ कपड़े, के टुकड़े, या पतले से कपड़े में लिपटी हुई रजः का प्रयोग करना चाहिये जिस से वह रजः साव को सोख ले।

मासिक-धर्म के दिनों में बार-बार नहाना आवश्यक होता है। यदि नहा कर तुरन्त तौलिए से शरीर को रगड़, कप पोंछ डाला जाए, तो इस से सदा लम्बने की आशंका जाती रहती है। इस अवधि में किसी भी स्त्री को अपना शरीर साफ रखना नहीं भूलना चाहिए।



सुरासार और तम्बाकू

सुरासार (Alcohol) प्राकृतिक रूप से उपजने वाली वस्तु नहीं, बल्कि गेहूं, मक्का, जई, चावल, अंगूर और खजूर आदि को सड़ा कर इन का रस चुआ लिया जाता है। जो किण्व (खमीर) इन पदार्थों को सड़ाने में प्रयुक्त होता है, वह अन्न पदार्थों और फलों के इवतसार (Starch) और शक्कर को सुरासार में परिवर्तित कर देता है। सुराब किसी प्रकार की वयों न हो, अर्थात् किसी हो, ब्रांडी हो, जिन हो, बियर हो या ताडो हो, उस में सुरासार अवश्य होता है।

सुरासार एक ऐसा विषम विष है जो मनुष्य के शरीर में पहुँच कर उस की मानसिक तथा शारीरिक प्रक्रियाओं को क्षीत पहुँचाता है। इस का हानिकारक प्रभाव सब से पहले केन्द्रीय चेतना-संस्थान पर पड़ता है। इस से पूर्व कि किसी मद्याप के पैर उखड़ने लगे और वह लड़खड़ाते लगे, उस के मस्तिष्क की कार्य-गति बहुत धीमी पड़ जाती है। स्मरण-शक्ति और चित्त-एकाग्रता की क्षमता स्वाभाविक दशा में नहीं रहती। जिन कार्यों में शीघ्रता और पूर्ण युद्धता की आवश्यकता होती है, वे भली भाँति नहीं हो पाते। थोड़ी सी भी मीदरा उत्तेजना से होने वाले प्रतिप्रभाव के बीच के समय को बढ़ा देती है, अर्थात् पीछियों और चेतनाओं की प्रतिक्रिया-गति बहुत मंद हो जाती है। इसीलिए मोटर-गाड़ी चलाने वालों और वायुयान-चालकों को थोड़ी सी भी मीदरा नहीं पीनी चाहिये, क्योंकि इस से भयंकर दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है। बियर की एक ही बोतल से यह दशा हो जाती है कि दूर का ज्ञान नहीं रहता, प्रतिक्रियागति मंद पड़ जाती है और सोच-समझ कर काम करने की योग्यता कम हो जाती है। अधिक मीदरापान से चालक (डाइवर) असावधान हो जाते हैं, क्योंकि मद्याप मीदरा कार्य-क्षमता को घटा देती है, तथापि पीने वाले में एक प्रकार का वैयक्तिक विश्वास और सहस आ जाता है और वह यह समझने लगता है कि मैं मानसिक तथा शारीरिक रूप से सर्वथा सचेत हूँ और अपना कार्य भली-भाँति कर सकता हूँ।

जब कोई व्यक्ति मीदरा-पान करता है, तो उस की त्वचा लाल रंग की हो जाती है, क्योंकि रक्त अधिक परिमारा में त्वचा में से हो कर दौड़ने लगता है और सुरासार त्वचा के पास वाली रक्त-वाहिनीयों को फूला देता है। इससे एक प्रकार की उष्णता का अनुभव होने लगता है। बहुत से धोबी जो देर तक ठंडे पानी में खड़े हो कर कपड़े धोते हैं, वे यही सोच कर मीदरा पीते हैं कि इस से शरीर गर्म रहता है। परन्तु वास्तव में

मोदरा शरीर को झीत पहुँचाती है, क्योंकि जब रक्त दौड़ कर ऊपर खूबिया में आ जाता है, तो वहाँ ठंडा हो जाता है, जिस के फलस्वरूप शरीर की उष्णता निकल जाती है और आंतरिक तापमान घट जाता है।

सुरासार निर्णय-बुद्धि को नष्ट कर देता है और मानसिक प्रतिकार की क्षमता तथा आत्मसंयम की शक्ति को कम कर देता है। प्रायः अपराधी लोग अपराध करने से पूर्व मोदरा पी लेते हैं। मोदरा भलाई-बुराई में अन्तर समझाने वाली बुद्धि को नष्ट कर देती है। सुरासार के दुष्प्रभाव के कारण ही बहुत से युवक अनेक दुर्कर्म कर बैठते हैं। अतः जो व्यक्ति अपने व्यवहार तथा आचरण पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहें, उन्हें प्रत्येक प्रकार के मादक पद्यों से बचने का निश्चय कर लेना चाहिये।

मोदरा आमाश्वय, यकृत, रक्त-वाहीनियों, वृक्कों और चेंता-संस्थान को बहुत हानि पहुँचाती है। मोदरा-पान से शरीर में रोगों को रोकने वाली शक्ति घट जाती है, और आदमी फेफड़ों के रोगों, विशेषकर निमोनिया और क्षय रोग का शिकार बन जाता है।

बीमा कम्पनियों के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं वे इतने दिन जीवित नहीं रहते, जितने दिन शराब न पीने वाले व्यक्ति जीवित रहते हैं।

बुद्धिमान तथा विद्वान् सुलेमान ने मद्य का शब्द-चित्र इस प्रकार खींचा है:-

“कौन हाय-हाय करता है ? कौन दुःखी होता है ? कौन झगड़े में पड़ता है ? कौन बक-बक करता है ? कौन अकारण घायल होता है ? किस की आंखों में लाली होती है ?—उन की जो देर तक दाखमधु (मोदरा) पीते हैं।”

फिर सुलेमान यह उपदेश और चेतावनी देता है —

“जब दाखमधु लाल दिखाई देता हो, और प्याली में उस का सुन्दर रंग चमकता हो, और जब वह धार बांध कर ढाला जाता हो—तब उस को न देखना, क्योंकि अन्त में वह सर्प की भाँति हसता है और करत के समान काटता है।”

मोदरा-परित्याग का उपाय

सब से आवश्यक बात तो यह है कि इस बुरी आदत को छोड़ने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यदि मनुष्य प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से सहायता चाहे, तो उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि वह मोदरा-पान की प्रबल इच्छा का दमन कर सकेगा।

अब तो यह बात भी ज्ञात हो गई है कि भोजन का मोदरा-पान की इच्छा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः जो कोई इस आदत को छोड़ना चाहे, उसे सब प्रकार के मांस और मसाले वाले भोजनों से दूर रहना चाहिये। किसी भी प्रकार की मोदरा या सुरासार की इच्छा पर नियंत्रण रखने के लिए तम्बाकू के प्रयोग का परित्याग अनिवार्य आवश्यक है, क्योंकि तम्बाकू का प्रयोग करते-करते ही आदमी को शराब पीने की लत पड़ जाती है। यथालम्बव ताजे फल खाइये और अधिक मात्रा में साफ पानी पीजिये। चाय या कॉफी न पीजिये। प्रतिदिन गर्म पानी से स्नान करने के बाद तुरन्त शरीर पर ठंडा पानी डाल लीजिये और जल्दी से शरीर को पोछ डालिये। जहाँ तक हो सके बाहर खुली हवा में रहिये। प्रतिदिन इतनी देर तक व्यायाम कीजिये कि पसीना निकलने लगे। न तो अपने

घर में झराब आने दीजिये और न झराब की दुकान में कदम रखिये । यदि कोई व्यक्ति वास्तव में झराब पीने की लत को छोड़ना चाहता हो, तो उपरोक्त बातों का नियमपूर्वक पालन करे, अवश्य ही सफल होगा ।

तम्बाकू

संसार भर के देशों के निवासी किसी और बुरी आदत की दासता में इतने नहीं जकड़े, जितने तम्बाकू द्वारा बन्दी हैं । तम्बाकू चाहे धूम्रपान के लिए उपयोग में लाई जाए, चाहे नसवार के रूप में उपयुक्त हो, चाहे पान में रख कर खाई जाए, चाहे 'निकोटिन' का पानी पीया जाए, प्रभाव इस का प्रत्येक रूप में हानिकारक ही होता है । इस विषली घास में मनुष्य के लिए कोई भी तो गुणकारी बात नहीं । तो फिर क्या कारण है कि सभी देशों में इस का प्रयोग इतना सर्वव्यापी है ? बात यह है कि इस का निद्राकारी प्रभाव एक प्रकार का आनन्द प्रदान करता है, इसीलिए लोग इस के इच्छुक रहते हैं । चूंकि तम्बाकू मस्तिष्क तथा चेतनाओं को स्थिर रख देता है, इसीलिए मनुष्य को थोड़ी देर के लिए धिन्ता, थकान, भूख और चिड़-चिड़-पन से छुटकारा मिल जाता है । अधिक समय तक इस का प्रयोग करने के पश्चात् ही मनुष्य को इस की धोखेबाजी का पता चलता है; परन्तु उस समय तक वह इस बुरी लत की दासता में इस बुरी तरह जकड़ चुकता है और उस का मन इतना अशक्त हो जाता है कि वह इसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता ।

तम्बाकू एक विष है

तम्बाकू में जो एक मुख्य विष होता है उसे 'निकोटिन' कहते हैं; और मनुष्य को जितने भी विष ज्ञात हैं उन में से इसे भी अत्यंत घातक विष माना जाता है । 'निकोटिन' को केवल आधी बूंद ही अत्यंत घातक परिणाम उत्पन्न कर देती है, और फिर यह विष किसी आर्षीध से उतर भी नहीं सकता । जब तम्बाकू पहले-पहले प्रयोग में लाया जाता है, तो उस के विषले प्रयोग के ये लक्षणा होते हैं: जी मिचलाना, सिर चक्काना और बमन होना । जब शरीर को यह विष सहन करने की आदत धीरे-धीरे पड़ जाती है, तो ये लक्षणा प्रकट नहीं होते, परन्तु विष शरीर पर अपना प्रभाव जारी रखता है । इच्छित मादक प्रभाव का अनुभव होता है । तम्बाकू का प्रयोग करने वाले की रंसी ही दूजा होती है जैसी किसी अन्य मादक पदार्थ के प्रयोग करने वाले की—उसे उस पदार्थ के परिमाण को सदैव बढ़ाते रहने की आवश्यकता होती है, और यदि वह ऐसा न करे, तो उसे इच्छित आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता; और सब से बुरी बात तो यह है कि वह इस के बिना रह नहीं सकता । वह इस का दास बन जाता है !

तम्बाकू के प्रभाव

तम्बाकू का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को उपर्युक्त "सुख व आनन्द" का जो मूल्य चुकाना पड़ता है, वह निम्न वाक्य में संक्षेप में व्यक्त किया गया है—'जैसे-जैसे उसे

का पैसा धूप का रूप धारण कर के बायु में उड़ता जाता है, वैसे-ही-वैसे उस को अपने शरीर की अनुकूलता के अभाव का अनुभव होने लगता है; उस के पास अशक्त हृदय, धीमा श्वासोच्छ्वास, भराता हुआ नाला, कौटल मौस्तष्क, झीघ, उत्तेजित हो जाने वाला स्वभाव, स्वादेन्द्रिय, गंधेन्द्रिय, और दृष्टि में अविनम्रता, रोगों का प्रतीत्य करने वाली शक्ति का अभाव और अल्पायु—यही कुछ रह जाता है।” इस कथन की पूर्ण आंकड़ों द्वारा हो जाती है।

बालकों पर तम्बाकू का प्रभाव

सम्भव है कि वयस्क व्यक्ति पर उपरोक्त प्रभाव धीरे-धीरे प्रकट हों, परन्तु जो व्यक्ति बचपन में या युवावस्था के आरम्भ से ही तम्बाकू का प्रयोग करने लगता है, उस पर इस का प्रभाव अधिकतर, घातक और स्थायी होता है। जिन विश्लेषणों का सम्बन्ध चिकित्सा, शिक्षा, धर्म और न्याय से रहा है, वे सभी इस बात को मानते हैं कि यदि कोई बालक या युवक तम्बाकू का, मुख्यतः सिगरेट का, प्रयोग करता है, तो उस की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिकशक्ति कौटल हो जाती है। एक ऐसा विद्यार्थी जो मानसिक रूप से तीक्ष्ण बौद्धि वाला, नैतिक रूप से शुद्ध मन का, और शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा फुर्तीला हो, और यदि सिगरेट पीना आरम्भ कर दे, तो कुछ ही समय बाद, मानसिक दृष्टि से कौटल; नैतिक दृष्टि से अधिश्चलित; झूठ बोलने, धोखा देने और चोरी करने का अभ्यस्त; शारीरिक दृष्टि से सूस्त और नाटो कटू का; और रोग के लिए योग्य पात्र बन जाएगा। जितनी छोटी आयु में तम्बाकू के प्रयोग की लत पड़ जाती है, उतनी ही अधिक तीव्र गति वाली घातक और स्थायी हानि होती है और उतना ही अधिक मनुष्य इस की दासता में जकड़ता जाता है। बड़े-बड़े काम करने, विजय व सफलता प्राप्त करने और औचल्य के मार्ग पर चलने की इच्छा-शक्ति नष्ट हो जाती है। बाल अपराधियों के न्यायाधीशों का कथन है कि बाल-अपराधियों में से अधिकांश ऐसे होते हैं जिन्हें सिगरेट पीने की लत होती है।

जब युवा पुरुषों या स्त्रियों को इस की आदत पड़ जाती है, तो उन्हें अपनी मानसिक व शारीरिक प्रक्रियाओं में अस्थिरता का अनुभव होने लगता है। एक बहुत बड़ा विश्व-विद्यालय है जहाँ बहुत से विद्यार्थी तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, परन्तु वहाँ आज तक तम्बाकू का प्रयोग करने वालों में से एक भी विद्यार्थी अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सका। तम्बाकू का प्रयोग करने वाले उल्ल-कुद और दौड़-भाग के खेलों में भी कभी क्माल नहीं दिखा सकते, क्योंकि इन खेलों में शारीरिक सहन-शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों में से अधिकांश लोग रोगों के, विशेषकर श्वास-प्रश्वास की नालिका के रोगों के, शिकार बन जाते हैं। धूमपान करने वाला व्यक्ति बहुत सरलता से मीदरा-पान या अन्य नष्ट करने लगता है।

स्त्रियों में धूमपान की आदत

बड़े-बड़े की बात है कि पुरुष तम्बाकू के प्रयोग की मंदी, स्वास्थ्यनाशक, मंहंगी और अपवित्र आदत के शिकार बन जाएं, परन्तु स्त्रियों को यह लत लग जाना इस से कहीं

अधिक होचनीय है। इस का कारण यह है कि स्त्रियों ही पर बच्चों का स्वास्थ्य व विकास निर्भर रहता है। चीकत्सक लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो माता तम्बाकू का बहुत अधिक प्रयोग करती है, जो विशेष कर सिगरेट पीती है, उस का बच्चा रोनी होता है। ऐसे बालक के शरीर में बिष होता है। बात यह है कि धूम्रपान करने वाली माता के गर्भ में जो बच्चा होता है वह एक प्रकार के पानी से घिरा हुआ रहता है और इस पानी में होता है 'निकोटिन'। जन्म लेने के पश्चात् ऐसे बालक को संभवतः बनने का बहुत ही कम अवसर मिलता है क्योंकि वह शरीर को निर्बल कर देने वाली स्थितियों में उत्पन्न होता है और उस की माता के दूध में भी 'निकोटिन' होती है जिस से बालक को और भी क्षीन पहुँचती है। ऐसे बालकों में से साठ प्रतिशत बालक तो दो वर्ष की आयु को पहुँचते-पहुँचते ही मर जाते हैं। जिन युवतियों को सूट्ट, स्वस्थ और तीक्ष्ण-बुद्धि वाले बालकों की इच्छा हो, उन्हें चाहिये कि भूल कर भी तम्बाकू का सेवन किसी रूप में न करें। इस के अतिरिक्त यह सर्वमान्य तथ्य है कि तम्बाकू का अत्यधिक प्रयोग स्त्रियों के बाह्यपान का सामान्य कारण बन जाता है।

तम्बाकू और फेफड़ों का नासूर (कैंसर)

अमेरिका की कैंसर सोसाइटी (The American Cancer Society) के मार्गदर्शन और उस की देख-रेख में निपुण विद्वानों के एक दल ने ५० से ७० वर्ष तक की आयु वाले लगभग १८७,००० व्यक्तियों के जीवन-वृत्त का अध्ययन किया। इन में सभी प्रकार के लोग थे, अर्थात् ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कभी भी धूम्रपान नहीं किया था, या जो केवल सिगरेट या केवल पाइप या केवल सिगार पीते रहे थे; और ऐसे भी थे जिन्होंने सभी प्रकार का मिला-जुला धूम्रपान अपने जीवन में किया था। १२ महीने की जांच-पड़ताल के बाद प्रथम विश्लेषण प्रसन्न हुआ और इस से यह परिणाम निकला कि इस जाँची गई संख्या में से ४,८५४ व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी।

इन में नियमित रूप से धूम्रपान करने वालों की संख्या सिगरेट न पीने वाले मृतकों की संख्या का डेढ़-गुना पाई गई। इसी प्रकार धूम्रपान न करने वाले फेफड़े के कैंसर से मृत्यु को प्राप्त हुए रोगियों की संख्या ने पाँच गुनी संख्या उन रोगियों की निकली जो अत्यधिक सिगरेट पीने के कारण उक्त रोग से पीड़ित थे। धूम्रपान से मृतकों की तुलना में साधारण तथा हल्का (प्रतिदिन डेढ़-डिब्बी से कम) धूम्रपान करने वालों की संख्या पर्याप्त रूप में अधिक मालूम पड़ी।

वयस्क पुरुष को फेफड़े का कैंसर बहुत कम होता है, ५० में से किसी एक-आध को ही तो है। यदि वह धूम्रपान न करे, तो इस रोग से पीड़ित होने की सम्भावना घट कर इतनी कम हो जाती है कि १७० से लेकर १९० में से किसी एक को यह रोग हो जाए तो हो जाए। यदि वह नियमित रूप से एक या इस से अधिक सिगरेट की डिब्बियाँ प्रतिदिन पीता हो, तो फेफड़े के कैंसर से उस के रोगी हो जाने की सम्भावना १५-२० में से एक हो जाएगी। वर्तमान उपादेय सामग्री के अनुसार इन भयानक आंकड़ों में तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है।

पीछले विश्लेषण के एक वर्ष बाद दूसरा विश्लेषण किया गया और परिणाम से यह संकेत मिला कि पीछली बार की जांच में प्रकट हुए तथ्यों की तुलना में धूम्रपान और फेफड़े के नासूर उत्पन्न करने वाली अवस्था का परस्पर घनिष्ट सम्बंध इस बार अधिक स्पष्ट है। पता चला कि सिगरेट न पीने वाले लोगों की ३२४६० संख्या में से विश्लेषण की जाँच में केवल दो ही व्यक्ति फेफड़े के नासूर से पीड़ित हुए, दूसरे छद्मों में इस अनुपात के अनुसार १००,००० व्यक्तियों में ४.९ व्यक्ति रोगी निकले। सदा या यदा-कदा धूम्रपान करने वाले लोगों की १०७,९७८ संख्या में से फेफड़े के नासूर द्वारा १५२ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार १००,००० के पीछे १४५ रोगी काल कबलित हो गए। इस का अर्थ है कि सिगरेट न पीने वालों की अपेक्षा पीने वालों में इस रोग के प्रसार की सम्भावना २९ गुना अधिक थी। पाइप पीने वाले लोगों में फेफड़े के नासूर द्वारा मृत्यु संख्या धूम्रपान रहित लोगों की अपेक्षा दस गुना अधिक निकली।

फेफड़े के नासूर से अत्यधिक मृत्यु संख्या उन लोगों में पाई गई जिन्होंने प्रश्न करते समय स्वीकार किया था कि हम एक दिन में दो ढीबियाँ या इस से भी अधिक सिगरेट पिया करते हैं। इन लोगों में फेफड़े के नासूर से मृत्यु संख्या धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा ९० गुना अधिक थी।

जब प्रश्न उठता है कि "यदि मैं वर्षों से सिगरेट पीता आ रहा हूँ, तो अब इसे बन्द करने से मुझे कुछ लाभ भी होगा?"

हाँ, अवश्य होगा। जो लोग नियमित रूप में धूम्रपान करते थे और जिन्होंने जांच पढ़-तहत करने से पूर्व धूम्रपान बंजित कर दिया था उन में सिगरेट या तम्बाकू न पीने वालों की अपेक्षा मृत्यु-संख्या चाँदह गुना अधिक हुई, परन्तु उन लोगों की तुलना में, जो जांच के समय तक लगातार धूम्रपान करने रहे, यह मृत्यु-संख्या घट कर पचास प्रतिशत रह गई।

सद्यः हजार अंगरेज चिकित्सकों पर इसी प्रणाली से प्रयोग करने पर भी ठीक इसी प्रकार का परिणाम निकला।

तम्बाकू छोड़ने का उपाय

जो लोग तम्बाकू का प्रयोग नहीं करते उन्हें चाहिये कि इस का प्रयोग कभी भी आरम्भ न करें। जो व्यक्ति इस का प्रयोग करते हैं, परन्तु साथ-ही-साथ दीर्घायु व सुखी जीवन के भी इच्छुक हैं, उन्हें चाहिये कि इस से होने वाली क्षीणियों को ध्यान में रख कर तुरन्त इस का परित्याग कर दें। इस के परित्याग का सब में अच्छा उपाय यह है कि एक बार छोड़ें, तो बिल्कुल छोड़ दें; यह नहीं कि छोड़ने के इरादे से दिन-प्रति-दिन इस की मात्रा को घटाने का प्रयत्न करें। इस के लिए दृढ़ इच्छा-शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में किसी और स्थान पर सुरासार के परित्याग के जो उपाय बताए गए हैं, वे तम्बाकू की प्रबल इच्छा का दमन करने में भी सहायक हो सकते हैं। एक दूसरा उत्तम उपाय यह भी है कि प्रतिदिन शरीर में से खूब पसीना निकाला जाए, जिस से पसीने के साथ-साथ शीघ्र ही तम्बाकू का विष भी शरीर से बाहर निकल जाए।

स्वास्थ्यप्रद भोजन

प्रत्येक जीवधारी को भोजन की आवश्यकता होती है: बढ़ने के लिए, ऊर्जा के लिए, शारीरिक प्रक्रियाओं का नियमन करने के लिए, टूटे-पूटे घिसे हुए तन्तुओं की पुनः रचना के लिए, पर्याप्त मात्रा में और रासायनिक अंगों वाले भोजन आवश्यक हैं। जो खाद्यपदार्थ शरीर के लिए आवश्यक हैं उन को रसायनशास्त्र के विशेषज्ञों ने निम्नीलीखित श्रेणियों में बांटा है:—पानी, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, जीवनसत्व या पोषक तत्व (विटामिन), और खनिज पदार्थ।

पानी और कुछ खनिज पदार्थों को छोड़, कर मनुष्य के आहार की सामग्री मुख्यतः वनस्पति-जन्तु से प्राप्त होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश को, और वायु में के आक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को, और पृथ्वी में से, पानी और खनिज लवणों को अपने उपयोग में लाते हैं और इन के द्वारा कार्बोज वसा (चिकनाई), प्रोटीन और जीवनसत्व (विटामिन) उत्पन्न करते हैं जो मनुष्य के भोजन का काम देते हैं।

यह भोजन व्यवस्था पाँच पुस्तक (बाइबल) में वर्णित भोजन व्यवस्था के अनुरूप ही है क्योंकि उस में बताया गया है कि जब सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को बनाया था तब उस के लिए ऐसा भोजन भी उत्पन्न किया था जिस में केवल फल, अनाज, साग-भाजी और मवेशी सम्मिलित थे। यह बात स्पष्ट है कि परमेश्वर जिस ने मनुष्य का शरीर बनाया, वह ठीक-ठीक जानता था कि मनुष्य के लिए कौन-सा भोजन उत्तम और अत्यन्त उपयोगी होगा।

कार्बोज पदार्थ शरीर में उष्णता तथा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वे फलों और साग-भाजी में पाए जाते हैं, परन्तु चावल, आलू, मिठाइयों और रोटी इत्यादि जैसी वस्तुओं में वे अधिक मात्रा में होते हैं।

वसा (चिकनाई) भी उष्णता तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। जो वसा पदार्थ प्राणियों से मिलते हैं वे मक्खन, मलाई अण्डे का पीला भाग और चर्बी हैं, और जो वनस्पति से मिलते हैं वे नारियल, जैतून, मूंगफली, बिनौला, सरसों और सोयाबीन के तेल हैं।

प्रोटीन (Proteins) भी थोड़ी बहुत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, परन्तु उन का मुख्य कार्य है शारीरिक प्रक्रियाओं को क्रमानुसार रखकर तन्तुओं की छोड़न की पूर्ति करते रहना और उन की बाढ़ को नियमित रखना। सब आहारों में थोड़ी-बहुत प्रोटीन होता ही है, परन्तु वह बीचकनाई के मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर, मवेशी, हाथ के फूटे हुए चावलों और गेहूँ जैसे अनाजों, छीमियों, मटर, सोया बीन, अन्य प्रकार की बीनों, मूंगफली और दालों में बहुत होता है।

खीनज पदार्थों की आवश्यकता शरीर के लिए इस लिए होती है कि सूक्ष्म सन्तुजों की भरपूर भली-भाँति होती रहे। सब खीनज पदार्थ दूध के लिए आवश्यक हैं और वे ताजे फलों और साग-भाजी में प्रचुर मात्रा में होते हैं। अन्य खीनज पदार्थों की अपेक्षा शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बयस्कों को इन दो खीनज पदार्थों की जितनी आवश्यकता होती है उस से दूगुनी मात्रा में बच्चों को होती है। यदि आहार में अंडे, पनीर, दही, साग-भाजी और दूध पर्याप्त मात्रा में हों, तो इन खीनज पदार्थों की पर्याप्त मात्रा इन में से मिल जाएगी। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि आहार में लोहे की पर्याप्त मात्रा हो। यह खीनज पदार्थ (लोहा) सब हरी तरकारीयों, पत्तदार साग-भाजी, किड़मझ, अंगूर केले, कलंजी, बिन चिकनाई के मांस, अंडे के पीले भाग, और खीरे में होता है।

विटामिन (पोषकतत्वों) को शरीर के नियमक कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के आहार में ताजे फल, साग-भाजी, और बिना भूसी निकाले हुए अनाज पर्याप्त मात्रा में हों तो उसे इन विटामिन की पर्याप्त मात्रा शरीर की वाढ़ के लिए मिल जाएगी।

पानी खाद्य पदार्थ तो नहीं है, परन्तु मनुष्य के आहार में इस की बहुत आवश्यकता है ताकि किया हुआ भोजन इस की सहायता से इस दशा में आ जाए कि शरीर उस का परिपचन सरलता से कर सके। शरीर को कितने पानी की आवश्यकता है यह बात प्रत्येक व्यक्ति की आयु, कार्य और उस स्थान के जल-वायु पर निर्भर होती है। नियमित आहारों के बीच में कई ग्लास पानी पीने की आदत प्रत्येक व्यक्ति को बनाए रखनी चाहिए।

उपरोक्त बातों से यह बात सिद्ध होती है कि अच्छे और संतुलित आहार में ये पदार्थ होने चाहिए:—ताजे फल और साग-भाजी, पकाए हुए और कच्चे दोनों प्रकार के, बिना भूसी निकाले अनाज और मूँवे।

इस प्रकार के आहार को "शाकाहार" कहते हैं। जब इस में दूध से बनी हुई वस्तुएँ और अंडे भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं तो इसे "दूग्धयुक्त शाकाहार" कहते हैं। "दूग्धयुक्त शाकाहार" का उपयोग करने से आहार सम्बन्धी विभिन्न पदार्थों में उचित सन्तुलन रखने में कम कठिनाई होती है। दूध रक्षक आहार है क्योंकि उस में कुछ खीनज पदार्थ और विटामिन, अधिक मात्रा में प्रोटीन, वसा, और कार्बोज होते हैं। पौष्टिक (वाइबल) में दूध को उत्तम आहार माना गया है क्योंकि उस में लिखा है कि नई दुनियाँ ऐसी जगह होगी जहाँ "दूध और सहृद की नहरें बहती होंगी।"

भोजन में मांस का स्थान

जैसा कि हमी अध्याय में ऊपर बताया जा चुका है सब आहारों के मिलने का मौलिक स्थान वनस्पति जगत है। पशुओं का मांस उस आहार से बनता है जो पशु घास-पात में से प्राप्त करते हैं। इस का अर्थ यह हुआ कि जो कोई मनुष्य पशुओं का मांस खाता है वह अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति जगत से ही अपना आहार प्राप्त करता है, अर्थात् एक बार खाई हुई वस्तुओं को ही खाता है। इस के साथ-ही-साथ वह पशुओं के शरीर में पाई जाने वाली हानिकारक वस्तुओं को भी खा जाता है।

पशुओं में रोग

किसी लेखक ने लिखा है कि यदि मांस खाने वाले व्यक्ति उन जीवित पशुओं की दृष्टि देख पर जिन का मांस वे खाते हैं, तो उस मांस की ओर से घृणापूर्वक मूँह मोड़ें; और उन के शरीर में एक प्रकार की कंपकंपी पैदा हो जाए।

जिन पक्षियों, मछलियों और पशुओं का मांस मनुष्य खाते हैं उन में प्रति दिन रोग बढ़ता जा रहा है। ध्यानपूर्वक जांच करने से पता लगा है कि धम, नासूर, सब प्रकार के फोड़े, कृमियों के रोग, 'बैंग' की बीमारी (जो उन कृमि से उत्पन्न होती है जिन से मनुष्य में भूमध्यसागर का ज्वर (undulant fever) उत्पन्न होता है) ये सब रोग इन जीवधारियों में वृद्धता से बढ़ रहे हैं। मनुष्यों में ये बीमारियाँ उन जीवधारियों के मांस को छूने अथवा खाने से उत्पन्न हो जाती हैं। जो मांस खाया जाता है वह पूर्ण रीति से अन्दर तक भली-भाँति पक नहीं पाता है और इसके खाने से बहुत हानि होती है। रंगी जानवरों का खराब दूध पीने और रंगी पक्षियों के अंडे खाने से भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं।

अधिक प्रोटीन जड़, पकड़, जाने वाली बीमारियों का कारण बन जाती है।

कुछ वर्षों से जड़, पकड़, जाने वाली बीमारियाँ बढ़ी तेजी से बढ़ रही हैं। इन के कारण गुर्दे, हृदय और मस्तिष्क जैसे शरीर के अवयवों के तन्तुओं में विनाशालमक परिवर्तन हो जाते हैं। अधिक मात्रा में प्रोटीन के सेवन से विशेषकर अर्धेड, अवस्था के लोगों को हानि पहुँचती है।

गुर्दे और हृदय का रोग, सन्न्यास रोग (apoplexy), रक्तवाहीनियों का सख्त हो जाना आदि, ये सब बीमारियाँ उस अधिक प्रोटीन के कारण होती हैं जो मांस खाने से शरीर के अन्दर जाती है।

मांस खाने से नासूर (Cancer) का सम्बन्ध

“नासूर, उस का कारणा और उस की चिकित्सा” नामक पुस्तक में डा. बकले ने बड़े ही दिलचस्प आंकड़े दिए हैं। इन से पता चलता है कि अहार का नासूर से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध हो सकता है। डा. बकले लिखते हैं कि इंग्लैंड में पिछले पचास वर्षों में कमी-कमी मांस के प्रयोग की मात्रा दुगुनी हो गई है अर्थात् इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का साल भर के मांसाहार का औसत १३० पाउंड हुआ। इसी अवधि में नासूर की वृद्धि चौगुनी हो गई। आयरलैंड में इस अवधि में मांस बहुत कम खाया गया अर्थात् साल भर का प्रत्येक व्यक्ति के मांसाहार का औसत ४० हुआ और वहाँ नासूर से होने वाली मृत्युएँ भी बहुत कम हुईं। इटली में अप्पेर्लैंड की अपेक्षा मांसाहार की मात्रा और भी कम रही और वहाँ नासूर से मरने वालों की संख्या भी बहुत कम रही। जिन स्थानों में शाकाहार का अधिक प्रचार है वहाँ यह बीमारी बहुत कम सुनने में आती है। अधिकतर

पीरीस्पीटियों में नासूर पाचन-अवयवों से ही सम्बन्ध रखता है। इस से यह बात सिद्ध हुई कि नासूर की बीमारी का आहार से बहुत कुछ सम्बन्ध हो सकता है।

मांस और सहनशीलता

मांसाहार से सहनशीलता बहुत कम हो जाती है। यह बात बहुत-से प्रयोगों द्वारा प्रमाणित कर दी गई है। सब से अधिक प्रख्यात वे प्रयोग हैं जो अमरीक के वेल विश्व-विद्यालय के डॉक्टर इरीविंग फिस्जर ने किये थे। उस ने पन्द्रह मांसाहारी व्यायामीप्रिय युवकों को और कुछ मिले-जुले झाकाहारी युवकों को जो व्यायाम नहीं करते थे चुना। झाकाहारी युवकों ने मांसाहारी युवकों की जर्पस्था हथों को फैलाए रखने और घटने झुकाकर खड़े रखने में दूनरी सहनशीलता दिखाई।

जो व्यक्ति बहुत मांस खाता है, यदि मांस खाना बन्द कर दे, तो उसे एक प्रकार की शिथिलता का अनुभव होता है और उस में ओज नहीं रहता। इस का कारण यह है कि मांस में उत्तेजना उत्पन्न करने का प्रभाव होता है जिस से रक्त में उष्णता बढ़ती है और नाडियों में उत्तेजना पैदा हो जाती है। कुछ समय के पश्चात् यह शिथिलता जाती रहती है और मांस खाए बिना ही पहले जैसी शक्ति देह में रहती है।

इस से हम को यह बात ज्ञात हुई है कि मांसाहार में खतरा है, इस के साथ-ही-साथ हमें यह जान कर संतोष और प्रसन्नता होती है कि मांसाहार के बिना भी सन्तुलित आहार सम्भव हो सकता है। सर रॉयट मेकारिसन ने मद्रास में एक भाषण में यह निष्कर्ष निकाला था:— "उत्तम और पूर्ण आहार वह है जिस में मुख्य पदार्थ दूध, दूध से बनी हुई वस्तुएं, अनाज, या मिले-जुले हुए कई अनाज, पतदार हरी सब्जियाँ और फल सीमित हैं।"

खाना पकाने की विधि

पके हुए फल और सब्जियों के जीवीरक्त बहुत से खाद्य पदार्थों को खाने से पूर्व पका लेना चाहिए। पकाने से तीन लाभ होते हैं: पहला यह कि बहुत से खाद्यपदार्थों में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले सब रोगोत्पादक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरा यह कि पकाने से खाना आसानी से पच सकता है। बेहू, दाल और सेम आदि ऐसे भोजन हैं कि यदि इन को पकाया न जाए तो मनुष्य के शरीर के अवयव इन्हें पचा नहीं सकते। तीसरा यह कि पकाने से भोजन स्वादिष्ट बन जाता है, क्योंकि चावल, सेम, बेहू, बाजरा आदि में जैसे खाद्य पदार्थों को कच्चा खाने में इतना स्वाद नहीं आता जितना पकाने के बाद आता है।

खाना पकाने की तीन प्रचलित विधियाँ हैं: उबालना, या भाप से पकाना (दम करना), तलना और तलना।

तलना पकाने की अच्छी विधि नहीं है। इस प्रकार खाना जल्दी तो पक जाता है परन्तु बेहतर यही है कि खाना पकाने में अधिक समय लगाया जाए क्योंकि तला हुआ भोजन पाचन-अवयवों को क्षीन पहुँचाता है। तलते समय जिस तेल का उपयोग किया जाता है

यह भोजन के प्रत्येक कण पर इस प्रकार तह जमा लेते हैं मानों उसे तेल से रंग दिया गया हो । जब तेल में लपटा हुआ भोजन आमाश्वय में पहुँचता है, तो यह पच नहीं सकता । तले हुए भोजन का निरन्तर उपयोग करने से अजीर्ण रोग (बदहजमी) हो जाता है ।

विभिन्न आयुओं में आवश्यक दैनिक आहार

आयु	इतना क्लोरीज चाहिए	इतने ग्राम प्रोटीन देह के वजन के प्रत्येक पाँच पर	इतने ग्राम कैल्शियम	इतने ग्राम फॉस्फोरस	इतने मिलीग्राम लोह	इतने ग्राम विटामिन "ए"	इतने ग्राम विटामिन "बी"	इतने मिलीग्राम विटामिन "सी"	इतने ग्राम विटामिन "डी"
१ वर्ष से कम	४००	१०	१०	१०	३-६	६०००-	८०-	४०	८००
१ से २	१०००	१५	१०	१०	६-७	१००००	२००-		१२००
	१२००	१५				"	३००		
३ से ५	१०००	१०	१०	१०	६-८	"	२२०-		
	१४००	१५				"	६००		
६ से ९	१४००	१०	१०	१०	७-१२	"	३००-		
	२४००	१३		११		"	६००		
१०-१३ बालक	२६००	०.७-	१०	१०	११-१५	८०००-	४००-	४०-	३००
	३३००	०		१५		१००००	६००	८०	६७५
बालिका	१८००	"	"	"	"	"	"	"	"
	३०००	"	"	"	"	"	"	"	"
१४-१८ बालक	१६००	०.७	१०	१०	१२-२०	"	४०००-	०-	३००-
	४०००			१८		"	८०००	८०	
वायिका	२४००	१०-	१५	"	"	"			
	२८००								
वयस्क	२८००	०.४	०.६८	१३	१२-२०	३०००-	३००-	४०-	
	३८००					८०००	६००	८०	

ऊपर दी हुई सूची में विटामिन की जो मात्रा बताई गई है वह इतनी है कि साधारण आहार के लिए पर्याप्त होती है और उत्तम आहार के लिए भी पूर्ण समझी जाती है । बहुत से व्यक्तियों में इन मात्राओं से बहुत कम विटामिन खाने से भी विटामिन की कमी ज्ञात नहीं होती ।

सूची में जो वचन दिए गए हैं वे मौखिक पद्धति के यूनिट हैं, क्योंकि यह पद्धति अब संसार भर में वैज्ञानिक लेखों और पुस्तकों में प्रयोग में लाई जाती है। लोहा और विटामिन "सी" के वजन मिलीग्राम्स में दिए गए हैं ताकि लम्बे दशमलव अपूर्णांक न लिखने पड़ें। १,००० मिलीग्राम का एक ग्राम होता है, और लगभग २८ ग्राम का एक आउंस होता है। विटामिन "सी" को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर लिया गया है, अतः उस की मात्रा वजन में दी जा सकती है, और आज-कल इसी पद्धति का प्रयोग बढ़ाया किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से इसे 'एस्कॉर्बिक एसिड' या 'सेविटोमिक एसिड' कहते हैं। पुरानी पुस्तकों में विटामिन की मात्राएं अन्तर-राष्ट्रीय इकाई में दी गई हैं। ऐसी इकाई में विटामिन की मात्राएं देना अधिक समाधान कारक नहीं होता है, क्योंकि एक विटामिन के यूनिट की तुलना दूसरे विटामिन के यूनिट से नहीं की जा सकती है, परन्तु इस समय तो यही पद्धति उतम मानी गई है। संसार के विभिन्न भागों में बीसियों वैज्ञानिक विश्लेषण इस कार्य में व्यस्त हैं कि जो विटामिन आज तक ज्ञात हुए हैं उन्हें बढ़ा किया जाए, और नए विटामिन का अनुसन्धान किया जाए। जब कोई विटामिन बढ़ाकर लिया जाता है तब उसके रासायनिक अंगों का पता लगाया जा सकता है और उन की मात्राओं को यूनिट के स्थान में वजन द्वारा निश्चित किया जा सकता है। आशा है कि विज्ञानशास्त्र की उन्नति से ज़ीघा ही यह सम्भव होगा कि जितने साधारण विटामिन अब तक ज्ञात हो चुके हैं उन को इस अच्छे पद्धति से नपा जा सके।

रसोई घर

उचित प्रकार से भोजन बनाने पर ही परिवार का स्वास्थ्य निर्भर होता है। रसोई घर का कमरा सारे घर में अच्छा होना चाहिये। उस में खिड़कियां होने चाहियें जिस से अन्दर खुब धूप आ सके। फर्श, दीवारें और छत साफ सुथरी रखनी चाहियें। कुड़ा, कचरा और गन्दा पानी डालने के लिए बाल्टी, घड़ा या डबकन वाले टीन होने चाहिये। कुड़ा और गन्दा पानी दरवाजों के सामने एक ओर या फर्श पर नहीं फेंकना चाहिये क्योंकि इससे गन्दगी बढ़ती है और मक्खनियां और दूसरे कीड़े, जल्दी-जल्दी बढ़ने लगते हैं।

एक ऐसी अल्मारी का प्रबन्ध करना चाहिये जिस में चाय और जाली लगी हुई हो। इस में खाना रखा जाए जिस से मक्खनियां एवं दूसरे कीड़े, खाने पर न जा सकें। चूहे, चूहियां, मक्खनियां, झींगुर और अन्य जन्तु अत्यंत गन्दे होते हैं। उन के पैरों तथा देहों पर घिसाने विषले पदार्थ होते हैं। वे उस गंदगी को भोजन पर छोड़ देते हैं। मक्खनियों को गंदगी तथा मल को खाते और बच्चों से उड़ कर रसोई घर में भोजन पर बैठे किस ने न देखा होगा। इसलिए सारा भोजन चूहे-चूहियों की पहुँच से सुरक्षित रखना चाहिये।

खाने की आदतें

माता-पिता और बच्चों को एक साथ बैठ कर भोजन करना चाहिए और खाते समय आनन्दपूर्वक बात-चीत करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि मन झूत और सुखी होता है तो भोजन अधिक स्वादिष्ट लगता है और भली भाँति पच सकता है। धीरे-धीरे खाइये और भोजन को पूर्ण रूप से चबाइये। खाने के समय नियमित रखने चाहिए, चाहे दिन में दो बार खाएँ या तीन बार खाएँ। भोजन का भोजन हल्का होना चाहिए, और साधारणतया सात बजे से पहले-पहले कर लेना चाहिये। रात के समय पाचन-अवयव थके हुए होते हैं और उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देह के शेष अंगों को होती है। अजीर्ण रोग और पाचन अवयवों से सम्बन्धित बहुत सी बीमारियाँ इसीलिए होती हैं कि लोग रात को बहुत देर से खाना खाते हैं और वह भी पेट भर के और फिर तुरन्त ही सो जाते हैं। वयस्क व्यक्तियों और सात वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को दिन-भर में तीन बार भोजन करना बहुत पर्याप्त होता है, और बीच-बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए।

रोगों के कारण

मनुष्यों के सब से बड़े ख़तरा वे हैं जो आकर में जीत सूक्ष्म हैं। यदि यह पता चलने कि किसी गांव में एक भयानक नरभक्षक छोर घुस आया है तो लोग बहुत डर जायें। जिन के पास बन्दूकें हैं, वे उसे मारने के लिये आने बढेंगे और जिन के पास अपने बचाव के लिये कोई इस्त्र नहीं, वे मारे डर के घरों में घुस जाएंगे। परन्तु प्रत्येक गांव में ऐसे अनौपचारिक ख़तरा होते हैं जो छोर से कहीं अधिक भयंकर और हानिकारक होते हैं। छोर तो केवल दो-तीन व्यक्तियों को मार कर भाग सकता है। परन्तु ये दूसरे ख़तरा प्रत्येक गांव में बघों से रहते हैं और गांववालों में से ९८ प्रतिशत को मृत्यु का कारणा यही होते हैं। ये ख़तरा हैं—“रोगों के कीटाणु।”

रोग के कीटाणु क्या हैं

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में ही ‘रोगोत्पादक कीटाणु’ की ख़र्चा की जा चुकी है। इन रोगोत्पादक कीटाणुओं को ‘अट्रिश कीटाणु’ भी कहते हैं क्योंकि ये इतने सूक्ष्म होते



वैज्ञानिक लोग रोगों के कारणाओं की निरन्तर खोज में लगे हुए हैं।

हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शक-यंत्र के दिखाई नहीं देते। इन में अधिक कीटाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि यदि एक हजार कीटाणु मिल कर एक गोली का आकार धारण कर लें, तो यह गोली राई के दाने से अधिक बड़ी न होगी। इन में से कुछ गोल होते हैं और कुछ लम्बे।

रोग के कीटाणु बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बीज बो देने के पश्चात् पांथ के उगने, बढ़ने और फिर नये बीज उत्पन्न करने में कई महीने लगते हैं। परन्तु एक कीड़ा गरम स्थान में ३० मिनट में अपने आप को विभाजित कर के वैसे ही एक और कीड़ा उत्पन्न कर देगा, और जगले ३० मिनट में ये दो कीड़े, चार बन जायेंगे, और इसी प्रकार आधे घंटे में आठ। यदि वे इस गति से बढ़ते रहे तो दस घंटे में दस लाख कीड़ों का एक परिवार फैलता दिखाई देगा।

जिस किसी स्थान में थोड़ी नमी और नमी होगी वहाँ कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे। गर्म और गीला स्थान इन कीटाणुओं की तीव्र वृद्धि के लिये अति अनुकूल है। लगभग सभी पांथों और जानवरों को अच्छी तरह बढ़ने के लिये सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है परन्तु कीड़े, तेज धूप में मर जाते हैं। ये कीड़े, उन स्थानों में भी अधिक संख्या में बढ़ते हैं जहाँ सब्जी या मांस गड़, रहा हो। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि जो स्थान जितना साफ और प्रकाशमय होगा, उतने ही कम कीड़े, वहाँ होंगे।

ये कीड़े, बहुत छिटे, हलके और प्रत्येक स्थान पर अपनी संख्या बढ़ाने वाले होते हैं, इस से ये चारों ओर फैले रहते हैं। ऐसा स्थान शायद ही कोई हो जहाँ ये कीटाणु न उपस्थित हों। ये हमारे मुँहों में, हमारी नासों में, और हमारी त्वचा पर होते हैं। ये हमारे भोजन और पीने के पानी में रहते हैं। ये हमारे घरों के फर्श और दीवारों पर, हमारे घर के दालान और आँगन में, तालाब, कुएँ और नदी के जल में और जिस हवा में हम मांस लेते हैं उस में भी होते हैं। जहाँ पर लोगों की आबादी अधिक घनी होती है वहाँ पर ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं।

सभी कीटाणु हानिकारक नहीं होते परन्तु इन में से कुछ मनुष्य को हानि पहुँचाते हैं; इसलिए इन से बच कर ही रहना चाहिए।

कीटाणु रोग कैसे उत्पन्न करते हैं


हँजा, मोतीझिरा, झिल्लीक-प्रदाह, क्षय रोग, महामारी, फोड़े, लाल ज्वर, गमी का रोग और सजाक आदि रोग कीटाणुओं से इस प्रकार होते हैं: जब कीटाणु शरीर के अन्दर घुस जाते हैं और वहीं बढ़ते हैं, तो वे शरीर में विष फैलाते हैं। इन कीटाणुओं के विष से ही ज्वर, रिस-दर्द, पीड़ा, और दस्त इत्यादि के रोग उत्पन्न होते हैं।

रोग के कीटाणु कहां से आते हैं

रोगोत्पादक कीड़े, हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होते, वे बाहर से आते हैं। वे बीमार लोगों या जानवरों से आते हैं। उदाहरण के लिये, हँजे वाले रोगी के शरीर में वे कीड़े, होते हैं जो हँजा फैलाते हैं। जब यह व्यक्ति प्लेट या खाने के बरतन का प्रयोग करता है तो उस के मुँह और हाथों से कुछ कीड़े, उस प्लेट पर आ जाते हैं, और यदि कोई दूसरा

व्यक्ति उस प्लॉट से खाली पानी में धोए बिना ही काम में लाए तो अवश्य ही हैजे के कुछ कीटाणु उस के पेट में चले जाएंगे। ये कीड़े, उस के अन्न-मार्ग में पहुँच कर संख्या में बढ़ते जाएंगे और थोड़े समय बाद इतना विष पैदा कर देंगे कि उसे ज्वर आयेगा, दस्त आने लगेंगे और हैजे के सभी अन्य चिन्ह प्रगट होने लगेंगे। इन कीड़ों के फैलने का एक और तरीका यह भी है कि हैजे के रोगी के मल में से ये कीड़े, दूसरों तक पहुँच जाते हैं। हैजे के रोगी के दस्त हैजे के कीटाणुओं से भरे हुए होते हैं। यदि इस मल को तालाब, नदी या कुएँ के पास ही फेंक दिया जाए तो इन कीटाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी और जो लोग तालाब, नदी या कुएँ से पानी भरेंगे, उन के शरीर में पानी के साथ कुछ कीटाणु चले जाएंगे और थोड़े ही समय में इन लोगों को भी हैजा हो जाएगा।

जिन रोगियों के फेफड़ों में क्षय रोग होता है उन के थूक में कीटाणु लाखों की संख्या में रहते हैं। जब ये रोगी फर्स या जमीन पर थूकते हैं तो थूक सूख कर झीघ, ही धूल में मिल जाता है। यह धूल हवा में मिल जाती है और लोग इस हवा को साँस के साथ अन्दर ले जाते समय क्षय रोग के इन कीटाणुओं को भी अन्दर ले जाते हैं। यदि इन कीड़ों को अन्दर ले जाने वाला व्यक्ति अधिक छूट-पूछ न करे तो ये कीड़े बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जायेंगे और उस के फेफड़ों, क्षय रोग के शिकार बन जाएंगे। इन दो उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि रोग के कीटाणु कहां से आते हैं।



दिल्ली अनुसंधान स्थान पर असावधानी से कुआँ बनाने के कारण ही पानी दूषित होता है। इस स्थान में जो खूब हुआ कुआँ दिखाया गया है उस में इधर-उधर गया पानी अन्दर चला जाता है; परन्तु हमें द्वारा पृथ्वी में छेद कर के नल द्वारा पानी निकालने से पानी दूषित नहीं हो पाता।

इस के अतिरिक्त यह भी बता देना उचित है कि कुछ रोग लोगों के छोटे-छोटे जानबूझ से भी लग जाते हैं। जैसे पायल कुत्ते के काटने से डेढ़ का रोग, चूबों से महामारी, सूजर से बालों का खोई भी रोग और भेड़, बकरीयों से क्षय रोग हो जाता है। दाढ़ जैसे त्वचा के कई रोग बिल्ली या कुत्ते से लग जाते हैं।

रोग के कीटाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं

रोग के कीटाणुओं के लिए शरीर में प्रवेश करने के तीन द्वार हैं: मुँह नाक और त्वचा पर चोट लगा हुआ स्थान। रोग के कीटाणु भोजन और पानी द्वारा हमारे मुँह में प्रवेश करते हैं। जब कोई व्यक्ति गंदे हाथों से भोजन करता है, जब बच्चे अपनी उंगलियाँ, रुपया या पैसे अपने मुँह में डालते हैं—तो रोग के कीटाणु मुँह में प्रवेश कर जाते हैं। जो हवा में मिले हुई धूल नाक द्वारा अन्दर जाती है उस के साथ रोग के कीटाणु भी हमारे शरीर के अन्दर पहुँच जाते हैं।

यदि शरीर की त्वचा कहीं से कटी-फटी न हो तो वह शरीर के ऊपर एक ऐसी चादर डाल देती है जिस से कीटाणु शरीर के अन्दर नहीं पहुँच सकते। परन्तु जब त्वचा में चोट लगती है तो कीटाणु शरीर के अन्दर उसी प्रकार पहुँच जाते हैं जैसे किसी मकान की छत से खपरैल हटा लेने पर बर्षा अन्दर आने लगती है। जब त्वचा चाकू या छुरी से अकस्मात् कट जाए या कोई खंटा या सूई अन्दर घुस जाए और त्वचा में छेद या बड़ा सा छेद हो जाए और चूँक चाकू या लकड़ी पर रोग के कीटाणु सदैव रहते हैं, वे शरीर के अन्दर घुस जाते हैं, बढ़ने लगते हैं और शीघ्र ही चोट लगा हुआ स्थान लाल हो जाता है या फूल जाता है और एक-दो दिन में उस में पीप पड़ जाती है। यह सब कुछ उन कीड़ों के कारण हो जाता है जो त्वचा पर चोट लगने के कारण शरीर के अन्दर घुस जाते हैं।

शरीर के अन्दर रोग के कीटाणुओं के घुसने का दूसरा ढंग यह है कि जब मच्छर पिस्सू, खटमल, जू या किलनी किसी व्यक्ति के काटते हैं तो वे थोड़ा सा खून चूस लेते हैं। यदि उस व्यक्ति के मलेरिया या आंत्रिक-ज्वर हो, तो उस का खून चूसते समय वह कीड़ा मलेरिया या आंत्रिक-ज्वर के कुछ कीटाणु अपने अन्दर ले जाता है। बाद में वही कीड़ा जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के काटना है तो रोगी व्यक्ति के शरीर में से चूसे हुए कीटाणुओं में से कुछ उस व्यक्ति के शरीर में पहुँचा देता है।

रोग के कीटाणु से हम अपने आप को किस प्रकार बचाएँ

प्रायः रोगोत्पादक कीटाणु रोगी लोगों से ही आते हैं। अतः यह बात बहुत आवश्यक है कि ज्योंही ये रोगी के शरीर से निकलें त्योंही उन्हें नष्ट कर दिया जाए जिस से वे भोजन, पानी या दूसरे लोगों के बरतनों पर न बैठ सकें। हैजा, मलेरिया, महामारी, झिल्ली-प्रदाह आदि बीमारियों में रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। इस प्रकार की बीमारियों की अवस्था में रोगी को छूत की बीमारियों के अस्पताल में जाना चाहिए। परन्तु रोगी चाहे कहीं भी रहे उसका कमरा अलग होना चाहिए और उन लोगों के अति-

रिक्त जो उस की देखभाल कर रहे हों, किसी को भी उस में नहीं घुसना चाहिए। रोगी के बरतन आदि उसी के कमरे में रखे रखने देना चाहिए और उन को प्रयोग होने के पश्चात् हर बार उन्हें खालिते हुए पानी से साफ कर लेना चाहिए। नर्स को भी बार-बार अपने हाथ धोने चाहिये और उस रोगी वाले कमरे में भोजन नहीं करना चाहिए।

रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर देने वाली कोई वस्तु मिलाए बिना ही रोगी के मल-मूत्र को इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। उस के धुक और नाक की बन्दगी में भी रोगोत्पादक कीटाणु होते हैं; अतः रोगी को कागज के टुकड़ों में धुकना और नाक साफ करना चाहिए और फिर इन कागज के टुकड़ों को जला देना चाहिए।

रोग के कीटाणुओं से अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आदमी को इस बात में बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि भोजन किसी प्रकार से बन्दू न होने पाए। नौदियों तालाबों और कुओं के पानी में प्रायः विषले कृमि होते हैं। अतः पीने से पहले पानी को उबाल लेना चाहिए। बज्जर या फेरी वाले से खरीदे हुए फल को साफ कर के और छील कर खाना चाहिए।

अपनी त्वचा को प्रत्येक प्रकार की चाँट से बचा कर रखना चाहिए। चाँट लगने पर तत्क्षण टिंचर लगाइये या साबुन से धोइये। अपने पहनने के कपड़ों को दूसरे-तीसरे दिन धोना चाहिए और बिस्तर को साफ रखना चाहिए जिस से कोई खटमल या जंजीर आदि न आ सके। जहाँ मच्छर हों, वहाँ बिस्तरे के ऊपर मच्छरदानी लगाइये जिस से मच्छर आप को काट न सकें।

इस प्रकार के सभी बचाव करने पर भी कभी-कभी रोग के कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। परन्तु उस बीद्वमान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिये जिस ने हमारे शरीर को वह शक्ति दी है कि यदि रोग के कीटाणु अधिक संख्या में न हों या अधिक विषले न हों, तो शरीर उन्हें स्वयं ही नष्ट कर सकता है। बीमारों को रोकने की क्षमता और विषले कृमियों को नष्ट करने की शक्ति खून में होती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा खाना न खाए और साफ हवा में सांस न ले, या इतना काम करे कि थक जाए, या शराब और तम्बाकू पीता हो, या स्त्री-सम्बन्ध बहुत करे, तो खून की कीटाणुओं को रोकने की और कीटाणुओं को मारने की शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः रोगों से अपने शरीर को बचाए रखने के लिए यह बात बहुत ही आवश्यक है कि भोजन स्वच्छ हो, साफ हवा में सांस लिया जाए, रात को पूरे आठ घंटे सोया जाए, मीठे या तम्बाकू का किसी भी रूप में प्रयोग न किया जाए, और शुद्ध व नीतिक जीवन व्यतीत किया जाए। इस प्रकार शरीर दृष्ट-पुष्ट और शक्तिशाली रहेगा और रक्त रोग के उन कीटाणुओं को नष्ट करने योग्य होगा जो समय-समय पर किसी-न-किसी प्रकार शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।




आप की शत्रु—मक्खी

मक्खी बहुत छँटा-सा कीड़ा है, तो फिर यह मनुष्य को कैसे मार सकती है ?

मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान को विष ले जाती है और इस प्रकार लोगों की हत्या का कारण बन जाती है। यद्यपि मक्खी दक्षिण एशिया में प्रति वर्ष लाखों लोगों को मार डालती है, परन्तु फिर भी बहुत कम लोग मक्खी पर सन्देह करते हैं।

मक्खी द्वारा छेने वाली भयानक हानियों को समझने के लिए मक्खी की जीवन-संबंधी बातों और उसकी आदतों को समझने आवश्यक है।



मक्खी का शारीरिक विकास

१. मक्खी के एक दिन में दिए हुए अंडे। २. अंडे से बाहर निकलने पर मक्खी का प्रारम्भिक आकार। ३. कोशस्थ अवस्था—पंख निकलने से पहले की स्थिति (तीन से पांच दिन तक)। ४. कोश में से निकली हुई मक्खी। ५. पूर्ण रूप से विकसित मक्खी। ६. शारीरिक विकास-चक्र पूर्ण हो चुका, और अब मक्खी उड़ कर एक नई पीढ़ी की उत्पत्ति में प्रयत्नशील होने वाली है। (यह सब कुछ केवल सात से पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर हो सकता है।) ७. मक्खी की टांग।

मादा मक्खी अंडे देती है और ये अंडे कृमि बन जाते हैं और फिर ये ही बड़. कर मीकखियां बन जाते हैं । अंडे देने के समय से लेकर मक्खियों की नई पीढ़ी बनने तक दस से चौदह दिन लगते हैं । एक मादा मक्खी कम-से-कम १२० अंडे देती है और १५ दिन में इन अंडों से १२० मीकखियां पैदा हो जाती हैं । इस से पता चलता है कि कुछ महीनों में एक मक्खी से लाखों मीकखियां पैदा होती हैं ।

साधारण मक्खी के अंडे देने का मुख्य स्थान घोड़े, की लीद या गाय-बैल का गोबर आदि है । मीकखियां मनुष्य के मल, सड़े, गले पदार्थों और सब प्रकार के कूड़े, कचरे पर भी अंडे देती हैं । अतः यह कहा जा सकता है कि जहाँ पर गन्दा इकट्ठा हो जाती है, वहीं पर मीकखियां अंडे दे देती हैं ।

मक्खी गन्दगी में सेई (अंडे में से निकाली) जाती है, गन्दा खाती है और गन्दे स्थानों में ही रहना पसन्द करती है । इस के झरिर और ६ पैरों में अनीगनत बाल हैं और प्रत्येक पैर में एक गोल गद्दी होती है । इन गद्दियों पर एक प्रकार का लसलसा व चिपकने वाला पदार्थ लगा रहता है । यदि यह चिपकने वाला पदार्थ उसकी टांगों पर न लगा होता तो वह छतों पर उलटी न चल सकती, जैसे कि अब चलती है । झरिर और टांगों पर अनीगनत बाल होने के कारण और पैरों में यह चिपकने वाला पदार्थ लगा रहने के कारण मक्खी रोग के कीटाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में अद्भुतीय कीडा है । यह खाद के ढेर, खुली टाट्टियों, सड़ते हुए पदार्थों, खुले घावों आदि पर घूँट-घूँट कर उड़ती हुई लोगों के घर में भोजन पर आ बैठती है, दूध पीती है, बच्चों के मुँह तथा आँखों पर बैठती है, और इस प्रकार जहाँ कहीं जाती है अपने साथ कीटाणु ले जाती है । मक्खी आँखों का दुखना, अविस्तार (पतले दस्त), आँत्रिक-ज्वर तथा हँजा आदि रोगों को फैलाती है ।

प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि मीकखियों के उत्पाति-स्थानों को नष्ट कर के उन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे, और अपने घरों के सिन्ड-की-दरवाजों पर जाली लगाए ताकि मीकखियां अन्दर न आ सकें और यदि किसी प्रकार आ जाएं तो उन को मार डालें । मक्खी मनुष्य का शत्रु है ! इस के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर दीजिए ।



दीर्घायु का रहस्य

प्राचीन समय के किसी महात्मा का कथन है कि मनुष्य मरता नहीं, बल्कि अपने को मार डालता है। यह कथन बहुत से लोगों के विषय में सत्य है। यह तो ठीक है कि एक-न-एक दिन सभी को मरना है, परन्तु फिर भी बहुत कम लोग स्वाभाविक जीवन के अन्त तक जीते हैं।

प्रत्येक जाति के ग्रंथों में उन लोगों का वर्णन है जो बहुत समय तक जीते रहे। कुछ तो साँ से ऊपर तक जीवित रहे। परन्तु साँ या इस से अधिक वर्ष की आयु को पहुँचने वाले इन सभी व्यक्तियों के विषय में यह ज्ञात है कि उन्होंने छोटी आयु से ही अपने स्वास्थ्य की देख-रेख आरम्भ कर दी थी।

बहुत से पुरुष और स्त्रियाँ युवावस्था में स्वस्थ और शारीरिक रूप से हृष्ट-पृष्ट होते हैं। जब उन्हें ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जिन से स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वे इस चेतावनी को हँसी में उड़ाते हुए कहते हैं—अरे, अभी तो जवानी है, हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँच सकती। जो परमात्मा सारे जगत् पर शासन करता है, उस ने एक ऐसा नियम बना दिया है जिस के अंतर्गत प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री का प्रत्येक कार्य आ जाता है। परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य जो कुछ बोएगा, वही काटेगा। यदि कोई मनुष्य गेहूँ बोता है तो उस को गेहूँ की फसल ही मिलेगी, यदि वह दाल बोता है तो उसे दाल मिलेगी। जो युवक जीवन में बुरी आदतों को बोता है वह अपने शरीर में रोग के बीज बोता है और यह बिल्कुल निश्चित है कि कभी-न-कभी वह रोग ही की फसल काटेगा अर्थात् रोगी हो जाएगा। १२ वें और १३ वें अध्याय में यह बताया गया है कि अधिक सहवास से और वीर्य के नष्ट होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन से आयु कम हो जाती है। अफीम और तम्बाकू के सेवन से ऐसे रोग का बीज बोया जाता है जिससे आयु घटती है।

इस पुस्तक को पढ़नेवालों में से बहुत से लोग अपनी युवावस्था को पार कर चुके होंगे और कदाचित् कुछ रोगग्रस्त होंगे। वे स्वाभाविकतया पछेंगे कि गत वर्षों में तो हम ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखना, तो क्या अब भी दीर्घायु की प्राप्ति की कोई आशा हो सकती? यह तो शरीर की अवस्था पर निर्भर है कि वह कब तक रोगग्रस्त हो चुका है और कब तक स्वास्थ्य की पुनःप्राप्ति के योग्य है। परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अपनी आयु को बढ़ा न सके, हाँ, खर्त यह है कि स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली सभी आदतों

को एक दम छोड़ना पड़ेगा और वे सभी आदतें छालनी पड़ेंगी जिन से आयु बढ़ती है। ऐसे बहुत से लोगों के उदाहरण हैं जिन के शरीर चालीस वर्ष या उस से अधिक की अवस्था में रोगग्रस्त थे परन्तु जिन्होंने अपनी आदतें सुधार लीं और तब फिर वे ७५ या ८० वर्ष तक जीवित रहे।

दीर्घायु की प्राप्ति के लिए मनुष्य को संयमी होना आवश्यक है।

दीर्घायु के लिए संयमी होना अति आवश्यक है। जो पुरुष और स्त्रियां सां वर्ष तक जीवित रहे वे हर प्रकार के असंयम से बचे रहे। वे खाने-पीने में भी संयमी थे। संयम के लिए विषय-इच्छा और खाने-पीने की इच्छा दोनों ही पर नियंत्रण आवश्यक है। क्रोध, ईर्ष्या तथा किसी के प्रति दुर्भावनायें शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं और आयु घटाती हैं। दयालु विचार और संतुष्ट मन मनुष्य को दीर्घ जीवी बनाते हैं। इस संसार पर शासन करने वाले तथा समस्त जीवन के मूल परमात्मा को ध्यान में रख कर जो व्यक्ति परिव्र विचार रखता है और अच्छे कार्य करता है, उस की आयु लम्बी होती है।

बृद्ध लोगों का भोजन

बृद्ध लोगों के लिये सर्वथा उपयुक्त भोजन ये हैं: चावल, हल्के उबले हुए अंडे, और दूसरी बार सेंकी हुई करकरी सी रोटी है। यदि दांत कमजोर हों, तो रोटी (टोस्ट) को गर्म पानी द्वारा नरम कर लेना चाहिए। फल अधिक मात्रा में खाने चाहिए। जब पके हुए फल उचित दामों पर न मिलें तो कच्चे ही खाने चाहियें। भाप से पकाये हुए या उबाले हुए फल भी बहुत लाभदायक होते हैं। केक-मिठाइयां आदि नहीं खानी चाहियें। बूढ़े, लोगों को जल्दी-जल्दी स्नान करना चाहिए। यदि त्वचा को स्नान के बाद तेजी से सूखे तौलिये से रगड़ा जाए तो शरीर सदा लगने से बचा रहेगा।

व्यायाम

दीर्घ जीवी होने के लिये प्रतिदिन व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर मशीन के समान है। यदि मशीन का उपयोग न किया जाए तो उस में जंग लग जाता है और यह बात सब जानते हैं कि जंग लगी हुई मशीनें जल्दी ही टूट जाती हैं। यदि कोई व्यायाम न करे तो शरीर कड़ा हो जाता है। वह चलने के लिए अपनी टांगों का उपयोग नहीं कर सकता। कुछ प्रसिद्ध लोग जो दीर्घ काल तक जीवित रहे, उन्होंने जीवन भर प्रतिदिन कसरत करने का अभ्यास बना लिया था और बहुत बूढ़े, हो जाने पर भी वे प्रतिदिन ताजा हवा में सर करने जाया करते थे।

शरीर के साथ-साथ मीस्तष्क को भी पढ़ने या वाद-विवाद द्वारा कसरत करानी चाहिए। यदि बूढ़े, लोग ऐसा करें तो वह बच्चों की सी बातें नहीं करेंगे, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं।

दीर्घायु के नियम

१. जिन कमरों में आप रहते हैं उन में स्वच्छ वायु का आवागमन रहे।
 २. काम और मनोरंजन दोनों ही खुली हवा में कीजिये।
 ३. छे सके तो बाहर सोइये।
 ४. लम्बी हवास लिया कीजिये।
 ५. अधिक भोजन न कीजिये।
 ६. मांस और मसालेदार खाना बहुत कम खाया कीजिये।
 ७. भोजन धीरे-धीरे और खूब चबा कर किया कीजिये।
 ८. प्रतीदिन एक या दो बार टूटी छे जानी चाहिये।
 ९. सीधे बैठिये, सीधे खड़े, रोहिये और सीधे चलिये।
 १०. दांत, मसूड़े, और जीभ प्रतीदिन ब्रश से साफ किया कीजिये।
 ११. विष या रोग के कीटाणु को शरीर के अन्दर न घुसने दीजिये।
 १२. अधिक काम न कीजिये। जब थक जाएं, तो आराम कीजिये। अपनी आवश्यकता के अनुसार सात से लेकर ९ घंटे तक सोया कीजिये।
 १३. क्रोध और चिन्ता से दूर रोहिये—मन शान्त रोखिये।
- (अमरीका के कुछ वैज्ञानिकों ने उपर्युक्त नियम उन लोगों के लिये बताए हैं जो स्वस्थ रहना तथा दीर्घ जीवी छेना चाहते हैं:)
- नोट: इन वैज्ञानिकों का कहना है कि मांस कम मात्रा में खाया जाए, परन्तु हमारे विचार में मांस बिलकुल ही न खाना और भी अच्छा है।

गर्भाधान तथा शिशु-जन्म सम्बन्धी समस्याएँ



मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में हमें विश्वसनीय लिखित विवरण बाइबल की 'उत्पत्ति' नामक पहली पुस्तक में मिला है। लिखा है कि परमेश्वर ने कहा—“हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएँ; और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगनेवाले जन्तुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उस को उत्पन्न किया, नर और नारी कर के उस ने मनुष्यों की सृष्टि की ---- और यहाँवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की गिट्टी से रच कर उस के नयनों में जीवन का ह्वास फूँक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया।”

‘उत्पत्ति’ नामक पुस्तक ही से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक पौधे और पशु को प्रजनन-शक्ति प्राप्त हुई जिस से वे अपनी-अपनी जाति को बढ़ाएँ और फूलें-फलें। मनुष्य के विषय में उस रचयिता ने कहा, “फूलों, फलों और पृथ्वी में भर जाओ।” वह सृष्टिकर्ता आसानी से पृथ्वी को असंख्य लोगों से भर सकता था परन्तु उस ने केवल दो ही को बनाया—एक पुरुष बनाया और एक स्त्री बनाई। परन्तु एक रूप से उस ने वह क्रियात्मक शक्ति मनुष्य को प्रदान की। अतः प्रजनन-क्रिया को कामाभिलाषाओं की पूर्ति का साधन मात्र नहीं समझना चाहिए, वरन् यह समझना चाहिये कि यह ईश्वरीय सृष्टि-कार्य के समान ही एक कार्य है।

गर्भाधान

बारहवें अध्याय में बताया जा चुका है कि मनुष्य को अतिशय सहवास से बचना चाहिये। यद्यपि पति और पत्नी का सहवास उचित और स्वाभाविक है, परन्तु उचित और स्वाभाविक तब ही तक है जब तक इसे नियम और तर्क के अन्तर्गत परिमित रखा जाए। इससे वे समझें कि यद्यपि भूख और प्यास दोनों ही स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं और इन को संतुष्ट करना उचित है, परन्तु सभी जानते हैं कि अधिक खान-पीने से क्षीन

होती है। इसी प्रकार कामेच्छा की पूर्ति स्वाभाविक और उचित समझ कर सीमा से परे चला जाना न तो ठीक है और न ही तर्क संगत है।

बार-बार बच्चे जनने से माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे विवाहित स्त्री-पुरुषों के लिए क्या उपाय है जो बच्चों की संख्या तो न बढ़ाना चाहते हों, परन्तु स्वाभाविक रूप से अपनी कामेच्छा की पूर्ति करना चाहते हों? साधारणतया स्त्री के लिए प्रीत मास कुछ घंटों की एक अल्प अवधि ऐसी होती है जिस में वह गर्भ-धारण कर सकती है। यह वह समय होता है जब परिपक्व डिम्ब डिम्ब-ग्रन्थि से मुक्त होता है। जिस स्त्री का रजः साव-चक्र २८ दिन का होता है उस में यह अवधि प्रीतमास रजः साव आरम्भ होने से १४ दिन पूर्व जाती है। विभिन्न स्त्रियों में इस अवधि में अन्तर होता है, यद्यपि अधिकंश स्त्रियों में होने वाले रजःसाव से पूर्व १० वें और १६ वें दिन के बीच कहीं भी आ जाती है। जब गर्भधान की इच्छा हो तो सहवास महीने के इन्हीं छः दिनों में होना चाहिए। इस के विपरीत यदि संतानोत्पत्ति की इच्छा न हो तो इस डिम्बमोचन-अवधि में सम्भोग से बचना चाहिये।

ध्यान रहे कि उपरोक्त विधि केवल उसी स्त्री पर लागू होती है जिस को नियमित रूप से हर अट्ठाईसवें दिन रजःसाव होता हो। जिन स्त्रियों का मासिक-धर्म-चक्र अट्ठाईस दिन से कम या अधिक का हो या जिन के मासिक-धर्म आरम्भ होने की तिथि प्रीतमास बदलती रहती हो, उन के लिए यह विधि विश्वसनीय और सफल नहीं कही जा सकती। (देखिये अध्याय १९)

गर्भाशय में शिशु का विकास

किसी स्त्री को गर्भ रहने ही वह डिम्ब जो राई के दाने से भी छोटा (एक इंच का १/१२५ वां भाग) होता है, बढ़ने लगता है। कुछ ही दिनों में वह छहत्तु का सा रूप धारण कर लेता है और लगभग उतना ही बढ़ा हो जाता है। चार सप्ताह में वह क्वत्तर के अंडे जितना बढ़ा हो जाता है। दूसरे महीने के अन्त तक वह मूनी के अंडे जितना बढ़ा हो जाता है और अब उस में मनुष्य के शरीर के से चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। कुछ ऐसी रक्त-वाहीनयां होती हैं जो उसे गर्भाशय के भीतरी भाग से जोड़ देती हैं; और माता जो कुछ खाती है वह पच कर उस की अपनी रक्त वाहीनयों द्वारा भ्रूण (गर्भाशय में बढते हुए शिशु) तक पहुंच जाता है और उसे बढ़ाता है।

कितने आश्चर्य की बात है कि छहत्तु जैसा जीव बढ़ कर २०६ होड़ड्यों, ५०० से अधिक मांस पींश्यों, आंख, कान, हृदय, मस्तिष्क आदि वाला मनुष्य बन जाता है! यह इस सत्य का एक और प्रमाण है कि परमेश्वर ने ही मनुष्य को रचा और वही इतने सूक्ष्म जीव को बढ़ा कर पूर्ण रूप से बिकसित शरीर प्रदान करता है। प्राचीन काल में दाऊद नाम का एक बड़ा बुद्धिमान राजा था। उस ने एक बार कहा था "हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं बड़े अद्भुत ढंग से रचा गया हूं। जब मैं गुप्त रीति से रचा जा रहा था, तो तुझ से छिपा नहीं था; क्योंकि तू ने ही मुझ में प्राण डाले हैं; तू ने ही मुझे मेरी माता के गर्भ में रचा था।"

गर्भधान-श्लोच की गणना करने की तालिका

January October	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	November
February November	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
March December	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
April January	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
May February	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
June March	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
July April	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
August May	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
September June	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
October July	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
November August	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
December September	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

प्रत्येक स्थान में ऊपर वाली पंक्ति का अंक गणितकर्त्तव्य की तारीख बताया है; उस से नीचे का अंक यह बताया है कि प्रसव की आशा कब तक हो सकती है। उदाहरण—यदि गणितकर्त्तव्य की तारीख मार्च १ थी, तो दिसंबर ६ को प्रसव की आशा करनी चाहिए।

चाँथे महीने के अन्त तक बच्चा पाँच इंच लम्बा हो जाता है। छठे महीने तक उस का वजन सवा सेंर हो जाता है। यदि छठे महीने के अन्त में ही उस का जन्म हो जाए, तो ऐसे शिशु के जीवित रहने की बहुत कम सम्भावना रहती है। आठ महीने (२५२ दिन) के अन्त तक शिशु का वजन २ से ले कर ३ सेंर तक हो जाता है और उस की लम्बाई लगभग आठ इंच हो जाती है। यदि इस समय शिशु का जन्म हो जाए और उस की बहुत अधिक देख-भाल की जाए, तो वह जीवित रह सकता है। नौ महीने के अन्त में (२८० दिन बाद), शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो चुकता है। इस समय उस का वजन तीन सेंर से ले कर पाँच सेंर तक होता है, और लम्बाई लगभग बीस इंच होती है।

गर्भावस्था की अवधि

गर्भावस्था २८० दिन तक रहती है। निम्नीलिखित विधियों द्वारा उस समय का अनुमान लगाया जा सकता है जब बच्चा पैदा होगा। पिछले मासिकधर्म के आरम्भ होने की तिथि से आगे के पूरे नौ महीने गिन लीजिए और उन में सात दिन जोड़ें, दीर्घायु, उदाहरणार्थ—यदि पिछला मासिक धर्म १ जनवरी को आरम्भ हुआ हो, तो अक्टूबर ८ के आस-पास बच्चा पैदा होगा।

एक और सरल सी विधि यह है कि पिछले मासिक धर्म के आरम्भ होने की तिथि से आगे के पूरे २८० दिन गिन लीजियें। परन्तु किसी भी विधि से विशुद्ध ठीक-ठीक तिथि ज्ञात नहीं की जा सकती। बच्चा अनुमानित समय से दो सप्ताह पहले भी पैदा हो सकता है और दो सप्ताह बाद भी।

गर्भावस्था के लक्षण

प्रश्न उठता है कि किसी स्त्री को अपनी गर्भावस्था का पता कैसे चलने ? तो कई एक ऐसे लक्षण हैं जिन से उसे इस स्थिति का ज्ञान हो सकता है। नियमित रूप से होते-होते जब किसी विवाहित स्त्री का रजःस्राव अवस्थान् बन्द हो जाए, तो बहुत सम्भव होता है कि वह गर्भवती हो गई हो, परन्तु पूर्ण रूप से निश्चित नहीं कि ऐसा हो ही; क्योंकि दूध पिलानी हुई स्त्री भी गर्भवती हो सकती है और शिशु के जन्म के पश्चात् मासिक धर्म के पुनः आरम्भ से पूर्व भी गर्भधान सम्भव है।

गर्भावस्था में भय-सूचक चिह्न

१. निरन्तर या जोर का वमन।
२. निरन्तर या तीव्र सिर-पीड़ा।
३. बार-बार सिर का चक्राना।
४. धुंधला दिखाई देना या अन्य दृष्टि-दोष।
५. चोहरे पर सृजन, विशेषकर आंखों के नीचे।

६. पेटों, गट्टों और अन्य अंगों पर सूजन ।
७. उदर के ऊपरी भाग में तीव्र पीड़ा ।
८. एक सप्ताह या इस से अधिक समय तक गर्भावस्था में भ्रूण का न हिलना-डुलना ।
९. योनी से रक्त बहना ।
१०. पेट में एंटेन और उस के साथ-ही-साथ पीठ के निचले भाग में दर्द ।
११. मन उदास-उदास रहना, और स्वभाव में परिवर्तन ।

गर्भवती होने के कुछ सप्ताह पश्चात् स्त्री का प्रति दिन सवरे-ही-सवरे जी मचलाने लगता है । विस्तर से उठते ही उस को वमन होने लगता है । यह दशा कई सप्ताह तक रह सकती है । गर्भावस्था का यह एक नाश्वर्य लक्षण है ।

गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में छातियां सख्त और बड़ी हो जाती हैं स्तनों के वृत्त बाहर को निकल आते हैं ।

गर्भावस्था के तीसरे महीने से पेट धीरे-धीरे बढ़ने लगता है ।

गर्भवती होने के लगभग साढ़े, चार महीने के पश्चात् स्त्री शिशु की गति को अपने गर्भाशय में अनुभव करने लगती है ।

गर्भवती स्त्री की देख-भाल

गर्भवती स्त्री को यथेष्ट मात्रा में पौष्टिक भोजन चाहिए क्योंकि उसे दो प्राणिजों के लिये भोजन करना पड़ता है, अपने लिये और अपने गर्भाशय में बच्चे के लिये । प्रतिदिन टट्टी का होना भी बहुत आवश्यक है । यदि स्त्री को कब्ज हो तो उसे अध्याय २५ में लिखे नियमों का पालन करना चाहिए ।

उसे हवादार कमरे में सोना चाहिए ।

गर्भवती स्त्री के लिए प्रतिदिन कोई-न-कोई शारीरिक व्यायाम करना भी आवश्यक है नहीं तो उस की पेशियां अशक्त और ढीली पड़ जाती हैं, बच्चा कमजोर होता और प्रसव काल में उसे भी बहुत पीड़ा होगी ।

उसे प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पीना चाहिए ।

उसे शराब, तम्बाकू, पान-मुपारी आदि के सेवन से बचना चाहिए ।

उस को स्वच्छ रहने के लिए बार-बार स्नान करना चाहिए ।

गर्भावस्था में विशेष कर अंतिम दो मास में सहजाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए और प्रथम सात महीनों में बहुत कम ।

प्रसव की तैयारी

जब प्रसवकाल समीप हो तो प्रसूता के कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए । दीवारों पर टंगा हुआ सामान उतार लिया जाए और दिवारों पर सफेदी कर दी जाए । फर्श को धोना चाहिए और यदि फर्श मिट्टी का हो, तो उसे अच्छी तरह से झाड़ू से साफ कर के कमरे के खेतों और फनीचर के नीचे चूना छिड़क दिया जाए । चारपाई और मेज के आतिरिक्त सारा सामान कमरे से बाहर निकाल दिया जाए । यदि मकान

में केवल एक ही कमरा हो तो साफ सुथरी चटाइयों को बीच में लटका कर स्त्री के प्रसव-गृह को दूसरे भाग से अलग कर दिया जाए। निम्नीलिखित वस्तुओं को प्रसूता के कमरे में प्रस्तुत रखना चाहिए :—

१. एक पाउण्ड या अधिक सोखने वाली रुई जो रक्त आदि को पोछने और बालक उत्पन्न होने के पश्चात् गर्दी बना कर यौन में रखने के काम आए।
२. बच्चा होने के बाद स्त्री के पेट पर बांधने के लिए नये सूती कपड़े की दो १० इंच चौड़ाई और ४ फुट लम्बी पीट्टियाँ।
३. धो कर या खोला कर साफ किए हुए पुराने कपड़े के टुकड़े। ये प्रसूता के नीचे रखे जाते हैं जिस से रक्त और दूसरे पदार्थों को सोख लें।
४. शिश्नु को लपेटने के लिए दो फुट लम्बा फ्लार्लिन या किसी और नर्म कपड़े का टुकड़ा। इसे अच्छी तरह साफ कर लेना और खोला लेना चाहिए।
५. बालक के पेट पर बांधने के लिए कपड़े की दो पीट्टियाँ। ये दो-दो फुट लम्बी और साढ़े चार-चार इंच चौड़ाई हों और इन्हें भी खोला लेना चाहिये।
६. साबुन और एक छोटा सा ब्रश जिस से दाईं या नर्स अपने हाथ साफ कर सके।
७. एक सेर पानी में एक चमच लाइसोल (Lysol) डाल कर दाईं के हाथ धोने के लिए इस का घोल तैयार कर लिया जाए।
८. एक या दो आँस बोरिक पाउडर। यह नाल को काट कर उसके ऊपर धरकने के काम आता है।
९. साफ कपड़े के छोटो-छोटो टुकड़े। इन को खोला लिया जाए। प्रत्येक टुकड़ा तीन इंच लम्बा और तीन इंच चौड़ा होना चाहिए और उसके बीच में इनका बड़ा छेद हो कि उस में नाल का ठूठ आसानी से घुस सके।
१०. चार छः आँस वाली बोरिक एसिड सोल्यूशन की बोतल। देखिये पीरीयुष्ट में उपचार नम्बर १; इस से बच्चे की आंखें और माता के स्तन-वृन्त धोए जाते हैं।
११. एक-आध आँस वाली अर्जिरोल (argyrol) के घोल की बोतल। इस में १/१० भाग अर्जिरोल को हो। इस से बालक की आंखें धोई जाती हैं। (देखिए उपचार नम्बर ३)।
१२. पंदा छेत ही बच्चों के शरीर को साफ करने के लिए थोड़ा सी वसलीन या थोड़ा सा भीठा तेल।
१३. थोड़ा सी सैफ्टी पिपे। ये मां और बच्चों के पेट की पीट्टियाँ बांधने के काम आती हैं।
१४. बच्चों के शरीर को पोछने के लिए नर्म और साफ कपड़े के कच्चे टुकड़े।
१५. सूत के दस-बारह तारों को अच्छी तरह बट कर धागा बना लिया जाए और इस के छः-छः या आठ-आठ इंच लम्बे दो टुकड़े कर लिए जाएं। ये नाल बांधने के काम आते हैं। गरम पानी में खोला कर एक अच्छी सी कैंची भी तैयार रखनी चाहिये।

यह सब सामान पहले से ही जमा कर लेना चाहिये, और सब खाली हुए कपड़ों को एक साफ सूथरे कपड़े में लपेट कर रखना चाहिये। इस सामग्री को बिना हथ थोके नहीं छूना चाहिए।

बच्चे और माता के लिये उस अवसर पर पहनने के कपड़े, और पलंग की चादरें, साफ होने की चाहिये और उन्हें धूल से बचाए रखना चाहिये।

यह बड़े, महत्व की बात है कि प्रत्येक वस्तु साफ सफूरी हो। जो बहुत से बच्चे ईश्वर में मर जाते हैं, उन में से अधिकतर पैदा होने के दो सप्ताह बाद ही मर जाते हैं। इस का कारण यह है कि बच्चों के पैदा होते समय सारे सामान को साफ सूथरा रखने में सावधानी नहीं बरती जाती। बहुत सी माताएं बच्चों को जन्म देने के पश्चात् बीमार हो जाती हैं और ज्वर बहुत दिनों तक उन का पीछा नहीं छोड़ता। इस का कारण भी यह है कि प्रसवकाल में सफाई पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता।

ज्योंही स्त्री को पता चले कि अब बच्चा पैदा होने का समय आ गया है, त्योंही उसे अपना बिस्तर तैयार करवा लेना चाहिए। समाचार पत्रों के कई रद्दी पन्ने, या प्लास्टिक की चादर गद्दे या चटाई पर बिछा दीजिये जिस से वह नीली न हो सके, उस के बाद उस पर साफ चादरें बिछाइये। रक्त सोखने के लिये पुराने गन्दे कपड़ों का प्रयोग कभी न कीजिये।

कई गैलन पानी उवाल कर साफ बरतनों में रख लेना चाहिये। इस में से कुछ पानी साफ चिलमीचियों और घड़ों में भर कर ऊपर से एक साफ कपड़ा ढंक दीजिये और ठंडा हो जाने दीजिये। एक छोटी सी मंज कमरे में रखनी चाहिये। इस मंज को खालीतै हुए पानी से धो कर जिस-जिस सामान की आवश्यकता हो उसे उस पर रख दीजिये। दो चिलमीचियां भी साबुन और गरम पानी से धो कर तैयार रखिये।

प्रसव

प्रसव के दो मुख्य लक्षणा हैं। पहला यह कि मोनी से लाल पदार्थ बाहर निकलता है और दूसरा यह कि प्रसव पीड़ाएं होने लगती हैं। वास्तविक प्रसव पीड़ाएं तो १५ मिनट तक होती हैं और ज्यों-ज्यों प्रसव काल समीप आता जाता है त्यों-त्यों ये जल्दी-जल्दी होने लगती हैं।

अच्छा तो यही होता है कि कोई अच्छी डॉक्टरनी मिल जाए, परन्तु यदि न मिल सके तो किसी ऐसी नर्स को बुलाना चाहिए जिससे बच्चे जनाने का काम आता हो। यदि अच्छी डॉक्टरनी मिल गई तो वह अपने आप हर बात का ध्यान रखेगी, परन्तु यदि न मिले तो निम्न अधिसूचनाओं पर चलना चाहिये।


किसी बाहर के आदमी को उस कमरे में नहीं आने देना चाहिए। नर्स या दाई के अतिरिक्त उस कमरे में दो से अधिक व्यक्ति न हों।

प्रसूता को गरम पानी से स्नान करना चाहिये। उस के पंड़ू और उत्पीत स्थान के अवयव साबुन और गरम पानी से अच्छी तरह धोने चाहिये। प्रसव काल में मूत्र जल्दी-जल्दी जाना आवश्यक है। यदि पिछले छः या आठ घंटों से टट्टी न गई हो तो

प्रसूता को नरम पानी का आनिमा देकर उस का पेट साफ करवा देना चाहिये । (अनीमे का प्रयोग करने के लिये देखिये अध्याय २१) ।

पहली प्रसव पीड़ा में प्रसूता जैसा मन चाहे बैठे रहे या लेटे जाए । जब पीड़ा अधिक तीव्र होने लगे तो प्रसूता को पलंग पर लेटे कर थोड़े ऊपर को समेट लेनी चाहिये । इस अवसर पर प्रसूता का खड़ा रहना या बैठना हानिकारक होता है । बच्चे को भी साफ रखना असम्भव है ।

नर्स या दाई को अपने हाथों और कोहनीयों तक बाहों को धो कर साफ रखना बहुत आवश्यक है । बाहों कोहनीयों तक नंगी होने चाहिए । उंगलियों के नाखून कटे हों, किसी चीज से उन के अन्दर का मूल निकाल दिया गया हो । केवल गर्म पानी और साबुन से ही हाथ धोना काफी नहीं । हाथों को छोटे ब्रश से रगड़ कर साफ करना चाहिये । नर्स या दाई को साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिये । एक बड़ा साफ एपरन पहनना लाभदायक है ।



नाल की सुरक्षा का यथोचित उपाय

प्रसव के समय स्त्री को कोई आर्षाधि न दीजिये, यह न सोचिये कि दवा से बच्चा जनते समय मां को सहायता मिलेगी । उसे किसी दवा की आवश्यकता नहीं; वह उस के बिना ही ठीक रहेगी । स्त्री के पेट को रस्सी या पलंग की चादर से न बांधिये । इस से सहायता के बदले बाधा ही लेती है । दाई या नर्स को प्रसूता की योनि में उंगली नहीं डालनी चाहिये । ऐसा करने से बहुत सम्भव है कि प्रसूता के अन्दर विष फैल जाए और उसे प्रसूत-ज्वर आने लगे ।


जब "पानी की धौली" पड़ती है तो बच्चे का सिर योनि के मुंह में से निकलता हुआ दिखाई देगा । यदि बच्चे की अवस्था ठीक है तो बच्चे का मुंह नीचे की ओर या मां की पीठ की तरफ होगा और सिर पहले बाहर आएगा । यदि सिर बहुत तीव्रता से निकल आए तो प्रसूता का "खरीर" दूरी तरह स्थिर जाएगा । इसलिए उधोही सिर दिखाई देने लगे त्योंही उस पर उंगलियां जमा लेनी चाहिए और फिर प्रत्येक बार पीड़ा के समय नीचे को दबाना चाहिये । बच्चे का सिर उस की छाती की ओर झुक जाता है जिस से वह योनि में से सुगमता से निकल आता है । सिर का पूरी तरह से बाहर निकलना कुछ मिनट के लिये एक जाता है । पीड़ा के बीच-बीच में पीछियों में छीलपन आता जाता है ।

जब यह ढीलापन आरम्भ होने लगने तो सिर को बाहर निकलने देना चाहिये। इस प्रकार से "श्रुरीर" चिपने का भय कम रहता है।

सिर निकलने के पश्चात् श्रुरीर के बाहर निकलने में थोड़ी देर लग जाती है। ज्योंही सिर बाहर निकल आए त्योंही बच्चे की गर्दन पर अपनी उंगलियां फेर कर देखिये कि नाल गर्दन में लिपटी हुई है या नहीं? यदि नाल गर्दन में लिपटी हो और उस में सांस न हो तो जल्दी ही बच्चा जना देना चाहिये। यदि नाल गर्दन में न लिपटी हो तो दाईं को सांखने वाली रुई या साफ कपड़े के एक टुकड़े से बच्चे की आंखें पोंछ देनी चाहिए और उस का मुंह खोल कर उसे भी साफ कर देना चाहिये।

जब बच्चा पैदा हो चुके तो उसे फलार्लन या नरम कपड़े में लपेट दिया जाए। उस के चेहरे पर लगा हुआ खुन पोंछ देना चाहिये। दाईं को बच्चे की प्रत्येक आंख में दस प्रतिशत ऑर्जिल मिले हुए घोल की एक-एक बूंद डाल कर उस की आंखों को साफ कर देना चाहिये। यदि ऑर्जिल न हो तो बच्चे की आंखों में योरिक एसिड के घोल की कुछ बूंदें डालनी चाहिये। हजारों बच्चे इसलिए अन्ध हो जाते हैं कि जन्म के समय उन की आंखें इस प्रकार नहीं धोई जातीं।

बच्चे के उत्पन्न होने ही दाईं की सहायता करने वाली स्त्री को अपना एक हाथ प्रसूता के पेट पर रख कर गर्भाशय को पकड़ लेना चाहिये। टटोलने पर गर्भाशय एक कड़वा डेला सा लगेगा। उसे धीरे-धीरे दबाया जाय। एक क्षण के लिए भी वह वहां से अपना हाथ न हटाए क्योंकि इस प्रकार दबाने से गर्भाशय सिकुड़ता है और रक्त प्रवाह बन्द हो जाता है।



हाथ से दबा कर गर्भाशय को संकुचित करने की एक रीति।


ज्यों ही नाल में थडकन बन्द हो जाए त्यों ही उसे बांध कर काट देना चाहिये। दो टुकड़ों का प्रयोग इस अवसर पर करना चाहिये। इन दोनों टुकड़ों और नाल को कटने वाली कैची को पहले एक बरतन में डाल कर अच्छी तरह उबाल लेना चाहिये। जब तक उन की आवश्यकता न पड़े, तब तक उन्हें गरम पानी में ही रहने देना चाहिये। नाल को काट कर अच्छी तरह कस कर बांध देना बहुत आवश्यक है। इस में चूक न कीजिये। न तो कुछ मिनटों तक पानी में खालाए बिना किसी यंत्र को नाल काटने के क्रम में लाना चाहिये और न ही कुछ मिनटों तक पानी में खालाए बिना धागे की छेरी का नाल बांधने में प्रयोग करना चाहिये। इन वस्तुओं के न खालाए जाने से ही शरीर में विषैले कृमि प्रवेश कर जाते हैं और हनुस्तम्भ या जम्बू (Tetanus) या अन्य इस प्रकार के रोग लग जाते हैं।

ज्यों ही नाल कट जाए त्यों ही उसके सिर पर थोड़ा-सा बोरिक एसिड पाउडर छिड़क देना चाहिये और फिर ठूठ पर कपड़े का एक टुकड़ा रख दिया जाए। कपड़े का यह टुकड़ा पहले ही से कई मिनट तक पानी में खाला कर तैयार रखना चाहिये। (देखिये परिशिष्ट, उपचार नम्बर ४)। इस कपड़े के छेद में से नाल के ठूठ को निकाल लिया जाए और फिर कपड़ा उस पर तह कर दिया जाए। इस कपड़े को इसी स्थान पर रखने के लिये बच्चे के शरीर के चारों ओर एक पट्टी लपेट दी जाए और बच्चे को गरम व सूखे स्थान पर दाईं करबट से लिटा कर मां की देख-भाल की जाए। बच्चे के जन्म के थोड़ी देर बाद ही कमल (Placenta) बाहर निकल आता है। नाल के छोर को न खींचिये और उस पर कोई चीज न बांधिये। यह सोचना भूल है कि नाल का फिर मां के पेट में चले जाने और उसे कष्ट पहुँचने का भय रहता है। जो स्त्री गर्भाशय को पकड़े, हों उसे चाहिये कि जोर से दबाए रखे। अधिक जोर भी नहीं लगना चाहिये। इस से रक्त का निकलना बन्द हो जाएगा और कमल भी बाहर निकल जाएगा।

कमल के निकलते ही १५ इंच चौड़ी एक मोटी सी पट्टी उदर पर कस कर बांध देनी चाहिये और उस के दोनों सिरों में पिनें लगा देनी चाहिये या इन सिरों में सिली हुई छेरियों से बांध देना चाहिये। यह एक चौड़ी पट्टी का काम देनी और पेट को दबाए रखनी।

ज्यों ही बच्चे को माफ कर के कपड़े पहना दिए जाए त्यों ही साधारण नियम के अनुसार उसे मां की छाती से लिपटा देना चाहिये, क्योंकि जैसे ही वह मां का दूध पीने लगेगा बस ही गर्भाशय छोटा हो कर कड़ा हो जाएगा। इस से गर्भाशय से रक्त बहना बन्द हो जाएगा। उदर में पट्टी बांधने से पूर्व सब रीते कपड़े और पलंग का विस्तार निकाल लेना आवश्यक है और स्त्री के शरीर के जिस भाग पर खून लग गया हो उसे गरम पानी से धो कर सूखा लेना चाहिये। इस के बाद सोखने वाली टेर सी रुई या बहुत से कपड़ों को तहें कर के एक गद्दी सी बना कर उत्पीत स्थान के अवयवों पर रख दीजिये। इस गद्दी को एक फीते से बांध दीजिये। इस फीते का एक छोर उदर की पट्टी पर सामने हो और दूसरा पीछे और इन छोरों में पिनें लगा देनी चाहिये।

स्त्री को कई दिन तक चुपचाप चारपाई पर लेटे रहना चाहिये। उत्पीत-स्थान के अवयवों पर रक्खी गद्दी को जल्दी-जल्दी बदलते रहना चाहिये। इन अवयवों को जल्दी-जल्दी धोना आवश्यक है।



जो बच्चा जन्म लेते ही सांस न लेने लगे, उस के लिए "कृत्रिम स्वासन" की एक विधि। चित्र में दिखाए हुए ढंग से बच्चे को हाथों में पकड़ लीजिये, और धीरे-धीरे उस के कर्तोर को दोहरा करती जाइये जिस से केन्द्र में की हवा दब कर बाहर निकल जाए; फिर धीरे-धीरे उस के कर्तोर को सीधा करती जाइये जिस से हवा केन्द्र में भरती जाए। इस क्रिया को इसी क्रम से एक मिनट में लगभग दस बार किया जाए।

बच्चे के जन्म के छः सात घंटे पश्चात् स्त्री को पंखाब करना चाहिये। यदि इतनी देर में उसे पंखाब न लगे तो एक बच्चा सा तौलिया गरम पानी में डुबा कर निचोड़ लिया जाए और फिर उस को कहीं तहें बना कर पेंडू और उत्पीत-स्थान पर रक्खा जाए। बच्चा होने के एक दिन बाद ट्यूटी भी लेनी चाहिये; यदि ऐसा न हो तो रेचक-औषधि देनी चाहिये।

बच्चे के जन्म के पश्चात् मां साधारण भोजन खा सकती है। एक या दो दिन तक ठंडा खाना नहीं खाना चाहिये। मां को अच्छी तरह पका हुआ और चावल, अंडे, दूध, हबलरंटी, आलू, मछली, पके हुए फल आदि पोष्टिक भोजन मिलना चाहिए।

जब बच्चा श्वास न ले तो क्या करना चाहिये

साधारणतया बच्चा पैदा होते ही, रोने लगता है और सांस लेने लगता है। यदि बच्चा न रोए और न ही सांस ले बालक चुपचाप पड़ा रहे या धीरे-धीरे श्वास ले, तो उसे जल्दी ही सांस लेने पर बाध्य करना चाहिये। इस सम्बन्ध में जो भी उपाय किये जा सकत हैं उन्हें शीघ्र ही करना चाहिए। उंगली में एक पतला साफ सा कपड़ा लपेट कर बच्चे के मुँह और गर्ले में डाल कर उसे साफ कीजिये। अंगूठे और उंगली में पतला सा कपड़ा लपेट कर बच्चे की जीभ साफ कीजिये। एक मिनट में दस बार उस की जीभ धीरे-धीरे खींचिये। जब यह किया जा रहा हो तो दूसरा व्यक्ति बालक के चूतड़ों पर कपड़ा मारे या कपड़े को ठण्डे पानी में भिगो कर बच्चे की छाती पर धीरे-धीरे मारे। इन उपायों से शीघ्र ही उसे श्वास आने लगेंगा। ज्योंही बच्चे को श्वास आने लगे, त्योंही कपड़े को एक टुकड़ा सेक कर बच्चे को उस में लपेट लिया जाए।

यदि ऊपर लिखे उपायों से बच्चे को सांस न आए तो उस की नास को जल्दी ही काट कर उसे बांध देना चाहिये और "कृत्रिम श्वासन" का प्रयोग किया जाए। पृष्ठ १२१ पर चित्रों द्वारा इस विधि को समझाया गया है। इस विधि में गीत अधिक नहीं लेनी चाहिये, एक मिनट में दस या बारह बार से अधिक न हो। यह अधिक अच्छा होगा कि एक बरतन में गरम पानी भर लिया जाए। यह बरतन इतना बड़ा हो कि बच्चे को पूरी तरह इस में लिटाया जा सके। पानी का तापमान 104°F से कम न हो। "कृत्रिम श्वासन" का प्रयोग करते समय बच्चे के शरीर का जितना भाग हो सके उतना इस गरम पानी में डाले रखना चाहिए। शीघ्र ही आधा न छोड़ें, बीटए। यदि प्राणों के कुछ भी चिन्ह दिखाई दें, तो इस विधि को आध घंटे या इस से भी अधिक समय तक जारी रखना चाहिये।

प्रसव के समय अधिक रक्त-स्राव

बच्चे के जन्मते समय, ठीक उस के बाद और कमल निकलते समय कुछ रक्त सदा बहता है। परन्तु यह रक्त स्वाभाविक रूप में थोड़ा ही देर तक बहता है अधिक रक्त बहे तो प्रसूता को सदा लगे लगेनी है, उस को मुँह पीला पड़ जाता है और बोंछें भी लेने लगती है।

स्त्री के नितंबों के नचे थोड़ा सा बिस्तर लपेट कर रख दीजिये जिस से नितंब तीनक ऊपर उठ जाएं। गर्भाशय के उदर की भीतों पर से जोर से इस प्रकार पकड़ें कि गर्भाशय सिकुड़ जाए। जब तक रक्त का बहना बन्द न हो जाए, तब तक इसे इसी प्रकार पकड़ें, रीढ़से पकड़ें, ढीली न होने पाए। ठंडे-से-ठंडे पानी में कपड़े का एक टुकड़ा भिगो कर पेट पर रख दिया जाए। इसी प्रकार थोड़ा-थोड़ा घेर में कपड़े को पानी में भिगो कर उक्त स्थानों पर रखते रहना चाहिये। वीर पा कर रक्त बाहिनीयों सिकुड़ जाएंगी और रक्त बहना बन्द हो जाएगा। दो या तीन फिट की ऊँचाई से थोड़ा-थोड़ा पानी आमाशय पर डालिये। बच्चे को एकदम छाती से लगा दीजिये क्योंकि उस के दूध पीना आरम्भ करते ही गर्भाशय सिकुड़ने लगेंगा। यदि Ergot (आर्षक रूप में व्यवहृत राई वृक्ष के छत्रक के बीजाणु) का सत्व मिल सके, तो इस का एक चम्मच पिला दीजिये और फिर तीन-तीन घंटे बाद पिलाते रहिये। इस प्रकार के रक्त-स्राव के पश्चात् स्त्री को कुछ दिन तक चुप-चाप लेटे रहना चाहिये। किसी दवा में भी उसे बैठने या बिस्तर से बाहर न निकलने दीजिये।

प्रसव के बाद का ज्वर (प्रसूत ज्वर)

बच्चे को जन्म देने के पश्चात् मां को कुछ दिनों तक हल्का-हल्का सा ज्वर रहता है। यह ज्वर खतरनाक नहीं होता और तीन-चार दिन से अधिक नहीं रहता। परन्तु जो ज्वर बच्चे के जन्म के तीसरे या चारों दिन आरम्भ होता है वह गंभीर स्थिति का सूचक होता है। यूरार के साथ प्रसूता की नाड़ी भी बढ़ी तेजी से चलने लगती है (स्वाभाविक रूप से नाड़ी की गति एक मिनट में ७२ बार होने चाहिये) आरम्भ में ठंड लगना सम्भव है। आमाशय के निचले भाग में प्रायः थोड़ा दर्द होता है और यदि उस पर कोई दबाव डाला जाए तो पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। रिर दर्द होता है। जब ज्वर आरम्भ होता है, तो प्रायः गर्भाशय से होने वाला स्राव एक या दो दिन के लिये कम हो जाता है।

यदि प्रसव के समय प्रत्येक वस्तु की सफाई पर ध्यान दिया जाए तो यह प्रसूत-ज्वर नहीं होगा, क्योंकि यह ज्वर उन कृमियों के कारण होता है जो दाई के गंदे हाथों या उन गंदे चिपटों के द्वारा जो रक्त सोखने के लिए प्रसूता के नीचे और जननेंद्रिय पर रख दिए जाते हैं, गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं। यदि दाई अपने हाथ या कोई अज्ञात स्त्री की योग्यता में डालें तो यह दूध गर्भाशय में रोग कृमि प्रवेश कर जाते हैं और इस के परिणाम स्वरूप यह प्रसूत-ज्वर हो जाता है।

यह एक बहुत भयानक बीमारी है। अतः डॉक्टर को बुलाने में तीनक भी विलम्ब नहीं करना चाहिये। वह आवश्यकता के अनुसार रोग-कृमि-नाशक औषधियों (Antibiotics) का प्रयोग करेगा।

परिवार नियोजन

परिवार-नियोजन एक ऐसा विषय है जो आज संसार में सभी का समान रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा है। बहुत से देशों में जहाँ जन्म-वैग धीमा है वहाँ यह विषय राष्ट्र के लिये बड़ा महत्व का है ताकि वहाँ की आबादी जितनी है उतनी ही बनी रहे या अधिक हो जाए। दूसरे देशों में जहाँ जन्म-वैग बहुत अधिक है वहाँ राष्ट्र की मितव्ययता के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ की जनसंख्या के पालन-पोषण के लिये जन्म-वैग तथा कृषि योग्य भूमि के उत्पादन सामर्थ्य में संतुलन बना रहे। इतिहास साक्षी है कि क्रांति को जन्म देने वाली अधिकंश राजनीतिक उथल-पुथल भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में जनसंख्या की समस्याओं के कारण ही होती है।

परिवार-नियोजन का विषय राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु पारिवारिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। यहाँ यह समाज के उन व्यक्तिगत सदस्यों को सर्वाधिक प्रभावित करता है जिन से समाज का निर्माण होता है।

पिछले कुछ ही वर्षों में किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अपराधी वर्ग में से अधिकंश तथा बाल अपराधियों का आश्चर्यजनक रूप से बड़ा प्रतिशत आमतौर पर उन बड़े, कुटुम्बों या ऐसे परिवारों से निकलता है जिन में माता-पिता अपनी संतान की भली भाँति देख-रेख करने में असमर्थ होते हैं। प्रत्येक स्त्री या पुरुष के समक्ष प्रबल रूप में यह तथ्य उपस्थित कर के उसे दृढ़ विश्वास दिलाया जाए कि उस के लिये अपनी विवेक शक्ति तथा आत्म-नियंत्रण का प्रयोग करते हुए अपने परिवार को इस प्रकार नियोजित करना नितांत आवश्यक है कि इस जनत में लाए जाने वाले बालक सभ्यता के लिये अभिजापन न हो कर बरदान सिद्ध हों।

इस बात को समस्त विश्व में मान्यता प्राप्त है कि मनुष्य मात्र के बीच दो बड़ा शक्तिशाली कार्य कर रही हैं। हम उन्हें भलाई की शक्ति तथा बुराई की शक्ति कह सकते हैं। या हम उन्हें परमेश्वर का सामर्थ्य तथा शैतान का बल भी कह सकते हैं। जो भी संज्ञा हम इन दोनों शक्तियों को दें, इस बात को सभी लोग मानते हैं कि उन का अस्तित्व अवश्य है, और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध विपरीत हैं। विचार करने पर अनुभव हो जाता है कि जब कोई स्त्री और पुरुष बच्चों के लिये उचित भोजन, वस्त्र, शिक्षा की व्यवस्था करने और उन का उत्तरदायित्व-पूर्ण एवं लाभप्रद परिपक्वता के लिये पथ-प्रदर्शन

करने के सामर्थ्य से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं, तो वे ऐसे व्यक्तियों की अभिवृद्धि करते हैं जिन से बुराई की सेना का निर्माण होता है।

ऐसे बहुत से स्त्री-पुरुष मिलते-जोते अपने घर में बच्चों के होने की बड़ी इच्छा रखते हैं, परन्तु कुछ अज्ञात कारणों से उन के घर बच्चों की उपस्थिति से जानी-दत्त नहीं हो पाते। ऐसे लोगों के लिये परिवार-नियोजन की समस्या बहुत ही अधिक महत्व रखती है; वे क्या-क्या नहीं कर गजरते ! परिवार-नियोजन से संबंधित इस समस्या से बड़ा झोंक और अकथनीय दुःख उत्पन्न होता है।

कुछ लोगों में नर्भाधान रोकने के विचार पर भी विरोध पाया जाता है। ऐसा विरोध उन लोगों में इस विचारधारा के कारण उत्पन्न होता है कि किसी एक मत अथवा सिद्धांत विशेष का अनुसरण करने वाली जनसंख्या की वृद्धि में रुकावट डालने वाला कोई कार्य न किया जाए। संसार में धार्मिक-राजनीतिक दल हैं जो अपनी सदस्यता की बढ़ोतरी के निमित्त जन संख्या की वृद्धि में विश्वास करते हैं। ऐसे संगठन संख्या की गति को धीमा करने वाले प्रत्येक प्रयत्न का विरोध करेंगे। यद्यपि इस पुस्तक के प्रकाशक किसी को दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए तथापि उन का दृढ़ विश्वास है कि इस प्रकार की पुस्तक तब तक पूरी नहीं समझी जा सकती जब तक यह परिवार-नियोजन की समस्या की ओर ध्यान न दे और कुछ ऐसे सुझाव उपस्थित न करे जिन से संतान के सुख से वंचित घरों में भी बच्चों को खिलाने की इच्छा पूरी हो जाए।

कभी-कभी माता का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जाने से बचाए रखने के कारण भी न्यून आवश्यक हो जाता है कि बच्चों की संख्या सीमित रखी जाए, जिस से उस बचारी के प्राणों के लाले न पड़ जायें।

जैसा कि पिछले अध्यायों में कहा जा चुका है नये रजः साव के प्रारम्भ होने से पूर्व पन्द्रहवें दिन डिम्ब मुक्त होता है। यह तथ्य परिवार नियोजन के प्रत्येक रूप का ज्ञान रखने के लिये अत्यंत आवश्यक है। दूसरा मौलिक और याद रखने योग्य सिद्धांत यह है कि, डिम्बाणु उत्पन्न होने के थोड़े ही समय तक अपने अन्दर उत्पादक क्षमता बनाए रख सकता है। तीसरा मौलिक तथ्य यह है कि यद्यपि पुरुष के शुक्रकीट स्त्री की योनी में पड़ने पर आठ दिन तक जीवित या क्रियाशील गति में रहें, परन्तु वे समागम के उपरान्त ४८ घंटे से अधिक समय तक डिम्ब को फलोत्पादक बनाने योग्य नहीं रहते। इन तथ्यों से दो दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं: डिम्ब के विषय में यह निष्कर्ष निकलता है कि नर्भाधान केवल अगले रजःसाव से पन्द्रहवें दिन पूर्व होता है। दूसरा निष्कर्ष शुक्रकीट के विषय में प्राप्त होता है और वह यह कि चूंकि शुक्रकीट केवल ४८ घंटे तक क्रियाशील रहता है इसलिए डिम्ब की उत्पत्ति से ४८ घंटे या उस से कम समय पूर्व किये गए समागम के फलस्वरूप गर्भ स्थिति हो सकती है। इस प्रकार इस में संदेह नहीं कि अगले प्रत्यूहर्जन (रजःसाव) से पन्द्रहवें, सोलहवें या सत्रहवें दिन पूर्व समागम से नर्भाधान की सम्भावना हो सकती है।

संक्षेप में यह समीक्षार्थ कि किसी स्त्री में गर्भस्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक आगामी रजःसाव से १५, १६ या १७ दिन पूर्व उस के साथ समागम न किया जाए। कुछ अधिकारी ऐसा सुझाव भी दे सकते हैं कि इन दिनों से पूर्व और अन्त में सावधानी

के बतौर एक-एक दिन बटा दिया जाए; अर्थात् अगले रोजदरुन से पूर्व १४ बं, १५ बं, १६ बं, १७ बं, और १८ बं दिन के समागम से हिम्ब फलोंत्यादक हो सकता है।

जीवीवज्ञान के इसी सिद्धांत पर परिवार-नियोजन की 'समताल प्रणाली' (Rhythm Method) आधारित है।

परिवार की इच्छा रखने वाले प्रत्येक निस्सन्तान स्त्री-पुरुष को चाहिए कि इस तथ्य से लाभ उठावे और समागम केवल उन्हीं दिनों करें जिन दिनों गर्भाधान के लिये उपयुक्त समय हो और स्त्री में हिम्ब अनुकूल अवस्था में हो। इस प्रकार गर्भीस्थिति की अधिक सम्भावना हो सकती है। यदि इस से सफलता न मिले तो पति-पत्नी को चाहिए कि किसी योग्य चिकित्सक द्वारा अपने प्रजनन सम्बन्धी अंगों की सम्मक परीक्षा करवा लें। बांझपन पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी। बहुत बार स्त्रियों ही को बांझपन का अपराधी समझा जाता है परन्तु जांच करने पर इस का कारण पुरुषों में हो देखने को मिलता है। संभव है कि पुरुष में पर्याप्त मात्रा में शुक्रकोट उत्पन्न न हो रहे हों और यदि होते भी हों तो कमजोर या दोषपूर्ण शुक्रकोट ही होते हों। कोई स्त्रीयैक कीठनाई भी ऐसी हो सकती है जिस से पति-पत्नी में ठीक प्रकार बीजसंयोग न कर सकता हो, इस का भी ध्यान रखना उचित है। यह भी संभावना है कि उस व्यक्ति में किसी रोग का प्रभाव हो जिस का स्वयं उसे पता न हो और यही प्रजनन में बाधा उत्पन्न कर रहा हो। इसी प्रकार की संभावनाएँ स्त्री में भी हो सकती हैं और और यदि उपरोक्त उपाय सफल न हो सके हों तो पूरी तरह से डॉक्टरों की परीक्षा द्वारा कारण स्पष्ट हो जाएगा।

यदि माता-पिता अधिक कीठनाइयों के कारण या स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवार नियोजन चाहते हों तो उन्हें चाहिए कि ऊपर बताए हुए दिनों में समागम बर्जित कर दें क्योंकि इस सूची में दिये गए दिनों के अतिरिक्त अन्य दिनों में गर्भीस्थिति नहीं हो सकती।

अब तुरन्त यह प्रश्न उठता है कि अगला रोजदरुन कब हो सकता है क्योंकि उपरोक्त निर्देश में कहा गया है कि हिम्बमोचन अगले रजः सत्र से पन्द्रहवें दिन पूर्व होता है।

कुछ स्त्रियाँ रजःसत्र के चक्र को नियमानुसार पूरा करती हैं और हर २८ बं दिन नियमित रूप से रजस्वला हो जाती हैं। परन्तु यह सभी स्त्रियों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता। प्रयोगों से प्रकट हुआ है कि ९० प्रतिशत स्त्रियों के रजस्वला होने की पीरिड महीने में २८ दिन या इस से दो तीन दिन, दोनों दिशाओं में इधर-उधर हुआ करती है। चुनी हुई स्वस्थ स्त्रियों में प्रयोग किये गए हैं और यह पाया गया है कि ९७ उदाहरणों में रजोधर्म का चक्र नियमित था। इस समूह में से २२ प्रतिशत ठीक २८ बं दिन रजस्वला होती थीं, ३९ प्रतिशत हर बीसवें दिन और ११ प्रतिशत हर ३२ बं दिन रजोवती होती थीं। इस प्रकार स्वस्थ स्त्रियों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि नियमानुसार प्रत्युत्पत्ती होती है। घंटे २५ प्रतिशत स्त्रियों का रजःसत्र कभी आगे और कभी पीछे होता था परन्तु फिर भी आगे पीछे घटने या बढ़ने की यह अवधि भी नियम से ही चलती थी। केवल ३ प्रतिशत ही, चुनी हुई स्वस्थ स्त्रियाँ ऐसी निकलीं जिन के रजःसत्र में अधिक अनियमितता पाई गई।

यह एक तथ्य है कि अधिकांश स्त्रियाँ यह नहीं जानतीं कि रजःस्राव की परीक्षा कम पूरी होती है। कुछ स्त्रियाँ कहेगी कि हमें २८ दिन में रजःस्राव का एक चक्र पूरा कर लेते हैं, परन्तु यदि कई महीनों तक उन का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया जाए तो पता चलेंगा कि उन के रजोधर्म का चक्र २७ या २९ में अथवा बारी-बारी से २७, २८ या ३० दिन में पूरा होता है। अतएव प्रत्येक स्त्री को अपने मासिक धर्म के समय का ठीक-ठीक निरीक्षण करना आवश्यक है और यह जानलेना भी बहुत आवश्यक है कि कितने दिन के बाद रजःस्राव हुआ करता है। इस निरीक्षण के परिणामों का लेखा रखना चाहिये और कम-से-कम एक वर्ष तक निरीक्षण जारी रखना चाहिये। ठीक-ठीक प्रकार से ऐसा करने के लिये सम्बद्ध स्त्री को चाहिये कि वह स्वयं अपने रजोधर्म की एक तालिका निम्न रजःस्राव-तालिका के अनुसार नोट-बुक या किसी कागज पर तैयार कर ले।

रजःस्राव-तालिका

पहला खाना रजःस्राव के पहले दिन की तारीख का है। दूसरे रजोधर्म तक ठहरी रीहमें और पहले खाने में वह तारीख लिख कर सूची को चालू कर दीजिये। रजस्वला रहने की वास्तविक अवधि इस सम्बंध में कोई महत्व नहीं है। दूसरे रजःस्राव के आरम्भ होने की तिथि नीचे के अगले खाने में अंकित कर दी जाए। इस प्रकार वर्ष भर का लेखा तैयार हो जाएगा।

First Days of Menstrual Cycle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
August 1																																	
August 31																																	M
Sept. 30																																	M
Oct.																																	

इस के बाद पहिले रजःस्राव के आरम्भ होने से लेकर दूसरे रजःस्राव तक के दिन गिनने चाहिये। इस में पहले स्राव का पहला दिन शामिल कर लेना चाहिये, परन्तु दूसरे रजोधर्म का पहला दिन नहीं गिनना चाहिये। सूची में उस के नीचे ठीक वर्ष में 'M' अक्षर लिख देना चाहिये। उदाहरण के लिए मान लिया कि मासिक धर्म का पहला दिन अगस्त की पहली तारीख को पड़ता है और दूसरा रजोधर्म ३१ अगस्त को होता है तो पहली अगस्त के बाद ३१ अगस्त के नीचे के निश्चित खाली वर्ग में 'M' अक्षर बँसा ही लिख देना चाहिये जैसा कि ऊपर की सूची में दिखाया गया है। यदि सारे वर्ष का परिणाम एक ही निकले तो उस स्त्री को पता चल जाएगा कि मेरे मासिक-धर्म का आवर्तन नियमित रूप से ३० दिन का है। यदि इस के विपरीत वह समय २७, २८, २९ या ३१ दिन का निकले और प्रति मास ठीक उसने ही दिनों या समान रूप से बना रहे तो उस का रजःस्राव का आवर्तन 'सामान्य' (Simple menstrual cycle)

कहा जाता है। इसी प्रकार यदि पहिले महीने किसी स्त्री के रजःस्राव के बीच २७ दिन और दूसरे महीने ३० दिन का अन्तर पड़े और वर्ष पर्यन्त यही क्रम जारी रहे तो उस का "द्विगुणित रजःस्राव आवर्तन" (Double menstrual cycle) कहा जाता है। किसी-किसी स्त्री के "त्रिगुणित आवर्तन" (Triple cycle) या "चतुर्गुण-आवर्तन" (quadruple cycle) भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी भी स्त्रियाँ हैं जिन का रजःस्राव अस्थान्त अनियमित ढंग से होता है।

यह मान लेने पर कि रजःस्राव प्रति तीसवें दिन आरम्भ होता है, यह निश्चय हो जाता है कि डिम्बमोचन भी हर तीसवें दिन होता है, और मासिक-धर्म की उपरोक्त तालिका में 'M' अक्षर अंकित करने के दिन को सम्मिलित करते हुए १५ दिन पूर्व एक झून्च रख देना चाहिये। यह वह दिन अंकित कर देना जिस दिन डिम्बमोचन होता है। इस प्रकार यदि कोई स्त्री प्रति तीसवें दिन रजस्वला होती है तो उस का रजःस्राव तालिका के अनुसार उस में रजोधर्म के मास की सोलहवीं तारीख को डिम्बमोचन होता है जैसा कि ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट हो जाता है। (देखिए पृष्ठ १२९) (A) यदि २७ दिन के बाद, रजःस्राव हो, तो उस की तालिका के अनुसार १३वें दिन डिम्बमोचन हुआ। (B) इसी नियम से यदि वह स्त्री ३२ दिन के बाद रजस्वला होती है तो १८ वें दिन पूर्व उस में डिम्बमोचन होता है। (C) यदि ३१ ता. को रजःस्राव हुआ तो निम्न-लिखित सूची के अनुसार उस में १७ वीं ता. को डिम्बमोचन हुआ होगा।

अब हम इस सारी समस्या के वास्तविक कोटन प्रसंग पर पहुँचते हैं। कोई भी पाठक इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि यह निर्णय करना बड़ा कठिन कार्य है कि जिस स्त्री में द्विगुणित या बहुगुणित 'रजःस्राव आवर्तन' (Double or Multiple menstrual cycle) होते हैं उन में डिम्बमोचन कब होता है।

फिर भी यदि उस स्त्री को पता हो कि मेरे रजःस्राव के दिनों का अधिकतम अन्तर ३० दिन और न्यूनतम अन्तर २६ दिन रहता है और यदि उस ने एक वर्ष तक इस का ठीक-ठीक व्यापार रक्खा हो (देखिये सूची D), तो यह अपने गर्भबीज प्रकट होने की तारीख निम्न प्रकार मालूम कर सकती है। मेरा पिछला रजःस्राव २९ जुलाई को प्रारम्भ हुआ। यदि मेरा अगला चक्र अधिकतम ३० दिन का हुआ तो मेरे अगले रजःस्राव का दिन २८ अगस्त और डिम्बमोचन का दिन १३ अगस्त होगा। अन्तः, यदि मेरा आगामी चक्र न्यूनतम २६ दिन का हुआ तो अगला रजःस्राव का दिन २४ अगस्त होना चाहिये और इस दृष्टा में डिम्बमोचन का दिन ९ अगस्त होना चाहिये। अतएव मेरे गर्भबीज उदय होने का दिन नौ और १३ अगस्त के बीच पड़ना चाहिये। निश्चय ही यदि उस स्त्री का दैनिक अंतर प्रस्तुत उदाहरण से अधिक हो तो अपने तर्क में उसे भी स्थान देना चाहिए।


जो कुछ कहा गया है उस से स्पष्ट है कि जिन स्त्रियों के रजःस्राव का एक ही सामान्य चक्र (Simple menstrual cycle) होता है, वे अपने डिम्बमोचन का दिन ठीक-ठीक गिन सकती हैं। जिन के दो या अधिक चक्र होते हैं वे केवल उस अवधि का हिसाब लगा सकती हैं जिस में डिम्बमोचन होता है। अधिकतम तथा न्यूनतम दिनों वाले चक्रों (Maximum and minimum cycles) के बीच का अंतर कम हो तो हिसाब भी ठीक प्रकार लगाया जा सकता है। यदि इन के बीच का अंतर अधिक हो तो कम परिशुद्धता होगी अन्तः,

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
A												O														M						
B																	O														M	
C																	O													M		
D											O				O											M			M			

यदि कोई दम्पति संतान के अत्यंत इच्छुक हों, तो उन के लिये गर्भबीज तालिका बना कर उस का ठीक-ठीक अनुसरण करना नितांत आवश्यक है। अतएव एक और उदाहरण लीजिये।

मान लिया किसी स्त्री (E) ने एक वर्ष तक बड़ी सावधानी से तालिका बना कर रख छोड़ी है और उस ने पता लगाया है कि मेरे रजःस्राव का चतुर्गुण चक्र (quadruple cycle) है जिन में २५, २९, ३० और ३३ दिन के चक्र हैं। मान लिया कि उस का पिछला रजःस्राव १ अप्रैल को हुआ। अब वह पता लगाना चाहती है कि आने अगली बार डिम्बमोचन कब होगा। जो कुछ अभी तक कहा जा चुका है उस से वह जानती है कि मेरे संबंध में अधिकतम और न्यूनतम दिनों के चक्र ही अधिक महत्व के हैं। अर्थात् २५ और ३३ दिन के चक्रों से वह हिमाव लगा सकती है। अतः वह इस प्रकार विचार करेगी: "मेरा रजोधर्म पहली अप्रैल को आरम्भ हुआ था। मेरा सब से छोटा चक्र २५ दिन का है। संभव है मेरा रजःस्राव का दिन २० तारीख को पड़े, और इस हालत में १२ की तारीख को डिम्बमोचन होना चाहिये; परन्तु चूंकि मेरा चक्र परिवर्तनशील है, अतः मेरा वर्तमान चक्र (cycle) संभवतः ३३ दिन का है जो प्रत्यक्ष रूप से मेरा सब से बड़ा चक्र है। ऐसी दशा में मेरा आगामी रजःस्राव ४ मई को आरम्भ हो सकता है और तदनुसार बीस अप्रैल को डिम्बमोचन होना चाहिये।" इस प्रकार उसे निश्चय हो सकता है कि डिम्बमोचन १२ और २० अप्रैल के बीच होगा। अब यदि उसे संतान की बड़ी अभिलाषा है तो उसे और उस के पति को निम्न लिखित तालिका के अनुसार १० और २० अप्रैल के बीच की तिथियों में समागम की योजना बनानी चाहिये। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि अभी बताए हुये चक्र (cycle) के अंतर वाली स्त्री के पास एक महीने में १३ दिन की अवाधि गर्भधारण करने की हो सकती है जब कि दूसरी स्त्री (F) जिस का केवल एक ही सामान्य रजःस्राव चक्र (Simple menstrual cycle) है, महीने में केवल ५ ही दिन तक गर्भधारण करने योग्य हो सकती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को चाहिए कि केवल उन्हीं दिनों समागम करें जिन दिनों स्त्री में गर्भधारण की योग्यता हो।

अस्तु, यह याद रखना आवश्यक है कि मासिक धर्म के चक्र में निश्चित तौर से शारीरिक चोटों, श्लथ चिकित्साओं, बीमारियों, वृत्रातों और गंभीर प्रकार की मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल के कारण उलट-फेर हो सकता है, और उन पति-पत्न को जो "समताल प्रणाली" (Rhythm method) के आश्रित रहते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी अवस्थाओं में रजःस्राव और उसी के अनुसार डिम्बमोचन का समय भी गलत ढंग से बदल सकता है। अतएव ऐसी अवस्था में नियमित रूप से रजःस्राव चक्र के लाटने तक कोई



हिम्बमोचन सम्बन्धी तालिकाएं

- A. २६ दिन का चक्र
- B. ३१ दिन का चक्र
- C. ३२ दिन का चक्र
- D. परिवर्तनशील चक्र (२६ से ३४ दिन तक)

तालिका में जिन तिथियों पर "स्याही फेर दी गई है" वे, वे तिथियां हैं जिन को २६ और ३४ दिन के अन्दर हेर-फेर कर के रजस्वला होने वाली स्त्री में हिम्बमोचन होगा। विदित तिथियों के बीच किसी अन्य तिथि को भी हिम्बमोचन हो सकता है।

हिम्बमोचन की तिथि पर स्याही फेर दी गई है। जिन तिथियों पर हल्की स्याही फेरी गई है उन को गर्भधान की अधिक सम्भावना रहती है। प्रत्येक दशा में, पहला, और तीसरा कि। ही रजःसाव का दिन है।

ऐसा आधार नहीं है जिस के अनुसार हिम्बमोचन के दिनों का एकत्र निर्णय किया जा सके। ऊपर बताये हुए कारणों के अतिरिक्त स्त्रियों आदि से सम्बन्धित कठिन शारीरिक परिश्रम, भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु में सम्बन्धी यात्रायें, पर्वतारोहण इत्यादि भी शामिल किये जा सकते हैं। यदि रजःस्राव-चक्र के पूर्वाद्ध में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए तो हिम्बमोचन में बिलम्ब हो जाता है। यदि यह घटना उत्तराद्ध में हो तो रजःस्राव समय से पूर्व ही हो सकता है।

पति-पत्नी को यह भी जान लेना चाहिए कि रजःस्राव का चक्र विवाह के बाद बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। बच्चे को जन्म देने के बाद भी यह बदल सकता है, परन्तु जरूरी नहीं कि बदल ही जाए। कभी-कभी बच्चे के जन्म के उपरान्त प्रारम्भ में रजःस्राव-चक्र बहुत लम्बे होते हैं, परन्तु क्रमशः अपनी सामान्य अवस्था को लाट आते हैं। जटाएय रजोधर्म के आवर्तन चक्रों (menstrual cycles) के स्वभाव को समझने के लिए बच्चे के जन्म के बाद कम-से-कम चार चक्रों का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए क्योंकि गर्भाधान के दिनों का ठीक-ठीक क्रिसाव लगाने के लिए इस की अत्यन्त आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रसव के बाद रजःस्राव के चक्रों का समय गर्भावस्था से पूर्व की ही भाँति रहे तो वह स्त्री अपनी पहली बच्ची बनाई हुई हिम्बमो-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
E											O								O						M									M
F												O															M							

चन की सूची का विश्वास के साथ प्रयोग कर सकती है। परन्तु यदि उसके चक्र आगे-पीछे, कभी छोटे कभी बड़े, हों, जिस से यह प्रकट हो कि कभी उस के हिम्बमोचन अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के योग नहीं हुए, तो उसे चाहिए कि जब तक उसके चक्र अपनी पुरानी अवस्था को न प्राप्त हो जाएँ, या जब तक नए चक्र (cycle) का निर्धारण न हो जाए, तब तक प्रतीक्षा करे।

इन विषयों में किसी भी स्त्री को अपनी स्मृति के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर बचाई गई प्रणाली का बहिष्मतापूर्वक प्रयोग करने का संभव रीति यही है कि सम्बद्ध स्त्री, सुझाए हुए ढंग के अनुसार अपनी तालिका बिल्कुल सही ढंग से बना ले।

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि हाल ही में एक बड़ी संख्या में जिन स्त्रियों का अध्ययन किया गया उन में से बहुत सी ऐसी थीं जो कि अपने रजःस्राव चक्र के किसी भी दिन गर्भधारण कर सकती थीं। अस्तु, जैसा कि इस अध्याय के पिछले पृष्ठों में कहा जा चुका है, सन्तान की उत्कट अभिलाषा रखने वाले लोगों को चाहिए कि बहिन भर स्त्री-प्रसंग पर रोक लगाकर उसे केवल उन्हीं दिनों के लिए सीमित कर दें जिन दिनों पत्नी में गर्भाधान की संभावना अधिक होती है।

छोटे बच्चों की देख-रेख



एक सम्प्रदाय में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक साँ बच्चों में से पचहत्तर एक वर्ष की आयु को पहचानने से पूर्व ही मर जाते हैं। उस सम्प्रदाय के पड़ोसी सम्प्रदाय में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक साँ बच्चों में से केवल पाँच ही एक वर्ष की आयु को पहचानने से पूर्व मरते हैं। इन दो सम्प्रदायों के बच्चों की मृत्यु-संख्या में इतना भारी अन्तर होने का कारण यह है कि एक में माता-पिता अपने बच्चों की उचित देख-रेख नहीं करते, परन्तु दूसरे में बच्चों की देख-भाल उचित रीति से की जाती है। एशियाई देशों में तो यह हाल है कि बहुत से शिशु बारह महीने के हों नहीं पाते कि मर जाते हैं। समाज को पहचानने वाली इस भयंकर हानि को रोका जा सकता है, क्योंकि इस का कारणा है बच्चों के जन्म के समय सफाई न रखना, कुछ ही महीने के शिशु को ठोस खाद्य-पदार्थ—विशेषकर मांस, कच्चे खरबूजे-तरबूज, तरकारियाँ आदि खिलाना, ऐसी वस्तुएँ खिलाना जिन पर मक्खियाँ रोम-कृमि छूँट, गड़ई हों जब भी बच्चा रोए तभी खाने को दे देना और बच्चों को गंदी चीजों में डालने से न रोक्ना। चूँकि इस बढती हुई शिशु-मृत्यु को बहुत हद तक रोका जा सकता है, इसलिए माता-पिता को बच्चों की देख-रेख के विषय पर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिये।


प्रसम बालक

जन्म के समय प्रसम (Normal) बालक का भार ३ सेर से लेकर ४ सेर तक होना चाहिये। जन्म के पश्चात् एक सप्ताह तक बच्चों के भार में कोई वृद्धि नहीं होती। पहले छः महीने में बच्चों के भार में औसत वृद्धि प्रति सप्ताह ४ आउंस के हिसाब से होनी चाहिये। इस के पश्चात् अगले छः महीने में यह औसत वृद्धि ४ आउंस से कुछ कम होती है। दूसरे वर्ष बच्चों का भार कोई ३ सेर बढ जाना चाहिये।

दांत निकलने का समय अध्याय ५ में बताया जा चुका है।

दस महीने के बच्चों को ठाँगों के बल खड़ा होना चाहिये; और बारह महीने का होने पर थोड़ा-थोड़ा चलने भी लगना चाहिए।

जब बच्चा पैदा होता है तो उस की खोपड़ी में दो कमल स्थान (Fontanels) होते हैं, एक ठीक माथे के ऊपर और दूसरा पीछे खोपड़ी में। पीछे का स्थान लम्बम



बालक के प्रथम बारह सप्ताहों का प्रसंग भार सम्बन्धी रेखा-चित्र


दूसरे महीने के बाद बन्द हो जाता है और आगे का लगभग अट्ठारहवें महीने के अन्त में बन्द होता है। यदि इन दोनों कर्मल स्थानों (Fontanels) में से कोई-सा दो साल के बाद भी रहे तो उस का कारण यह होता है कि या बच्चे को उचित भोजन नहीं मिल सका है या फिर सूखे का रोग (Rickets) हो गया है।

बच्चे का बार-बार रोना स्वाभाविक है, जतः मां को उसे जब वह रोए तभी दूध पिलाने की आदत नहीं डालनी चाहिए।

बच्चों की देख-भाल

प्रत्येक बच्चे के तीन महीने की आयु से पहले ही झीतला का टीका लगवा देना चाहिये। यदि आस-पास झीतला फैल रही हो तो बच्चे के जन्म के पश्चात् एक या दो सप्ताह में ही उस के यह टीका लगा देना चाहिये (देखिये अध्याय २४)। डिप्थीरिया-प्रदाह (Diphtheria) हनुस्तम्भ या जम्बू (Tetanus), कुकुर-खांसी तथा झीतल से सुरक्षित रखने के लिये, छः या आठ महीने का होने से पहले-ही-पहले बालक के टीके लगवा देने चाहिये।

जीवन के प्रथम सप्ताहों में शिशु का अधिकांश समय सोते व्यतीत होता है। बालक के लिए आरामदह बिस्तर तैयार कर लेना चाहिये। बांस की लम्बी सी टोकरी में बिस्तर लगाने से बालक को बड़ा आराम मिलता है। इस के ऊपर मच्छरदानी डाल देनी चाहिये



बालक के दांतोंद्वारे से सम्बन्धित रेखा-चित्र । चित्र में जिन दांतों पर स्थिति फेर दी गई है, वे स्थायी दांत हैं ।

१. छः से आठ महीने तक के दांत । २. आठ से दस महीने तक के दांत । ३. बारह से चौदह महीने तक के दांत । ४. अठ्ठाह्र से बीस महीने तक के दांत । ५. अठ्ठाईस से बत्तीस महीने तक के दांत ६. छः वर्ष की अवस्था में । ७. सात वर्ष की अवस्था में । ८. आठ वर्ष की अवस्था में । ९. नौ वर्ष की अवस्था में । १० दस वर्ष की अवस्था में । ११. ग्यारह वर्ष की अवस्था में । १२. बारह वर्ष की अवस्था में । सत्रह से पच्चीस वर्ष की अवस्था में ।

जिस से मौखिकता बच्चों की आंखों और मुंह पर न बैठ सकें । मौखिकता से आंखें दखने लगती हैं और बच्चों की त्वचा पर छोटो-छोटो फोसियां निकलने लगती हैं । इस से बच्चों को दस्त लग जाते हैं । जब बच्चा सो रहा हो तो उस का सिर न झुकाए । बच्चों को अधिक मात्रा में ताजा हवा की आवश्यकता होती है : अतः जिस कमरे में वह सोता हो उस के दरवाजे या खिड़कियां पर परदे नहीं डालने चाहिये, बल्कि खिड़कियां खुली रखिये या उस का विस्तर बाहर छाया में ऐसे स्थान पर लगा दीजिये जहाँ वह धूप से बचा रहे ।

बालक को प्रतिदिन नहला कर साफ रखना चाहिए ।

प्याल या बांस की चटाई फर्श पर बिछा कर बच्चों को उस पर लिटा दीजिये । यदि बच्चों को आयु सात-आठ महीने की हो, तो वह बच्चों से खिसक कर फर्श पर जा जाएगा, अतः एक छोटो-सा कठपरा (Pen) बनवा लीजिये और उसे चटाई पर रख दीजिए और बच्चों को उस के अन्दर छोड़ दीजिये ।



बालक को नहलाना । बालक को हाथों में पकड़ने के ठंग को ध्यानपूर्वक देखिए ।

बच्चों को चूसनी (Comforter) न दीजिये । जब बच्चा पांच या छः महीने का हो और उस के दांत निकल रहे हों, तो उस के मुँह में चम्मच या ऐसी ही कोई सरस च चीज चबाने को दीजिये या चीज कुछ ही क्यों न हो, परन्तु यह आवश्यक है कि बालक के मुँह में देने से पूर्व कहीं दार खोलते हुए पानी में साफ कर ली जाए ।

पोतड़ों के लिए साफ कपड़ों का उपयोग कीजिये । नन्दे कपड़ों में न केवल दुर्गन्ध ही होती है, बल्कि उन से बच्चों के मूत्र-स्थान के अवयवों में खजली होने लगती है ।

लडका हो तो उस की नूनी के सामने की चमड़ी को समय-समय पर पीछे खिसका कर साफ करना आवश्यक है । यदि चमड़ी पीछे न खिसकाई जा सके तो बच्चों को किसी योग्य डॉक्टर के पास ले जाकर चमड़ी को फेंका दीजिए जिस से वह खिसक सके । लडकी के मूत्र-स्थान के ओठों और दूरार का भी ध्यान रखना चाहिये और उन्हें समय-समय पर धोना चाहिये ।

जब बच्चों को कपड़े पहनाए जाएं तो उस के नितम्बों और मूत्र-स्थान के अवयवों को ढंका रहना चाहिये । बच्चों को नंगे फिरने देना या ऐसे बस्त्र पहनाना कि उस के नितम्ब या मूत्र-स्थान के अवयव दिखाई देते रहें, अच्छा नहीं है ।

बच्चों का खान-पान

प्रत्येक बालक के लिए अपनी माता का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है, परन्तु दूध पिलाने-वाली माता का स्वास्थ्य अच्छा होना अत्यावश्यक है; अतः माता को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए धरमक प्रयत्न करना चाहिये—पर्याप्त विश्राम करना चाहिये, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिये, प्रौढीदिन खुली हवा में घूमना-फिरना चाहिये; माता को आहार पीष्टकर तथा सुसंतुलित होना चाहिये; उस में दूध हो, ताजे फल हों, तरकारीयां हों, और मोटे आटे की गंटी । दाल के साथ हरे-पत्ते वाली तरकारीयां का उपयोग करना चाहिये जिस से माता को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन (Protein) मिल सके । पीलसु किए हुए अन्न में पोषक तत्व बहुत कम हो जाते हैं; इसीलिए जह्न-जह्न मुख्य भोजन

चावल हो, बहुत दूध पिलाने-वाली माता के अहार में अन्य अन्न—जैसे गेहूं ... भी सीमित होना चाहिये। कुछ स्थानों में यह प्रथा है कि बच्चों के जन्म के पश्चात् माता का अहार सीमित कर दिया जाता है जिस का परिणाम यह होता है कि पहले दो-तीन महीने उसे बहुत ही कम प्रोटीन मिलता है। यह बहुत बुरी प्रथा है और इस के परिणाम स्वरूप बाल-मृत्यु की संख्या में वृद्धि होती है।

दूध पिलाने वाली माता को पान-सुपारी, तम्बाकू (पीने का हो या खाने का) और किसी प्रकार की मोदरा का सेवन नहीं करना चाहिये क्योंकि दूध द्वारा इन पदार्थों के हानिकारक तत्व बच्चों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। निकोटीन (Nicotine) जो तम्बाकू में होती है, बच्चों के हृदय और मस्तिष्क को दुर्बल कर देती है और शरीर के विकास में बाधक सिद्ध होती है। मोदरा के सेवन से केन्द्रीय चेतना-संस्थान को क्षति पहुँचती है। चाय और कॉफी में भी ऐसे ही तत्व पाए जाते हैं जिन से माता को बड़ी हानि पहुँचती है।

आमतौर पर नवजात शिशु को चार-चार घंटे बाद स्तन-पान कराना चाहिये। स्तन-पान कराते समय दस-दस मिनट के बाद छातियाँ बदलते रहना अच्छा होता है। जो बच्चा अपने समय से बहुत पहले पैदा हो गया हो, उसे दो-दो घंटे बाद ड्रॉपर (Dropper) से दूध पिलाना चाहिये और अन्य छंटे और कमजोर बच्चों को तीन-तीन घंटे बाद। जब बच्चों को छः बजे, दस बजे, दो बजे; छः बजे, दस बजे, दो बजे दूध पिलाने का नियम बना हो, तो प्रायः तीन महीने तक उसे दो बजे रात को दूध पिलाना पड़ता है; परन्तु जितनी जल्दी हो सके यह रात को दो बजे दूध-पिलाना बन्द कर दिया जाए जिस से बच्चों और माता दोनों ही को बिना किसी विघ्न के आराम मिल सके। जिस बच्चों को तीन-तीन घंटे बाद दूध पिलाया जा रहा हो, उस के शरीर का प्रसम विकास और प्रसम भार हो जाने पर तुरन्त ही चार-चार घंटे बाद दूध पिलाने का नियम बनाया जाता है। आठ महीने के बाद और साल भर का होते-होते बच्चों को दस बजे रात को दूध पिलाना बन्द कर दिया जाता है और फिर दो वर्ष का होने तक चार बार दूध पिलाने का नियम बना लिया जाता है। माता को यह आदत बना लेनी चाहिये कि हर बार दूध पिला चुकने के बाद बच्चों को सीधा कर के थोड़ी सी देर तक अपने कंधे से लगाए रखे, ताकि पेट में से हवा निकल जाए या बच्चा उकार ले ले।

दूध पिलाने के नियमित समयों के बीच-बीच में बच्चों को खाली हुआ पानी जरा गर्म कर के पिलाना चाहिये। पानी पिलाने की सर्वोत्तम रीति यह है कि चुसनी-वाली शीशी का प्रयोग किया जाए; परन्तु यदि बालक बहुत छोटा हो तो ड्रॉपर (Dropper) या छंटे चम्मच से भी पिलाया जा सकता है।

दो सप्ताह का होते-होते बच्चों को किसी भी छाप का—विशेषकर बच्चों के लिए व्यापारिक ढंग से सारकृत रूप में तैयार किया हुआ—मछली का तेल देना चाहिये। आधिसूचना (Directions) के अनुसार दिन में एक बार उस के मुँह में चार से छः बूंदें डालनी चाहिये। लगभग इस समय से मीठे संतर्पण का रस भी देना आरम्भ कर देना चाहिये; पहले, खाली हुए पानी के साथ मिला कर दूध पिलाने के नियमित समयों के बीच में देना चाहिए। पहले तीन महीने तक कोई एक छटाँक भर दिया जाए और इस के बाद दो-दो छटाँक—अवस्था के साथ-साथ इस की मात्रा भी बढ़ती रहनी चाहिये। परन्तु शिशु को पीचख

(Dysentery) से बचाए रखने के हेतु यह परमावश्यक है कि शायों, संतरे और बरतनों की सफाई पर ध्यान रक्खा जाए।

दूसरे या तीसरे महीने से शिशु को खूब पका हुआ केला, अच्छी तरह कुचल कर या फेंट कर देना चाहिये। पहले-पहल, प्रति दिन, दूध पिलाना आरम्भ करने से पूर्व, एक-दो बार, जरा सा चखा देना चाहिये, और फिर धीरे-धीरे इस की मात्रा बढ़ती जानी चाहिये।

तीसरे या चौथे महीने से बच्चों के आहार अंडे की जर्दी (पीला भाग) भी सम्मिलित कर लेनी चाहिये। अंडे को उबाल कर सख्त कर लिया जाए, और फिर उस के पीले-भाग को थोड़े से दूध या घर पर बनाए हुए दूध* में मिला कर लेंगे जैसी बना लीजिये। यह इस प्रकार आरम्भ कीजिये कि जब बच्चा भूखा हो, तो दूध पिलाने से पूर्व जरा सा चटा दीजिए। जब तक कि बच्चा पूरे बारह महीने का न हो जाए, तब तक उसे अंडे की सफेदी (सफेद भाग) नहीं देनी चाहिये। जब भी कोई नया पदार्थ खिलाना आरम्भ करना हो, तो पहले बच्चों को उस के स्वाद का अभ्यस्त कर लीजिए। तीसरे या चौथे महीने से अच्छी तरह पकाए हुए अन्न पदार्थ भी देना आरम्भ कर देना चाहिये। व्यापारिक ढंग से तैयार किये हुए अन्न-पदार्थ के प्रयोग में आसानी रहती है क्योंकि उसे या तो बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं पकाना पड़ता। बैसे घंटे भर या इस से अधिक समय तक पका कर नहें या बिना पौलक के चावलों के अच्छी तरह छनं हुए आटे की लप्सी बनाई जा सकती है।

चार महीने का होने पर बच्चों को तरकारीयां भी खिलानी आरम्भ कर देनी चाहिये। खूब पका कर और खूब कुचल कर गाजर, हरे पत्तेदार तरकारीयां, सीताफल, हरी बीन और मटर आदि एक-एक कर के खिलाना आरम्भ करना चाहिये; पहले जरा सा चटा देना चाहिये और फिर धीरे-धीरे मात्रा छटाक भर तक पहुंच जानी चाहिये। इस प्रकार चौथे या पांचवें महीने से खूब पका कर और कुचल कर या छान कर सब, आड़ू, खूबानी, अमरुद और आम जैसे फल भी खिलाना आरम्भ कर देना चाहिए। छटे या सातवें महीने से प्राकृतिक रूप से पके हुए अर्थात् बिना आम पर पकाए हुए फल और टमाटर भी बच्चों के आहार में सम्मिलित कर लेने चाहिये; परन्तु इन के बीज, छिलके और कड़ा भाग बड़ा सावधानी से अलग कर दिया जाए।

इस प्रकार छः और आठ महीने के बीच बच्चों का खान-पान निम्न नियम, मात्रा और समय के अनुसार होना चाहिये :-

- ६ या ७ बजे सवेरे — एक अंडे की जर्दी (पीला भाग); कुचला हुआ केला १-२ आउंस; दूध ७-८ आउंस या स्तन-पान
- ८ या ९ बजे — संतरे का रस ४ आउंस; विटैमिन A और D के सारकृत द्रव (Concentrate) की ६ से ९ बूंदें तक बच्चों की जीभ पर डाल देनी चाहिये।

*बच्चों के लिए घर पर दूध बनाने की विधि आदि पृष्ठ १३९ पर विस्तारपूर्वक समझाई गई है। इसे अंग्रेजी में "फॉर्मूला" कहते हैं।

१० या ११ बजे सवेरे — पका हुआ दालिया आदि १-२ आउंस; आन पर पकाया हुआ कोई फल १-२ आउंस; दूध ७-८ आउंस या स्तन-पान ।

२ या ३ बजे तीसरे पहर — पका कर चुचली हुई कोई तरकारी (सब्जी) १-२ आउंस; दूध ७-८ आउंस या स्तन-पान ।

६ या ७ बजे सायंकाल — पका और कुचला हुआ केला १-२ आउंस; दूध ७-८ आउंस या स्तन-पान ।

१० या ११ बजे रात में — दूध ७-८ आउंस या स्तन-पान ।

जब बच्चा नौ से बारह महीने तक का है जाए, तो उसे अन्य ऐसी वस्तुएं भी देनी चाहिये जिन्हें वह चचांड, या चबा सके—जैसे बिना मक्खन का सरखट टॉस्ट या कुरकुरे रस्क, बिस्कट आदि थोड़ा-थोड़ा मात्रा में आलू, चावल, दाल का 'सूप' और दही भी देना चाहिये । अच्छा होगा कि बच्चों को आइसक्रीम, केक-मिठाइयां या शीरे आदि का चस्का न डाला जाए । खान-पान के नियमित समयों के बीच कुछ खिलाया जाए । जब तक बच्चों के पूरे दांत न निकल जाएं, तब तक हरी मक्ख (Green Corn), खीरा-ककड़ी, मूली और गीरियां आदि कोई वस्तु नहीं देनी चाहिये । तले हुए पदार्थ, मांस का झोरबा, और केक-मिठाइयां बच्चों के लिए अपचनीय सिद्ध होती हैं । मिर्च-मसाले पेट में जलन पैदा कर देते हैं, यद्यपि बहुत से देशों में सुअर के मांस, मछली या मांस को बच्चों के लिए अच्छा बताया जाता है, परन्तु वास्तव में ये पदार्थ उस के लिए अच्छे नहीं होते । दो साल या इस से अधिक अवस्था का बच्चा यदि पूरी मात्रा में दूध पी रहा है, तो दाल और हरे पत्ते वाली तरकारियों का प्रयोग करने से 'प्रोटीन' की पूर्ण मात्रा प्राप्त हो सकती है ।

अरंडी का तेल (Castor Oil) न तो स्वस्थ बच्चों के लिये अच्छा होता है और न अस्वस्थ के लिये । पारा मिला कर तैयार किए हुए पदार्थ (Mercury preparations) विषरल होते हैं, इसलिए न तो दूध पिलाने वाली माता को दिए जाएं और न शिशु को । यदि तीन दिन तक बच्चों को टट्टी न हो, तो किसी प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टरनी से हल्की सी पिचकारी (अनमा) लगवा देनी चाहिए, या फिर वह कब्ज दूर करने वाला मिल्क ऑफ मैग्नेशिया (Milk of Magnesia) जैसा कोई द्रव बताएगी । साधारणतया यदि बच्चों को नियमानुसार खिलाया जाए और पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाया जाए, तो कब्ज की शिकायत होती ही नहीं ।

ऊपरी दूध

यदि माता किसी कारणावच्छ नवजात शिशु को अपना दूध न पिला सके, तो बनाया हुआ दूध अर्थात् ऊपरी दूध शीशी द्वारा देना चाहिये । दूध पिलाने वाली धाय या किसी ऐसी स्वस्थ स्त्री का प्रबन्ध करना चाहिये जिस के स्तनों में उस ने अपने बच्चों की आवश्यकता से अधिक दूध उतरता है । ऐसा प्रबन्ध हो जाने से प्रायः समय से पूर्व उत्पन्न या दुर्बल बच्चों के प्राण बच जाते हैं । फिर यह कहना ही होगा कि माता का दूध ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होता है । अतः प्रत्येक माता को अपने बच्चों को भरसक

दूध पिलाना चाहिये। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि माता के स्तनों में दूध तो होता है, परन्तु बच्चा इतना दुर्बल होता है कि वह दूध को मुँह में दबा कर दूध नहीं खींच सकता। ऐसी अवस्था में हर चार घंटे बाद स्तनों में से हाथ से या 'पम्प' द्वारा सारा दूध निकाल कर बच्चे को पिलाना चाहिये और जब तक बच्चा अपने आप स्तनों से दूध पीने योग्य न हो जाए, तब तक इसी प्रकार दूध पिलाना चाहिये।

बच्चों के लिए व्यापारिक ढंग से तैयार किया हुआ दूध चूर्ण (Powered Milk) लगभग सभी स्थानों पर विकता है। यह अधिक हानिरहित और अधिक प्रामाणिक होता है; और साथ-ही-साथ इस के बनाने में माता को कोई कठिनाई नहीं होती। यह दूध-चूर्ण भैंस, गाय बकरी के ताजा दूध से बनाए हुए दूध (Formula) से अधिक पचनीय होता है। यदि किसी कारणवश ताजा दूध का प्रयोग करना ही पड़े, तो छोटे बच्चे को माता के दूध के बदले देने के लिए इस में अन्य वस्तुएं मिला लेनी चाहिये (इस का वर्णन आगे आया)।

जिन स्थानों पर मांसम बारहों महीने गर्म रहता है और शिमीकरण (refrigeration) का कोई प्रबन्ध न हो, वहाँ यह बहुत आवश्यक है कि दूध देने के बाद से तीन चार घंटे के अन्दर-ही-अन्दर दूध मिला जाए, और तुरन्त ही दस मिनट तक आँटा लिया जाए और ठंडा कर लिया जाए। भैंस के दूध में बसा की बहुतायत होती है, इसलिए इस पर से मलाई उतार लेनी चाहिये और तब बच्चे को देने को दूध बनाया जाए। दूध बनाने की रीति कुछ यों है कि दूध में पानी मिला कर उसे पतला कर लिया जाए—आधा दूध, आधा पानी...और ६-७ प्रतिशत मीठा (Sweetening); इस मीश्रित रूप में बड़ी गुण होता है जो माता के दूध में होता है। अगले पृष्ठ पर दूध, पानी और मीठ की मात्राओं से सम्बन्धित विस्तृत तालिकाएँ दी गई हैं—ये मात्राएँ, आयु के भिन्न-भिन्न महीनों के अनुसार हैं। आउंसों के योगफल को दूध पिलाने के नियमित समयों की संख्या से भाग देने पर यह पता चल जाएगा कि एक बार में बच्चे को कितना दूध देना चाहिये। यदि बिना मलाई उतारे दूध के चूर्ण (Powder) का प्रयोग किया जाए, तो हब्बे पर दी हुई अधिसूचनाओं के अनुसार मिलाना चाहिये। यदि मक्के का शर्बत (Corn Syrup) या डेक्स्टीन-माल्टोज (Dextrin-Maltose) प्राप्त न हो, तो शक्कर ही प्रयोग में लानी चाहिये। मक्के के शर्बत की मात्रा की अपेक्षा शक्कर की मात्रा आधी लेनी चाहिये।

जमाया हुआ टीन का मीठा दूध (Sweetened condensed tinned milk) बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। यह दूध रोगाणु रहित न किया हुआ होता है और पेंतालीस प्रतिशत शक्कर द्वारा संरक्षित किया हुआ होता है जिस से इस में 'प्रटीन' की कमी आ जाती है। इस दूध को पीकर बच्चा मोटा-ताजा भले ही हो जाए, परन्तु उस के शरीर के तन्तु ढीले-ढाले रह जाते हैं और वह पीचछ और अन्य बीमारियों से सुरक्षित रहने की शक्ति नहीं रखता।

प्रायः जब बिना मलाई उतारे दूध का प्रयोग किया जाए, तो अच्छा होता है कि दूध बनाने समय उसे आग्लिक कर लिया जाए, इस से बच्चे के पेट में अधिक पचनीय दही बनता है और आतसार (Diarrhoea) को रोकता है। इस उद्देश्य के लिए साधारणतया दग्धाम्ल (Lactic Acid) या लीबकाम्ल (Citric Acid) का प्रयोग किया जाता

बच्चों का उचित आहार

जब ताजा दूध का प्रयोग किया जाए, तो विभिन्न वस्तुओं की नीचे दी हुई मात्राओं के अनुसार दूध बनाया जाता है:-

शिशु की आयु	बिना मलाई उतारा दूध	खाँलाया हुआ पानी	मक्का का शर्बत	या डेक्स्टीन माल्टोज*	योग
	आउंस	आउंस	खाने का चम्मच भर	आउंस	
जन्म के समय	१०	१०	१½	३	२० लवभन
१ महीना	१४	१०	२½	५	२४
२ महीने	२०	१२	३	६	३२
३ महीने	२४	१२	३	६	३६
४ महीने	२४	८	३	६	३२
५ महीने	२६	८	३	६	३४
६-८ महीने	२६	६	३	६	३२
९ महीने	यदि बिना मलाई उतारा दूध अनुकूल हो, तो वहीं बच्चों को दीजिये। महीने-महीने मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाती जाइये। चारों महीने में मात्रा इसीलिए घट जाती है कि इस समय से बच्चा और कुछ भी खाने लगता है।				

जब वाष्पीभूत दूध (Evaporated milk) का प्रयोग किया जाए तो विभिन्न वस्तुओं की नीचे दी हुई मात्राओं के अनुसार दूध बनाया जाता है।

शिशु की आयु	वाष्पीभूत दूध	खाँलाया हुआ पानी	मक्का का शर्बत	या डेक्स्टीन माल्टोज*	योग
	आउंस	आउंस	खाने का चम्मच भर	आउंस	
जन्म के समय	५½	१५	१½	३	२०½ लवभन
१ महीना	७	१७	२	४	२४
२ महीने	१०	२२	३	६	३२
३ महीने	१२	२४	३	६	३६
४ महीने	११	२१	३	६	३२
५ महीने	१३	२१	३	६	३४
६-८ महीने	१३	२०	३	६	३३
९ महीने	१५	१७			३२
१० महीने	१६	१६	प्याले से पिलाया जाए		३२

*Dextrin-Maltose.

है। साढ़े. चाँदह छायंक (एक क्वाट) दूध में ८५% अर्थात् कोई डोट. चम्मच (चाय का चम्मच) भर दुग्धाम्ल की आवश्यकता होती है—अर्थात् एक आउंस दूध में कोई पाँच बूँदें। अम्ल मिलाने से पहले दूध बिल्कुल ठंडा कर लिया जाता है; फिर अम्ल एक-एक बूँद कर के डाला जाता है। इस अवधि में इसे बराबर चम्मच से मिलाते रहना चाहिये। अन्त में इसे जरा गाढ़ा रहना चाहिये; परन्तु दही अलग न हो जाए। लीबकाम्ल (चूर्ण) २५% घोल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है (एक आउंस लीबकाम्ल और चार आउंस पानी) साढ़े. चाँदह छायंक दूध में चाय के तीन चम्मच भर यह घोल मिलाना चाहिये। साढ़े. चाँदह छायंक दूध में २ आउंस संतरे के रस या ३/४ आउंस नींबू के रस का प्रयोग किया गया है।



बच्चे के दूध पिलाने की विभिन्न प्रकार की छींझियाँ। आस्तानी से साफ हो जाने वाली चाँद. मुँह की छींझियाँ ही कम में लानी चाहिये।

कोई भी ऐसी छींझी जो सरलतापूर्वक साफ की जा सके बच्चे के दूध पिलाने के काम में लाई जा सकती है। कुछ स्थानों पर ऐसी चुसनीयाँ भी बिकती हैं जिन में से दूध समान गीत से बाहर निकलता है। यदि हिमीकरण का प्रबन्ध हो, तो कई छींझियों की आवश्यकता होती है जिस से एक ही बार चौबीस घंटों के लिए दूध बना कर और छींझियों में भर कर रख दिया जाए। गर्म देशों में बहुत से परिवारों में यह प्रबन्ध सम्भव नहीं हो सकता। फिर भी इस बात में बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है कि चुसनी और छींझी दोनों को खूब साफ रखा जाए। इन्हें प्रयोग करने के बाद तुरन्त

हैं खंगाल डालना चाहिए और फिर साबुन और पानी से खूब साफ करना चाहिए, और दिन में कम-से-कम एक बार तो अवश्य ही झींझी के खालते हुए पानी में दस मिनट तक डाले रखना चाहिये और फिर तीन मिनट तक चुसनी के भी खालते हुए पानी में डाले रखना चाहिये।

साधारण पीरीस्थितियों में ९ या १० महीने बाद बच्चे से मां का दूध छुड़ा दिया जाता है। परन्तु यदि परिवार निर्धन है और दूध छुड़ाने में यह डर है कि ऊपरी दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता, तो यह बात बच्चे के लिए लाभदायक होती है कि जब तक आवश्यकता है तब तक दूध पिलाया जाए। कुछ बच्चों के प्याले से दूध पीने की आदत डाल कर मां का दूध आसानी से छुड़ाया जा सकता है। जो बच्चा चम्मच से अनुपूरक आहार ग्रहण करने में आपत्ति न करे उससे माता का स्तन-पान छुड़ाना कीठन नहीं होता।

कब्ज

स्वस्थ बच्चे के प्रायः दिन में चार बार टट्टी होती है। दूसरे या तीसरे महीने के पश्चात् नियमानुसार दो ही बार टट्टी होनी चाहिये। यदि दिन में एक दो बार टट्टी न हो, तो बच्चे के कब्ज का इलाज करना चाहिये। छोटे बच्चे के कब्ज का इलाज करने में देर नहीं करनी चाहिये, नहीं तो बीमारी बढ़ जाने का डर रहता है। कब्ज को दूर करने के निम्न उपायों में से एक, या एक से अधिक काम में लाए जा सकते हैं :-

१. भोजन में चिकने पदार्थों का अंश बढ़ा दीजिये।
२. बच्चे को पीने के लिये अधिक मात्रा में पानी दीजिये। पानी गरम और खाला हुआ होना चाहिये।
३. संतरे का रस, या टमाटर का रस या किसी दूसरे फल का रस तथा पक्का कुचला हुआ पपीता या पका केला प्रीतीदिन दीजिये।
४. कड़े, सफेद साबुन के टुकड़े, को नुकीला कर के काटिये, उस का पतला बारीक छोर ऐसा हो जैसा सुरमे की पेंसिल का छोर होता है; पर दो इंच लम्बा हो, और मोटे छोर का व्यास आध इंच से जरा अधिक हो। प्रीतीदिन प्रातःकाल नियत समय पर यदि टट्टी आप-से-आप न आए, तो साबुन के छोर पर थोड़ा सी बसलीन लगा कर गुदा के छेद में आधा घुसा दीजिये और कुछ सेंकड़ तक उसी दशा में उभे रहने दीजिये फिर निकाल लीजिये। ऐसा करने के प्रायः खुल के टट्टी होने लगेंगी (इस को साबुन की बत्ती कहते हैं।)

दस्त (अतिसार)

यदि बच्चे को बार-बार पानी जैसी पतली टट्टी आए और उस में दूग्दान्ध हो, तो समझ लीजिये कि उसे दस्त लग गए हैं। इस प्रकार की अधिकांश पीरीस्थितियों में यह आवश्यक होता है कि बच्चे को एक दिन, दिन भर, साधारण दैनिक भोजन न दिया

जाए, वरन् केवल खाली हुआ पानी और चावल की पीच दी जाए। यह पीच, इस प्रकार तैयार की जाती है कि ढेर से पानी में थोड़े से चावल डाल कर खूब उबाल लिए जाएं यहाँ तक कि चावल बिल्कुल धुल जाएं। फिर पतले कपड़े में छान कर पीच निकाल ली जाए। बच्चे को जो कुछ भी खाने-पीने को दिया जाए वह साफ रहे। यदि इस उपाय से भी दस्त न रुके, तो अध्याय २२ में बताए हुए उपायों को काम में लाना चाहिये।

अध्याय २१

घर पर रोगी की सेवा-शुश्रूषा

घर पर रोगी की सेवा-शुश्रूषा

मनुष्य में अपने रोग को आप दूर करने की क्षिति नहीं होती। यद्यपि यह सत्य है, फिर भी अपनी बीमारी को ठीक होने या बटाने में वह बहुत कुछ कर सकता है; और इस पुस्तक का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि बहुत सी ऐसी सीधी-सादी उन विधीयों का वर्णन किया जाए जो रोगियों को अच्छा करने में प्रकृति की सहायक होती हैं।

प्राकृतिक चिकित्साएं

इस अध्याय में उन चिकित्साओं का वर्णन किया जाएगा जो विभिन्न प्रकार से उपयोगी हैं। इन से किसी भी रोगी की चिकित्सा करने में बहुत सहायता मिलेगी। ये प्राकृतिक चिकित्साएं कहलाती हैं क्योंकि इन में विषैली औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन् ऐसी वस्तुओं की जरूरत होती है जिन से शरीर प्राकृतिक रूप से क्षिति और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। इन में से कई तो बहुत साधारण और सस्ती हैं, परन्तु फिर भी अत्यन्त लाभदायक हैं।

सूर्य-प्रकाश

सूर्य-प्रकाश का स्वास्थ्य के साथ कितना गहरा सम्बन्ध है यह इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि जब पाँधों या जानवरों को प्रकाश नहीं मिलता तो उन की क्या दशा हो जाती है। यदि पाँधों को प्रकाश वाले स्थान से उठा कर अंधेरे स्थान में रख दिया जाए तो यह खीघ, ठी मुरझा जाता है। अंधेरे में रखे जाने वाले जानवर भी कमजोर और बीमार हो जाते हैं।

जिस प्रकार सूर्य-प्रकाश पाँधों को हटा भरा रखता है उसी प्रकार मनुष्यों को भी स्वस्थ रखता है। सूर्य-प्रकाश से रोग-कृमि झीघू ही मर जाते हैं। त्वचा-रोग शरीर के उन भागों को बहुत कम लगता है जो सदा रोशनी में रहते हैं। अस्पतालों में यह कहें बार सिद्ध किया जा चुका है कि खुले बरामदों में रखे जाने वाले रोगी या सूरज की रोशनी वाले कमरों में रहने वाले रोगी उन रोगियों की अपेक्षा जल्दी अच्छे हो जाते हैं जो कम प्रकाश वाले कमरों में रहते हैं। शय-रोग में तो सूर्य-प्रकाश मुख्य और परमावश्यक चिकित्सा मानी जाती है। चाहे कोई रोग हो रोगी को पूर्ण रूप से प्रकाशित कमरे में रहना चाहिये या उस से भी अच्छा है कि वह बाहर छाया में रहे। संसार में सूर्य ही समस्त उष्णता, प्रकाश तथा ऊर्जा का प्रभु है। यह जीवन प्रदान करता है। अतः इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि मकान के प्रत्येक कमरे में सूरज की रोशनी आए। जो लोग कम प्रकाश वाले स्थानों में रहते हैं उन्हें रोग लगने देर नहीं लगती।

स्वच्छ वायु


यदि किसी को हवा मिलना बन्द हो जाए, तो वह कुछ ही मिनट में मर जाएगा। जौन को यदि हवा का झोंका न मिले तो वह ठीक तरह से नहीं सुलगेगी। इसी प्रकार यदि हम निरन्तर रूप से सांस के साथ स्वच्छ वायु अपने फेफड़ों में न ले जाएं, तो हमारे शरीर में भी आवश्यक उष्णता और ऊर्जा उत्पन्न न होगी। रोगी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा अधिक स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक के छठे अध्याय में निरन्तर स्वच्छ वायु में रहने के महत्व पर बल दिया गया है।

पानी

पानी संसार की सब से साधारण वस्तुओं में से एक है और यह सब से सस्ती भी है। कोई भी पाँधा या जानवर पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। हमारे शरीर का दो तिहाई बजन पानी का है।

जब कोई व्यक्ति अपने भोजन में और पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पा सकता, तो उस की शक्ति झीघू ही कम होने लगती है। आठवें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रचुर मात्रा में पानी पीना बहुत आवश्यक है जिस से यह त्वचा और गुदा को शरीर में निरन्तर पैदा होने वाले विषले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता दे सके। जिस प्रकार स्नान करने से शरीर का बाहर का भाग साफ हो जाता है उसी प्रकार पानी पीने से अन्दर की सफाई हो जाती है।

पानी मनुष्य के प्रायः सभी रोगों के उपचार में सहायक होता है। रोगों के उपचार में पानी का प्रयोग औषधियों के प्रयोग से पूर्व आरम्भ हुआ। प्रत्येक बयस्क व्यक्ति को प्रति-दिन ढाई से लेकर साढ़े तीन सेर तक पानी पीना चाहिये। पानी को पीने से पहले उबाल लेना चाहिये। पीने का पानी बहुत अधिक ठंडा न हो। बर्फ का पानी न पीजिये। रोगियों को काफी पानी पीना चाहिये। यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को ज्वर हो उन्हें पर्याप्त मात्रा में ठंडा पानी पीना चाहिये। यदि पेट में दर्द हो



रोगी के लिए खाने-पान और रोगीन्याय वाला कमरा

और एक खट्टा-खट्टा लगे, तो थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिये, दर्द दूर हो जाएगा। छोटें बच्चों के दिन में कई बार थोड़ा-थोड़ा मात्रा में गरम पानी पिलाना चाहिये (यह पानी उबला हुआ हो)। प्रायः जब बच्चा रोता है तो वह पानी मांगता है, कुछ खाने को नहीं।

रोग की चिकित्सा में पानी का प्रयोग

रक्त ही रोग-निवारक है। इस तथ्य की चर्चा अध्याय ७ में पूर्ण रूप से की जा चुकी है। रक्त ही देह में गर्मी कायम रखता है, रोग-कृमियों को मारता है और शरीर के रोग-ग्रस्त या चोटिले भाग की मरम्मत भी करता है। अतः शरीर के रोग-ग्रस्त भाग की चिकित्सा करने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि उस भाग में रक्त-परिभ्रमण सक्रिय हो जाए। गर्म और ठंडे पानी के प्रयोग द्वारा शरीर के किसी भाग में भी रक्त-परिभ्रमण नियंत्रित रक्खा जा सकता है। अदल-बदल कर गर्म और ठंडे पानी से सेंकने से शरीर के किसी भाग में भी रक्त-परिभ्रमण यथेष्ट रूप से बढ़ाया जा सकता है। गर्म सेंक से जो लगभग दो मिनट तक लगनी चाहिये उस स्थान की रक्त-वाहिनीयां फैल जाती हैं। रक्त-वाहिनीयां के फलते ही उन में भरने के लिए रक्त दूसरे स्थानों से दाँडने लगता है। फिर यदि ठंडी सेंक दस से बीस सेंकंड तक दी जाए तो फैली हुई रक्त-वाहिनीयां सिकुड़ जाएंगी; जब ये सिकुड़ जाती हैं तो रक्त देह के अन्य भागों की रक्त-वाहिनीयां में धकेल दिया जाता है। इस प्रकार गर्म और ठंडे पानी से अदल-बदल कर सेंकने की क्रिया रक्त-वाहिनीयां

में वास्तीबक रूप से पम्प का काम करती है, जिस से रोग-ग्रस्त भाग में रक्त-प्रवाह बहुत अधिक बढ़ जाता है।

घर पर जल-चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री

घर पर जल-चिकित्सा के लिए साधारण प्रयंत्रों की आवश्यकता होती है। यदि वे न हों, और जरूरत पड़ जाए, तो उन जैसी अन्य वस्तुओं से काम चलाया जा सकता है। परन्तु बेहतर यही होगा कि निम्नीलिखित सामग्री जुटाने का प्रबंध किया जाए:—

१. पानी से सेंकने के लिए 30×36 इंच की नाप के कपड़े, के छः टुकड़े; वे चाहे ऊनी हों, चाहे ऊनी-सूती हों। पुराने कम्बल के चार टुकड़े, कर लिए जाएं, तो वे बड़ा अच्छा काम देंगे।

२. दो मामूली से मोटे दस्ताने।

३. दो गरम पानी की बोतलें।

४. एक बर्फ की थैली।

५. एक स्नान का थर्मामीटर।

६. दो अंडे की झबल के पर धोने के टब जो लगभग १६ इंच लम्बे और १० इंच गहरे हों।

७. धोने का टब, तसलें, केतली, तौलिये, चादरें और कम्बल जो प्रायः घर में होते हैं।

८. दो बड़े और गहरे टिन के बरतन या पीपे (या बाल्टियां) जिन का व्यास एक फुट और गहराई १६ इंच हो।

आढ़ सेंकें (Fomentations)

पानी द्वारा रोगों की चिकित्सा करने में सेंकें अत्यंत उपयोगी साधन हैं। सेंकने के लिये सब से अच्छा कपड़ा मोटी फ्लालेन होती है। फ्लालेन के एक कम्बल में से सेंकने के दो जोड़े, कपड़े, बनाए जा सकते हैं। फ्लालेन के बदले गरम कपड़ों से भी काम निकाला जा सकता है। सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये सेंकने के कपड़े, तीन फुट लम्बे और उतने ही चौड़े, होने चाहिये।

रीढ़, सेंकने के लिये कपड़ा ६ या ८ इंच चौड़ा और रीढ़ की लम्बाई का होना चाहिये। छाती, पेट, एवं आंतां के लिये कपड़े, को तब कर के आवश्यकतानुसार छोटा और चौड़ा कर लेना चाहिये। यदि सेंकने का कपड़ा बहुत गर्म हो, तो एक सेकिंड के लिये उसे इतना ऊपर उठा लीजिये कि उस के और शरीर के बीच में केवल तौलिया जा सके। तौलिये से शरीर को षोछ ढालिये और फिर तत्क्षण अच्छी तरह से सेंकने लागिये जब तक रोगी को तनिक आराम न पहुंचे तब तक सेंकते रहिये, फिर सूखे कपड़े, की तब खोल कर उसे शरीर पर रख दीजिये और नीले कपड़े, को फिर नीला कर के और निचोढ़ कर फिर सेंकना शुरू कर दीजिये।

साधारण रीति से तो सेंकें को प्रत्येक ३ से ५ मिनट में बदलना चाहिये । और पन्द्रह से बीस मिनट तक जारी रखनी चाहिये । प्रत्येक दृष्टा में सेंक बहुत गरम होनी चाहिये ।

सेंक से प्रायः प्रत्येक प्रकार की पीडा दूर हो जायगी और इस के प्रयोग में कोई हानि नहीं है, यदि उदर-गह्वर में नीच की दाहिनी ओर पीडा है, तो सेंकना नहीं चाहिये—खायद पीडा आंत्रपृच्छ-प्रदाह (Appendicitis) के कारण है । ऐसी दृष्टा में बर्फ की घंटी का प्रयोग करना चाहिये । सेंक हमेशा तेल की मालिश और मरहमों की अपेक्षा अधिक गुणकारी होती है । प्रायः प्रत्येक पीडा की चिकित्सा में सेंक को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिये प्रत्येक गरम सेंक के पश्चात् थोड़ी सी देर तक ठंडे पानी की सेंक देनी भी आवश्यक है । रुमाल या छोटे तौलिये जैसे पतले कपड़े की दो तहें काटे उस ठंडे पानी में भिना लीजिये और फिर निचोड़ कर सेंक के जाने वाले भाग पर कुछ सेंकड़ के लिए रख दीजिये । इस के बाद उसे वह से हटा कर उस भाग को सूखे कपड़े से पाँच दीजिये और फिर गरम पानी की सेंक आरम्भ कीजिये ।

प्रत्येक दृष्टा में गरम सेंक के पश्चात् कुछ सेंकड़ तक सेंक के जाने वाले भाग को ठंडक पहुँचाइये और फिर तौलिये से रगड़ कर सूखा दीजिये ।

अगले अध्यायों में विभिन्न रोगों की चिकित्सा का वर्णन करते समय यह भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किस रोग में सेंकना, किस रोग में गर्म पानी में पैर डालना, किसी रोग में गर्म पानी में बंठना और किस रोग में अनिमा लेना उपयोगी होता है ।

आइए सेंकों के प्रयोग की विधि


आवश्यक सामग्री—अंगीठी, स्टोव आदि । एक ढक्कनदार गहरा बरतन या बड़ी केतली जिस में पानी खालता रहे । सेंकने के लिए कपड़े के कम-से-कम दो टुकड़े (यदि चार हों, तो बेहतर होगा) पुराने ऊनी-सूती कपड़ों के कोई एक-एक बज के चार वर्गाकार टुकड़े, एक रूएदार तौलिया, एक छोटा तौलिया और एक कटोरा ठंडा या बर्फ का पानी ।

१. सेंक के नीचे कपड़े को लपेटने के लिए सूखा कपड़ा मेज पर फैला दीजिये । सेंकने के कपड़े की तीन तहें इस प्रकार कीजिये कि वह लम्बा और सकरा हो जाए । इस को बैसे ही उमोठिये जैसे पानी निचोड़ने समय उमोठते हैं, फिर इस के दोनों छोर पकड़ें, पकड़ें, खालिते हुए पानी में डूबा दीजिये । इस समय बरतन या केतली का ढक्कन लग दिया जाए और कपड़े के छोर बाहर रहें । इसे इतनी देर डूबाए रखिये कि यह खालिते हुए में पानी अच्छी तरह भीग जाए ।

२. दोनों सूखे छोरों को मजबूती से पकड़ कर कपड़े को कई बार मरोड़िये और फिर फैला लीजिये । इस प्रकार मरोड़ने से गर्म पानी बिना हाथ जलाए निचूड़ जाता है ।


३. गर्म कपड़े को सूखे कपड़े पर रखिये—यह सूखा कपड़ा इतना बड़ा हो कि गर्म कपड़े को अच्छी तरह लपेट सके ।

४. इसे जल्दी-जल्दी गोलाई में लपेट लीजिये जिस से रोगी के पास ले जाते-ले जाते ठंडा न हो जाए ।



आर्द्र सेंकों के प्रयोग की विधि

१. आर्द्र सेंक का कपड़ा । २. कपड़ा खालते हुए पानी में डबाया जाने के लिए तैयार है । ३. कपड़ा खालते हुए पानी में डबा दिया गया । ४. कपड़ा निचाँड दिया गया । ५. बटन निकाली जा रही हैं । ६. कपड़ा सूखे कम्बल में लपेटा जा रहा है ।



७. लम्बी तह की जा रही है। ८. चार तहें कर ली गईं। ९. कपड़ा दृग्ग स्थान पर लगा दिया गया। १०. कपड़ा हटा लिया गया—और उस स्थान को ठंडे पानी में भीगे हुए तौलिये से अंगोछा जा रहा है।

४. पीछे वाले भाग पर तौलिया रख कर सेंक का कपड़ा रखिये और चारों ओर से ठीक कर दीजिये। सेंक के इस कपड़े पर एक तौलिया अच्छी तरह लगा दीजिये जिस से बिस्तार न भीने। रंगी के सिर पर बर्फ के पानी में भीगा हुआ कपड़ा रखिये और जब भी यह कपड़ा नर्म हो जाए तभी बदल दीजिये।

६. एक सूखा तौलिया हाथ में लपेट कर रंगी के शरीर पर रखें हुए सेंक के कपड़े और तौलिये के नीचे हाथ डालिये और उस भाग को पोंछ दीजिये। इस प्रकार पोंछने से नमी दूर हो जाती है और रंगी अधिक गरम सेंक को सहन कर सकता है।

७. सेंक का कपड़ा बदलने के लिए दूसरा कपड़ा लपेट कर तैयार रखिये। फिर सेंक का पहला कपड़ा हटा कर गरम कपड़ा उस के स्थान पर रखिये। जब सेंक समाप्त हो जाए तो शरीर के उस भाग पर ठंडे पानी में भीगा हुआ तौलिया फेरिये और फिर



काम चलाऊ चाखुर या कम्बल और एक छोटे से टब का सहायता से पंरों में गर्म पानी की सेंकें दी जा सकती हैं, और शरीर से खूब पसीना निकाला जा सकता है।

सुखा दींजिये। एक बार में तीन सेंकें दी जाती हैं। यदि आवश्यकता हो, तो अधिक दी जा सकती हैं।

पंरों में गरम पानी की सेंक

पंरों में गरम पानी की सेंक के लिये लकड़ी की एक बाट्टी, एक चिलमची या या एक छोटा टब भी काम में लाया जा सकता है। पानी टखनों से ऊपर होना चाहिये और आरम्भ में पानी का तापमान १०५ डिग्री फ. होना आवश्यक है। पंरों को झीघ, ही ममी लगने लगती है। जब पर पानी में हों, तो बरतन में थोड़ा-थोड़ा तेज गरम पानी डालते रहना चाहिये जिस से सहन करने योग्य तापमान बना रहे। यह क्रिया ५ से २० मिनट तक की जा सकती है। पंरों में गरम पानी की सेंक देते समय ठंडे पानी में डाल कर निचाँडो हुआ कपड़ा रोमी के माथे पर रख देना चाहिये और इसे थोड़ा-थोड़ा देर में बदलते रहना चाहिये। इस ठंडे कपड़े से सिर को पीछा और सिर चक्राना बन्द हो जाता है।

१५ या २० मिनट तक पंरों को सेंकने से पसीना निकलने लगता है। यदि पसीना जाना आवश्यक हो तो रोमी के पर पानी की में रीखये और उस के चारों ओर दो-तीन कम्बल लपेट दींजिये, और उसे गरम पानी या लेमन पिलाते रीखये। सिर ठंडा रीखये। फिर उसे बिस्तरे में लिटा दींजिये और अच्छी तरह ढंक दींजिये, पसीना निकलने दींजिये।

पैरों में नरम पानी की सेंक से सिर का दर्द बड़ा जल्दी जाता रहता है। ज्वर के आरम्भ में ही बीस्त-बहवर के अवयवों की सृजन के लिए ठंडे लव जाने पर, पसीना निकालने के लिए और सूजे, दर्द करते या ठंडे पैरों के लिए यह लाभदायक होता है।

एक या दो चम्मच पिंसी हुई राई नरम पानी में डाल देने से इस का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जब रोंगी को ज्वर हो या वह कमजोर हो तो लिटा कर यह सेंक देनी चाहिये।

बीस्त-बहवर के अवयवों के लिए नरम पानी की सेंक (Sitz Bath)

बीस्त-बहवर के अवयवों के लिए नरम पानी की सेंक के लिये एक साधारण टब का प्रयोग किया जा सकता है। इस के लिये पानी का तापमान १०५ से ११५ डिग्री फ. होना चाहिये। यह बहुत साधारण है और बड़ा लाभ पहुंचाती है। प्रायः यह ५ से १५ मिनट तक दी जा सकती है।

इस सेंक के समय पर नरम पानी के दूसरे छोटें से टब में हों। रोंगी के शरीर का ऊपरी भाग किसी कपड़े, या कम्बल से ढंक दीजिये और ठंडे पानी का गीला कपड़ा माथे पर रख दीजिये।

गर्भाशय, बीजाण्डकोषों, योनि और मूत्राशय की सृजन से जो पेट में दर्द होना लगता है उस के लिये यह सेंक अत्यंत उपयोगी है। रजःस्राव के समय या उस से पहले जो पीड़ा होती है वह इस से दूर हो जाती है। जब रजःस्राव में देर हो जाती है तो कई दिन तक, दिन में दो-तीन बार, इस सेंक का प्रयोग करने से यह शिकायत दूर हो जाती है। क्ले की पीड़ा का भी इस से इलाज किया जा सकता है। नरम पानी में बैठ चुकने के पश्चात् नरम पानी में भीगे हुए अवयवों को ठंडे गीले तौलिये से जल्दी-जल्दी रगड़, डालिये और फिर सूखे तौलिये से उन्हें अच्छी तरह पोंछिये।

किसी पीड़ित अंग को बारी-बारी नरम और ठंडे पानी में डबा-डबा कर उस की चिकित्सा करना

खुले हुए घाव या फोड़े, या हाथ-पैर के किसी दूसरे रोग की चिकित्सा के लिए पीड़ित अंग को बारी-बारी नरम और ठंडे पानी में डबाना सब से बढिया उपाय है। एक बाल्टी में बहुत नरम पानी और दूसरी में ठंडा पानी लीजिये। वह हाथ या पैर जिस में चोट लग गई हो पहले तीन मिनट तक नरम पानी में डालें रखिये, फिर एक मिनट तक ठंडे पानी में। इस प्रकार यह क्रम तीस मिनट तक जारी रखिये। प्रति बार नरम पानी में से अंग निकालने के बाद थोड़ा सा और नरम पानी मिला देना चाहिये जिस से पानी नरम रहे। यदि हो सके तो ठंडे पानी में बर्फ डाल लीजिये। पीड़ित अंग को नरम और ठंडे पानी में छः, छः बार, बारी-बारी से, इस क्रम से, डबाइये कि अन्त में वह अंग ठंडे पानी में डबाया जाए। इस प्रकार दिन में तीन-चार बार, आधा घंटा प्रति बार यह उपाय करने से संक्रमित घाव या खुली चोट को ठीक करने में अद्भुत परिणाम प्रकट होते हैं। नरम पानी के प्रत्येक २०० भाग में एक भाग लाइसोल (Lysol) मिला देने से या एप्सम साल्ट (Epsom Salt) के दो चम्मच एक गैलन पानी में डालने से यह चिकित्सा अधिक लाभदायक होती है।



शरीर के कोषों को जीवन प्रदान करने के लिए, रक्त अंग को बारी-बारी से नये और ठंडे पानी में डालना एक लाभदायक उपाय है ।

मोच या किसी कचले हुए अंग की चिकित्सा में भी यह उपाय बहुत लाभदायक होता है, वह उचित औषधि की बात दूसरी है ।

दस्ताना पहने हाथ को ठंडे पानी में भिगो कर शरीर को रगड़ना

इस चिकित्सा में ठंडे पानी के लिए एक बाल्टी या बड़े और बरतन और अलपके जैसे मोटे कपड़े, या खुरदरे तालिये का बना दस्ताना आवश्यक होता है । दस्ताने वाला हाथ पानी में डालिये और दूसरे हाथ से रंगी को पकड़े, रहिये । दस्ताने में से पानी निचोड़, कर रंगी की उंगलियों से लेकर कंधे तक जल्दी से हाथ फेरिये और फिर वापस ले आइये और फिर जोर-जोर से, जल्दी-जल्दी आरम्भ कीजिये । यह रगड़, ऐसी हो कि रंगी के शरीर को किसी प्रकार पीड़। न पहुँचाए । इस क्रिया को दो-तीन बार दोहराइये । फिर एक मोटे से तालिये से रगड़, कर शरीर सूखा डालिये । फिर यही क्रिया क्रमशः दूसरी बांह, छाती, उदर, टांगों और पीठ पर कीजिये । यह सारा काम करने में १२ मिनट से १५ मिनट तक लगने चाहिये । इस चिकित्सा की सफलता इस बात पर निर्भर है कि रगड़ते समय हाथ बड़ी फ़रती से चलाया जाए । आंग्रपूच्छ-प्रदाह या मोतीझरे में उदर को न मीलिये ।

साधारणतया यदि इस ठंडी रबड़ से पहले गरम पानी की सेंबों का प्रयोग किया जाए, तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है।

गरम सेंबों के बाद यदि दिन में एक, दो या तीन बार ठंडी रबड़ का प्रयोग किया जाए तो बहुत से रोगों में यह उपाय बहुत लाभदायक होता है।

जिस रोग में शरीर में दाने निकलते हैं, या किसी भी अन्य चर्म-रोग में, किसी प्रकार भी शरीर को रबड़-ना नहीं चाहिये।

जो सोव ठंडे पानी के अभ्यस्त न हों या जो बहुत कमजोर या बूढ़े हों उन के लिए आरम्भ में पानी का तापमान ८० डिग्री फ. रीखये और प्रातिदिन एक या दो डिग्री तापमान घटाते जाइये।

योगीन की पिचकारी

टीन या जस्त चूड़े हुए लोहे का एक बरतन बनवा लीजिये जो गोलाई में पांच इंच छे और १० या ११ इंच ऊंचा हो। इस की पेंदी में एक छेटा सा छेद हो जिस में एक टोंटी लग सकती हो। इस टोंटी में चार फुट या उस से लम्बी एक रबड़ की नली लगाइये और इस नली के छोर पर झींझे या रबड़ की टोंटी लगाइये (चित्र देखिये)।

रोगी स्त्री को नहाने के टब में पीठ के बल लिटाना चाहिये या उस के कूल्हों के नीचे योगीन की पिचकारी का बरतन रीखये। झींझे या रबड़ की नली दोनों ओर से खुली होनी चाहिये और ३ इंच लम्बी हो। इस नली को योगीन में प्रविष्ट कर दीजिये और सदा नीचे और पीछे की ओर योगीन की निचली दीवार के साथ रीखये। पानी वाले बरतन में बानी कूल्हों से तीन फुट ऊंचा होना चाहिये।

दूसरे साफ करने के कामों के लिये पानी गरम हो अर्थात् उस का १०० डिग्री फ. हो।


पेंडू की पीड़। दूर करने के लिये पानी का तापमान ११० से ११५ डिग्री फ. तक होना चाहिये और पानी कम-से-कम चार सेंर हो।

रजःस्राव को फिर से चालू करने के लिये १०३ डिग्री फ. तापमान का कई सेंर पानी काम में लाइये यह क्रिया दिन में दो-तीन बार की जाए।

ओनिमा या पिचकारी

ओनिम का प्रयोग घंट साफ करने के लिये किया जाता है। इस के लिए भी एक ऐसा ही बरतन होना चाहिये जैसा "योगीन की पिचकारी" के सम्बन्ध में बताया जा चुका है, नीलियों की भी आवश्यकता होती है। बच्चों के लिये छोटी नीलियां होनी चाहिये। ओनिम के लिये प्रयोग किया जाने वाला पानी पहले से खाला कर रख लेना चाहिये। इस में रोगी को चित या कबड से लेटना ही अच्छा होता है।

बयस्क व्यक्ति के लिए साधारण सफाई के लिए दो-तीन सेंर पानी चाहिये जिस का तापमान १०० डिग्री फ. हो। यह पानी ओनिम के बरतन में डाल कर चारपाई से तीन फुट ऊंचे स्थान पर इसे लटका दीजिये। रबड़ की नली को दबाये रीखये जिस से पानी निकलने न पाए। कंच की नली के सिर पर थोड़ा सी बसलीन या साफ तेल लगा




अनिमा देने का सामान—यों प्रकार की पिचकारीयों

कर उसे गुदा में प्रविष्ट कर दीजिये। इसे ऊपर की पीठ की ओर ढालिये। इसे द्वा-तीन इंच अन्दर जाने दीजिये, और फिर पानी को अन्दर छोड़ दीजिये। यदि किसी प्रकार की पीड़ा होने लगे तो उस के समाप्त होने तक नली को दबा कर पानी रोकें रखिये। छट्ठी लगे लगे तो रोगी को उसे तब तक रोकें रखना चाहिये जब तक सारा या अधिकांश पानी अन्दर न चला जाए। जब पानी अंदर चला जाए तो हाथों से पेट को दबाइये, इस से पानी आंतों में ऊपर चढ़ जाता है और पूर्ण रूप से आंतों की सफाई हो जाती है।

जिन लोगों को पुराना कब्ज हो या जिन्हें कुछ दिन तक बराबर अनिमा लेने की आवश्यकता हो, उन के लिए ठंडा अनिमा अर्थात् ७० से ८० डिग्री फ. तापमान के पानी का अनिमा बहुत ही लाभदायक होता है।

निमोनीया या मोतीझरा जैसे ज्वर में ७० डिग्री फ. तापमान का पानी यदि कुछ मिनट अन्दर रहने दिया जाए, तो ज्वर कम करने में सहायता देता है। यह चार-चार घंटे बाद किया जा सकता है। मोतीझरे के तेज बुरख में अनिमा का बार-बार प्रयोग करने से बड़ा लाभ होता है। अनिमा के बरतन की नली के अंत में Y के आकार की छिछ की एक नली लगी होती है। इस के सिर पर रबड़ की एक नली, जड़ी होती है जिस का सिरा बाल्टी में होता है। Y के दूसरे सिर पर एक 'कोलन' नली लगी होती है। यही भाग कहीं इंच गुदा में प्रविष्ट किया जाता है। ठंडे जल की बार आंतों में निरन्तर आने-जाने से ज्वर



बच्चों को पिचकारी देने की विधि

धीरे-धीरे कम हो जाता है। जब बुखार दो या तीन अंश गिर जाए तो अग्निमा बंद कर देना चाहिए। इस क्रिया की अवधि में रोगी को करबट से लटका रहना चाहिये। लाल-ज्वर की भांति जब बुखार तेज हो, तो ८० या ९० डिग्री फ. के तापमान के पानी का अग्निमा देना चाहिये। छोटे बच्चों को ठंडे पानी का अग्निमा नहीं देना चाहिये।

जब दस्त न बन्द हों तो ११० या ११५ डिग्री फ. तापमान के पानी का अग्निमा देना चाहिये। परन्तु मोतीझरे में ऐसा करना उचित नहीं। इस रोग (मोतीझरे) में टट्टी के बाद या दिन में कई बार ९० डिग्री फ. तापमान के पानी का अग्निमा भी दिया जा सकता है।

गरम पानी की धौली

गरम पानी से भरी हुई रबड़ की धौली बहुत देर तक गरम रहती है और यदि इस

के चारों ओर फुलार्लन का भीसा टुकड़ा लपेट दिया जाए, तो यह वही काम देती है जो कपड़े द्वारा गरम पानी की सेंके (fomentations)। साधारण रीति से तर गरमी खुरक गरमी से अधिक अच्छी होती है। पीठ, दांत, आमाशय और रजःस्राव की पीड़ा दूर करने के लिये तो यह नितांत आवश्यक होती है।

धौली के तिलहई भाग में गरम पानी भर दीजिये; फिर धौली के किनारों को दबाइये, इस से भाप निकल जाएगी। इस के बाद धौली के मुंह पर उस का पंचदार राक मजबूती से लगा दीजिये जिस से पानी न निकले। पांशों के पास रखने से पहले इसे फुलार्लन के एक टुकड़े में लपेट दीजिये। यदि रोनी होइ में न हो, तो इस बात का ध्यान रखिये कि कहीं उस के पर जल न जाए।

बिना बर्फ के ठंडी नदूदी (Compress) बनाने की विधि

इस अध्याय में ठंडी नदूदी का वर्णन कहीं बार किया जा चुका है। बहुत स्थानों पर बर्फ या ठंडा पानी मिलना सम्भव नहीं होता। ऐसी दशा में निम्नीलिखित रीति से नदूदी बनानी चाहिये। एक पतला सा कपड़ा या तौलिया पानी में भिना लीजिये, फिर बिना पानी निचाँडे, कपड़े, या तौलिये को उस के दोनों कोने पकड़ कर हवा में लहराइये। दस-बीस बार जोर-जोर से लहराने से तौलिया बिल्कुल ठंडा हो जाएगा।

अंगोष्ठना या स्पंज करना

स्पंज को या कपड़े, के टुकड़े, या केवल हाथ को पानी में भिना कर शरीर पर फेरना अंगोष्ठना या 'स्पीजिंग' कहलाता है। इस में मुख्य प्रभाव जल का होता है और मलने की कम आवश्यकता पड़ती है।

सादा गरम या ठंडे पानी या नमक जधवा सोडा मिले पानी सिरके और नमक या शराब का प्रयोग किया जा सकता है। शरीर के विभिन्न भागों को उसी प्रकार से अंगोष्ठिये जिस प्रकार दास्ताना पहने हाथ को ठंडे पानी में भिना कर शरीर को रगड़ने की क्रिया समझाई गई है। (देखिये पृष्ठ १५२)।

ज्वर उतराने के लिए ठंडे पानी और कपड़े, के टुकड़े, या स्पंज का प्रयोग करना चाहिये। इस को केवल इतना निचाँडा जाता है कि पानी न टपके और शरीर के प्रत्येक भाग को अच्छी तरह ठंडा करने के लिये उस कपड़े, को इधर-उधर फेरने में काफी समय लगता है। प्रत्येक भाग को बिना मले बड़ा सावधानी से सुखाया जाता है। जिस ज्वर में सदीं लगती हो उस में गरम पानी से स्पंज करना चाहिये। इस की विधि भी वही होती जो ठंडे पानी से स्पंज करने की होती है। जब हलके नमकीन जल, सोडा के पानी, सिरके और नमक और शराब का प्रयोग किया जाए तो कपड़े, इत्यादि के बदले नंगे हाथ से ही काम लेना चाहिये।

नमक मिले पानी से अंगोष्ठना: चिलमची या बड़े, कटोरे में गुनगुने या ठंडे पानी में चार आउंस साधारण नमक घोल लीजिये। यह उपाय खून की कमी वाले या कमजोर व्यक्तियों को थोड़ी-बहुत शक्ति प्रदान करता है और शरीर में रक्त परिभ्रमण को उत्तेजित करता है।



जल-चिकित्सा की विधि

क्षार मिले पानी से अंगोष्ठना: एक बरतन में पानी लेकर उस में दो आउंस सोडा बाइकार्बोनेट (खाने का सोडा) डाल दीजिये। यह खुजली और ददोड़ में लाभदायक होता है। इस का प्रयोग केवल रोग-ग्रस्त भागों पर ही करना चाहिये।

सिरका और नमक मिले पानी से अंगोष्ठना: क्षय रोग में रात के समय जो पसीना आता है उसे रोकने के लिए यह उपाय बहुत लाभदायक है। सिरका और पानी आधा-आध मिला कर कोई डेढ़ पाव घोल तैयार कर लीजिये। इस में एक या दो चम्मच नमक डाल दीजिये। जिन भागों में अधिक पसीना आता हो वहाँ इस का प्रयोग कीजिये।

झराब मिले पानी से अंगोष्ठना: पसीने की अधिकता और रात की बर्चनी दूर करने के लिए यह बड़ा उपयोगी साधन समझा जाता है। दस्ताना पहने हाथ को ठंडे पानी में भिना कर शरीर को रगड़ने के बदले इस का प्रयोग हो सकता है; यद्यपि यह उतना लाभदायक नहीं होता। अन्न की झराब (grain alcohol) और पानी आधा-आध हो। काष्ठ मद्यसार (wood alcohol) त्वचा पर लगने से विषैला हो जाता है इसलिए इसे कभी काम में न लाइयें।

विच-हैजल (witch-hazel) से अंगोष्ठना: यह भी वही लाभ देती है जो झराब देती है। इस का प्रयोग बिना पानी मिलाए करना चाहिये।

विज्ञात औषधियाँ (Patent Medicines)

समाचार-पत्र और भासिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाएँ विभिन्न प्रकार की औषधियों के विज्ञापनों से भरी होती हैं। प्रायः ऐसी औषधियों को सभी रोगों के लिए "चमत्कारी औषधियाँ" बताया जाता है।

इन विज्ञानों के लम्बे-चौड़े, दावों और इन में छपे प्रमाण-पत्रों के धोखे में न जाइये। इन औषधियों में मीढ़ों के समान कोई उत्तेजक पदार्थ मिला रहता है जिस के प्रभाव से रोगी को थोड़ी सी देर के लिए अपने अन्दर अधिक शक्ति का अनुभव होने लगता है, यद्यपि, वास्तव में, उस की शक्ति बढती नहीं ! चिकित्सा सम्बन्धी बातों में पौरुषी लोगों से ही परामर्श करना चाहिये।

रोगी की देख-भाल

रोग को दूर करने का सब से आवश्यक साधन औषधि नहीं है, बल्कि बिहराम, अच्छा भोजन, अच्छी देख-भाल और उन सब साधनों का प्रयोग है जो रक्त को इतनी शक्ति दें कि वह रोग-कृमियों और इन के द्वारा उत्पन्न विष को नष्ट कर सके।

बिहराम

बन्धीर रोग की दृष्टि में रोगी को रात-दिन बिस्तर में लेटा रहना चाहिये। बहुत से रोगी इसलिए पूर्ण रूप से अच्छे नहीं हो पाते कि जहाँ उन की तबियत कुछ ठीक सी हुई और वे उठ खड़े, हँसे, चलने-फिरने लगे, काम-काज करने लगे और साधारण भोजन करने लगे।

यदि रोगी के पड़ोसी, मिलने-जुलने वाले और सगे-सम्बन्धी उसे बार-बार देखने न जाएं, तो रोगी अधिक जल्दी ठीक हो सकता है। बात यह है कि ये लोग रोगी के लिए कुछ ऐसी छान-पीने की चीजें और औषधियाँ ले जाते हैं जिन का प्रयोग रोगी के लिए ठीक नहीं। ये लोग रोग को फैला कर दूसरों को भी हानि पहुँचाते हैं। बहुत से रोग संक्रामक होते हैं—एक से दूसरे को लग जाते हैं। रोगी के देखने के लिए आने वाले लोग उस से हाथ मिलाते हैं, या उस के बिस्तर पर बैठ जाते हैं, या उस के कमरे की चीजों को छूते हैं और इस प्रकार रोग-कृमि उन के हाथों और कपड़ों पर आ जाते हैं। वे इसी तरह अपने घरों को चले जाते हैं और रोग अन्य लोगों को भी लग जाता है। अच्छा तो यह हो कि रोगी की देख-भाल करने वाले दो-तीन व्यक्ति ही उस के कमरे में आएँ-जाएँ।

रोगी को साफ और ताजी हवा की आवश्यकता होती है; परन्तु उस से कमरे में आने-जाने वाले लोग सिगरेट या सिगार के धुएँ से उस कमरे की हवा को गन्दा कर देते हैं।

प्रत्येक रोगी के लिए यह आवश्यक है कि वह खूब सोए। रोगी के कमरे की बत्ती देर तक नहीं जली रखनी चाहिये, बल्कि जल्दी ही बुझा देनी चाहिये जिस से रोगी साँस सके।



रोगी का बिस्तर । पलंग को ऊँचा करने के लिए लकड़ी की स्टूटकों का प्रयोग ध्यान देने योग्य है ।

रोगी का भोजन

रोगी की चिकित्सा में उचित भोजन बहुत आवश्यक है ।

कुछ बीमारियों में रोगी साधारण भोजन कर सकता है, परन्तु बहुत से रोगों में—विशेषकर आमाशय तथा आंतों के रोगों में—उसे विशेष प्रकार का आहार करना चाहिये । चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो रोगी को खूब पानी पिलाना चाहिये । पानी को खाली कर ठंडा कर लेना चाहिये । ताजा पके हुए फल और फलों का रस रोगी के लिये बहुत लाभदायक है ।

आंशिक रूप से उबाल कर—‘पोच’ कर के या जली बना कर अंडे खिलाने से रोगी को बहुत लाभ होता है । अंडे को तोड़ कर थोड़े से खालते पानी में डाल कर ‘पोच’ किया जाता है । अंडे के स्वच्छ भाग के संपर्क होते ही, अंडे को खालते हुए पानी में से निकल लेना चाहिये । जली बनाने के लिए कोई तीन पाव पानी एक बरतन में खालने के लिए आग पर रख दीजिये । जैसे ही पानी खालने लगने, उसे आग पर से उतार कर अलग रख दीजिये और उस में दो साबुत अंडे डाल दीजिये । आवश्यक आंच लगने पर दस-पन्द्रह मिनट में छिलके के अन्दर अंडे ‘जली’ बन जाएंगे अर्थात् तसलसे हो जाएंगे । इस प्रकार तैयार किए अंडे जल्दी पच जाते हैं । अंडे से एक पोच बनता है जो जल्दी पच जाता है इसे ‘एग नोग’ (Egg-nog) कहते हैं । यह इस प्रकार बनता है कि अंडे को सफेदी को खूब फेंटा जाए यहाँ तक कि वह खूब उठ जाए अर्थात् कड़ा फेन बन जाए, फिर उस में जर्दी (पीला भाग) मिला दिया जाए और फिर फेंटा जाए । इस के बाद थोड़ी सी चीनी और



रोगी के पलंग पर आसानी से लगाई जाने वाली मेज ।

एक दो चम्मच अनानास का रस डाल दिया जाए। फिर इस फेंटे हुए अंडे का आधे गिलास दूध या फलों के रस में मिला कर रोगी को दिया जाए।

दस्त, पीचछ अमाशय या आंतों के किसी गम्भीर रोग में कभी-कभी रोगी को केवल अंडे का पानी ही दिया जाता है। दो अंडों की सफेदी को खांला कर ठंडा किया जाए एक गिलास पानी में घोलने से यह तैयार हो जाता है। स्वाद के लिये इस में कागजी नीबू का या बड़े नीबू का थोड़ा सा सत मिला दीजिये।

“कंजी” (पचपचं चावल) या भुने हुए गेहूं के आटे की लपसी भी रोगी के लिये उत्तम आहार है, रोगी चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। खांलाया हुआ ताजा दूध, भुने हुए आलू, खकर डाल कर उबाले हुए फल, जरारट की कंजी, डबल-रोटी के पतले टोस्ट रोगी के लिए उत्तम आहार हैं।

रोगी को खाने-पीने की जिन चीजों से परहेज करना चाहिये वे ये हैं—केक, मिठाइयां,

सामान्य प्रकार की मिठाइयाँ, भसालेदार सब्जी या गोश्त (मांस), काली या लाल मिर्च अदरक और बहुत नमक वाली चीजें ।

रोगी के लिये भोजन बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि ऐसा साफ भोजन बने जिस से रोगी की भूख बढ़े, और जो आसानी से पच सके ।

यदि रोगी की दशा अधिक गम्भीर हो तो उसे एक कमरा अलग मिलना चाहिये । इस कमरे में रोखनी अधिक चाहिए । इस में दो या दो से अधिक खिड़कियाँ हों । हँजे, इल्लिक-प्रदाह और लाल ज्वर आदि में रोगी एक ऐसे मकान में रखना चाहिये जिस में दूसरे लोग न लाल ज्वर आदि में रोगी को एक ऐसे मकान में रखना चाहिये जिस में दूसरे लोग न रहते हों; क्योंकि ये रोग इतने संक्रामक होते हैं कि रोगी के मकान में रहने वाले दूसरे लोगों की भी लग सकते हैं ।

छरीर का तापमान नापना


रुग्णा का स्पष्ट कर के ही सदा पता नहीं लगाया जा सकता कि अमुक व्यक्ति को ज्वर है या नहीं ? इस को जानने के लिये थर्मामीटर लगा कर देखना चाहिये । थर्मामीटर ९० डिग्री से लेकर ११० डिग्री फ. तक के चिन्ह होते हैं । एक तीर का निशान ९८ डिग्री फ. पर होता है, यह स्वस्थ व्यक्ति का "टेम्परेचर" होता है । यदि थर्मामीटर का पारा १०० डिग्री या इस से ऊपर चला जाए, तो समझना चाहिये कि रोगी को ज्वर है । १०३ डिग्री का ज्वर साधारण होता है और १०४ या १०५ डिग्री को बढा हुआ ज्वर समझना चाहिए ।

थर्मामीटर का प्रयोग करने के लिये उस के ऊपर के सिरे को अच्छी तरह पकीडिये । पारेवाला सिरा नीचे की ओर हो । उसे जल्दी-जल्दी कहीं बार इस प्रकार झटकीयें मानो आप ठंगलियों पर से कुछ फेंक रहे हों । ऐसा करने का मतलब यह है कि पारा थर्मामीटर के दूसरे सिरे पर आ जाए । तब थर्मामीटर का पारे वाला सिरा रोगी की जीभ के नीचे रख दीजिये । फिर रोगी से कहिये कि दांत न भीचें बल्कि मुँह बन्द कर लें । जीभ के नीचे थर्मामीटर तीन चार मिनट तक रक्खा रहने देना चाहिये ।

बगल को पोंछ कर उस में थर्मामीटर लगाया जा सकता है । बांह को खूब दबा कर छाती के निकट रखिये ।

बच्चे मुँह में रख कर थर्मामीटर को तोड़. न डालें इसीलिए उसे कुछ इंच गुदा में घुसा कर या जांघ के बीच में लगाने से भी काम चल जाता है ।

थर्मामीटर का प्रयोग करने से पूर्व और पश्चात् उसे साबुन और पानी से धो लेना चाहिये । गरम पानी का प्रयोग न कीजिये । पानी और साबुन से धो कर इसे शराब या लाइसोल के घोल में छाल कर धो लेना चाहिये । एक गिलास पानी में एक चम्मच शराब या लाइसोल हो ।



ऊपर:— धर्मान्मीटर को झटक कर पारा नीचे उतारने की रीति ।
नीचे:— धर्मान्मीटर छरीर का प्रसम तापमान बोधित कर रहा है ।

नाड.१

आयु के अनुसार नाड.१ की गति निम्नीलीखत होनी चाहिये:—


पँदा होने पर	एक मिनट में १२०-१५० बार
१ से २ साल तक	एक मिनट में ११०-१२० बार
२ से ४ साल तक	एक मिनट में ९०-११० बार
६ से १० साल तक	एक मिनट में ९०-१०० बार
१० से १४ साल तक	एक मिनट में ८०-९० बार
वयस्क व्यक्ति की	एक मिनट में ७२ बार

नाड.१ की धडकनें गिनने के लिये तीन उँगलियों के सिरों कलाई के बाहरी सिरों से एक इंच भीतर की ओर अंगूठे से एक इंच नीचे को रखिये ।

श्वास-गति

भिन्न-भिन्न आयु में श्वास-गति इस प्रकार होती है:—

पँदा होने पर	एक मिनट में ४० बार
२ वर्ष में	एक मिनट में २८ बार
४ वर्ष में	एक मिनट में २५ बार
१० वर्ष में	एक मिनट में २० बार
वयस्क व्यक्ति की	एक मिनट में १६ से १८ बार



नब्ब या नाह. देखने की रीत

ह्वास गिनने के लिये अपने एक हाथ में घड. लीजिये और दूसरा हाथ रोनी की छाती पर रखिये। प्रत्येक बार जब छाती फुले, तो गिनिये।

स्नान करना

बहुत से लोग सोचते हैं कि रोनी को स्नान नहीं करना चाहिये। यह एक बड़ी भ्रम की बात है। क्योंकि रोग को स्वस्थ लोगों की अपेक्षा बार-बार स्नान करने की आवश्यकता होती है। खरौरे के एक भाग को स्नान करा के झीछ. ही उसे सुखा देने से रोनी को सदा लबने का बिल्कुल भय नहीं रहता बहुत सी बीमारियों में तो स्नान करना उतना ही उपयोगी है जितना आर्षाधि का प्रयोग।

निःसंक्रमण (Disinfecting)

सामान्य संक्रामक रोगों के अध्याय में मल-मूत्र में के रोगाणुओं को नष्ट करने की विधि बताई गई है।

निःसंक्रमण की सब से अच्छी विधि है जलाना या उबालना। रोनी के धूक से भरे हुए कानज या कपड़े के टुकड़ों को जला देना चाहिये।

लबधन सभी पहनने के कपड़ों और बिस्तर की चादरों आदि को बिना हाथ के उबाला जा सकता है। रोनी द्वारा प्रयुक्त बस्त्र-कपड़ों को जब अन्य लोग कम में लाएं तो उन्हें सदैव पहले उबाल लेना चाहिये।

मल-मूत्र को टिन के डिब्बों में बन्द कर के और उन्हें उबाल कर फेंकना चाहिये या मल-मूत्र में कूड़ा-करकट डाल कर जला देना चाहिये।

यदि कीटाणु अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश में रहें तो वे मर जाते हैं। इस कारण रोनी के कमरे में अच्छी तरह सूर्य का प्रकाश जाना चाहिये और रोनी के बस्त्रों एवं बिस्तरे को कई घंटे तक धूप में डाले रखना चाहिये।

जिस मकान के छिड़.कॉ.दरवाजे अच्छी तरह बन्द किये जा सकते हैं, वहाँ निःसंक्रमण के लिए बी.ड.या.से बी.ड.या चीज होती है फॉर्मलडीहाइड (Formaldehyde or formalin) जो कपड़े, या बिछोने आदि थोए या उबाले न जा सकते हैं, उन्हें अच्छी तरह बन्द होने वाले एक बक्स में रखिये। एक तह लगाइये और उस पर एक छोटा चम्मच भर फॉर्मलीन (formalin) छिड़.क दीजिये; फिर दूसरी तह लगाइये और उस पर भी इसी प्रकार फॉर्मलीन छिड़.क दीजिये। अब बक्स को अच्छी तरह बन्द कर दीजिये और इसी तरह चौबीस घंटे तक बन्द रक्खा रहने दीजिये।

“बाइक्लोराइड आब मरकरी” (Bichloride of mercury) एक बहुत प्रचलित निःसंक्रमक या कीटाणु नाशक पदार्थ है। बहुत तेज विष होने के कारण बाजार में आसानी से नहीं ढूँढ सकता। प्रायः इस की बोलियाँ ढूँढती हैं। तीन पाव पानी में इस की दू टिकियाँ डाल कर ऐसा घोल बनाइये जिस से १,००० भाग पानी और एक भाग “बाइक्लोराइड आब मरकरी” है। रंगी को छूने के बाद हाथ धोने के लिए यह घोल काम आ सकता है। जब तौलिये या दूमाल रंगी के धुक में भरे हों तो उन्हें आधे घंटे तक इस में भिगो कर धोना चाहिये।

“कार्बोलीक एसिड” के घोल में प्रत्येक १०० भाग पानी में दू से लेकर ५ भाग तक कार्बोलीक एसिड के होते हैं। यह भी एक प्रचलित निःसंक्रमक या कीटाणुनाशक पदार्थ है।

लाइसोल भी बड़ा अच्छा कीटाणुनाशक द्रव्य है। इस के घोल में १०० भाग पानी और एक भाग लाइसोल है। (एक गिलास पानी में एक छोटा चम्मच भर लाइसोल) चूना भी एक उपयोगी निःसंक्रमक पदार्थ है। इसे घर के फर्श और चारों ओर डाल देते हैं। जब मल-मूत्र बाहर फेंक दिया जाए तो उस के ऊपर चूना डाल देना चाहिये।

नीला तृतिया (Sulphate of Copper) भी इस काम में लाया जा सकता है। इस का चम्मच चार गिलास पानी में मिलाना चाहिये।

जिस घर में कोई रंगी रह चुका हो वहाँ निःसंक्रमण के लिए फर्श, दिवारों और फरनीचर को पानी और साबुन से धो दिया जाए और यदि कार्बोलीक या “बाइक्लोराइड आब मरकरी” मिल सके तो उपर्युक्त विधियों द्वारा उस का घोल बना कर उस से फर्श आदि धोने चाहिये।



बच्चों के रोग

दस्त या जीतसार (Diarrhoea)

साधारण जीतसार, गम्भीर अपच (जर्जीण) और डिस्-इन्फैंटा (Cholera in infantum) जैसे कई रोगों का मुख्य लक्षण है दस्त या पतली टट्टी। परन्तु चूंकि इन सब का कारण और उपचार होता है, इसलिए इन सब को चर्चा एक साथ प्रस्तुत अध्याय में की जाएगी।

किसी-न-किसी प्रकार के जीतसार से प्रतिवर्ष हजारों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जीतसार कृमियों द्वारा लगता है। छोटे बच्चों के पाचन अवयव इतने कमजोर होते हैं कि वे कृमियों को नष्ट नहीं कर सकते। यह बात तो सभी जानते हैं कि बयस्क व्यक्ति की अपेक्षा बच्चे को मारने के लिए थोड़ा सा भी विष बहुत होता है। यह सत्य है कि थोड़ा सा गन्दा या दूषित, अपचनीय भोजन करने से बयस्क व्यक्ति को मामूली दस्तों की शिकायत हो सकती है, परन्तु बच्चे में यह अवस्था बहुत गम्भीर प्रकार की हो सकती है—यहां तक कि बच्चा मर भी सकता है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते और वे बच्चे को सब प्रकार का भोजन दे देते हैं और सोचते हैं कि बच्चा भी बड़े की भांति कोई भी चीज खा सकता है।

बच्चों में दस्तों की आम शिकायत का एक दूसरा कारण यह है कि बच्चों को मुख्यतः दूध या लपसी आदि दी जाती है और इन पदार्थों में रोग-कृमि बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं।

बच्चों को अधिकतर दस्त लग जाने का तीसरा कारण यह है कि उन्हें बहुत जल्दी ठंड लग जाती है और इसी सदी से उन्हें दस्त लग जाते हैं। बच्चों को बहुत नमी में भी सदी लग सकती है और इस कारण रात को कोई कपड़ा उन के पेट पर डाले रखना चाहिए जिस से पेट नंगा न रहे।

दस्तों में भोजन नहीं पचता और वह बिना रक्त में मिले, जिस से शरीर के विकास के लिये नमी और शक्ति मिलती है, अन्न-मार्ग में से निकल जाता है। इस रोग में बच्चा न केवल खाने से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करता, बल्कि उस के शरीर का अधिक रस बाहर निकल जाता है। इसी से ऐसे रोगी बच्चों की टट्टी बहुत पतली और पानी के समान होती है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों के इस रोग को कम गम्भीर



उचित ढंग

अनीचित ढंग

नहीं समझना चाहिये, वरन् जब कभी पतला पानी जैसा दस्त आए तभी उस की उचित चिकित्सा करनी चाहिये ।

दस्तों को रोकना

छोटे बच्चों को दस्त लग जाने के कारण जानकर समझदार माता-पिता को उन को रोकने में समर्थ होना चाहिये ।

चारों ओर की गन्दगी

सब से पहले बच्चों को गन्दे फर्श या सहक पर पड़ने, बैठने या खिसकने न दीजिये । विशेषकर मिट्टी और ईंट के फर्श बहुत गन्दे होते हैं । सहकों और टोट्टियों से जो गन्द और धूल जूतों के साथ फर्श पर आती है इस से फर्श बहुत ही गन्दे हो जाते हैं । यदि घर में जानवर हों तो वे भी फर्श की गन्दगी को बढ़ा देते हैं ।

गन्दे घरों में रहने वाले बच्चों को लगने की अधिक सम्भावना रहती है । कमरे के कोनों और फर्नीचर के नीचे से धूल आदि का साफ कर के मकान साफ रखना चाहिये । यदि फर्श मिट्टी या ईंट का हो, तो उस के कोनों और फर्नीचर के नीचे चूना डाल दीजिये । भूमियों के बच्चों तथा दूसरे जानवरों को घर के भीतर न आने दीजिये । बच्चों को फर्श पर टट्टी-पंखाय कभी न कराइये । यदि फर्श भूमि से कुछ ऊंचा है तो उस भूमि को साफ रखना चाहिये । स्नान-गृह तथा रसोई-घर का गन्दा पानी भूमि पर नहीं फेंकना चाहिये । आंगन को बार-बार झाड़-बुहार कर साफ रखना चाहिये । गोबर के ढेर या कुड़े-कचरे या आंगन

की नन्दी नालियों में हजारों रोग-उत्पादक कृमि पलते हैं। जो छोटें-छोटें बच्चे आंगन में खेलते हैं उन के अन्दर ये कृमि घुस जाते हैं।

मक्खियाँ जितसार फैलाती हैं

मक्खियाँ बच्चों को मार डालती हैं ! वे मल, नोबर और कूड़े-कचरे के ढरे और सब नन्दे स्थानों से रोग कृमि लाकर बच्चों के भोजन पर छोड़ देती हैं। बच्चों के लिये भोजन तैयार करने के बाद छंक कर रखना चाहिये ताकि मक्खियाँ से बचा रहे, क्योंकि जब कोई मक्खी बच्चों के दूध पीने की बोतल की चुसनी पर या उस के खाने पर जा बैठती है, तो उस पर नन्दी और विषल रोग-उत्पादक कृमि छोड़ जाती है। जब बच्चा दूध पीता है या यह खाना खाता है तो ये रोग-कृमि उस के पेट में चले जाते हैं और पीरणाम यह होता है कि उसे दस्त लग जाते हैं। मक्खियों के विषय में और बहुत सी बातें और उन्हें नष्ट करने की विधि अध्याय १६ में दी जा चुकी है।

नन्दा दूध और दूध पिलाने की बेली बोतलें

रोग कृमियों को मारने के लिये दूध को उबालने की आवश्यकता अध्याय २० में बताई जा चुकी है। यदि बच्चे का दूध आदि उबाल कर साफ कर लिया जाए और फिर किसी बरतन में छंक कर रख दिया जाए; और यदि दूध पिलाने की बोतल और चुसनी को बार-बार उबाल कर साफ रखा जाए, तो जितसार और बहुत से अन्य रोगों से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है।



बच्चों के बहुत से रोगों का कारण मक्खियाँ होती हैं।

अनीयत व अनियमित खान-पान

ऐसे हुए बच्चों को केक-मिठाइयाँ दे कर धोड़ा देर के लिये चुप कराया जा सकता है, परन्तु इन को खाकर दस्त और जो दूसरी बीमारियाँ लग जाती हैं उन के कारण बच्चों को घंटों रोना पड़ता है और अन्त में बच्चा मर भी सकता है। मक्खियाँ को मिठाइयाँ बहुत भाती हैं, इसीलिए वे इन पर आ बैठती हैं, इन्हें खाती हैं और टट्टी और पेशे और थानों में लिपटी हुई बन्दूकी इन पर छोड़ जाती हैं। मिठाइयों आदि को मक्खियाँ ही नहीं बन्दा करतीं और खतरनाक बनाती, बल्कि सह.कों में की धूल और फेरी-वालों के हाथों से भी वे बन्दी हो जाती हैं। इसीलिए सब से अच्छी बात यही है कि फेरी-वालों से बच्चों के लिये इस प्रकार की चीजें न खरीदी जाएँ और यदि खरीदी जाएँ तो ऐसी हों जो थोड़े कर बच्चों को दी जा सकें। इस प्रकार की चीजें यदि बच्चों को असमय दी जाएँ, तो दुबनी होनी होती है। प्रत्येक बच्चे को नियोजित समय पर खिलाना-पिलाना चाहिये। खान-पान के नियमित समयों के बीच कुछ नहीं देना चाहिये।

माता को किसी बीमारी के कारण, या माता के किसी आघात के संबन्ध के फलस्वरूप, या माता के अपने दूध में बड़बड़ा पड़ा करने वाली कोई चीज खाने-पीने से दूध पीते बच्चों को गम्भीर प्रकार के दस्त लग जाते हैं। दूध पीते बच्चों को दस्त लग जाने पर उस को सफल चिकित्सा के लिए इन बातों का मालूम करना आवश्यक हो जाता है कि कहीं माता को कोई ऐसा रोग तो नहीं, या कहीं माता ने किसी ऐसी आघात का संबन्ध तो नहीं किया, या कोई ऐसी चीज तो नहीं खा-पी ली जिस ने बच्चों को दस्त लगा दिए हों।

छोटे बच्चों के अतिसार को चिकित्सा

सफल चिकित्सा के लिए ये तीन उपाय बहुत ही आवश्यक हैं:—

१. जब तक दस्त बन्द न हो जाएँ, तब तक बच्चों को दूध किसी रूप में भी न दिया जाए।

२. उसे खूब पानी पिलाया जाए।

३. उस के अन्न-मार्ग को साफ किया जाए।

इन तीन उपायों के आतिरक्त और भी कुछ उपाय हैं, परन्तु सब से पहले इन्हें तीनों पर ध्यान देना चाहिये।

बहुत छोटे बच्चों को चाय का एक चम्मच भर और चार-से-पांच वर्ष तक के बच्चों को चाय के दो चम्मच भर अरंडी का तेल (Castor Oil) दीजिये।

दस्तों से पीड़ित बच्चा यदि दूध पीता हो, तो कम-से-कम पूरे एक दिन तक उसे दूध न दीजिये। ऐसे बच्चों का अमाशय और उस की आंतें दूध नहीं पचा सकतीं। जो दूध पचता नहीं वह अन्न-मार्ग में पड़ा रहता है और दस्तों के कृमियों का आहार बन जाता है जिस से और भी विष पैदा होता है।

दूध के बदले बच्चों को पीच (Rice Water) पिलाइये (दीर्घायु परीक्षित, नुस्खा न. २५) अंडे की फिट्टी हुई सफेदी (egg-albumin) मिलना पानी और खूब पका हुआ केला

कुचल कर दो-दो घंटे बाद दीजिये। इन चीजों के अतिरिक्त दस्त बन्द हो जाने तक और कुछ न दीजिये।

बच्चों को अच्छी तरह तरल पदार्थ (fluids) दिए जाएं क्योंकि दस्तों के बेच में जब हर बार बच्चों को दस्त होता है तो उस के शरीर से बहुत सा तरल पदार्थ निकल जाता है। यह तरल पदार्थ उस के खून से आता है; इसीलिए उसे खाला हुआ नरम पानी यथेष्ट मात्रा में देना चाहिये। बीच-बीच में साधारण जल न देकर उसे पीच भी देनी चाहिये।

जब दस्त और कै (उल्टी) साथ-साथ होते हैं तो इस से पता चलता है कि शरीर कोई ऐसी चीज बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है जो अन्न-मार्ग को हानि पहुंचा रही है। बच्चों के अन्न-मार्ग में सड़ा हुआ और अपचनीय भोजन ही दस्तों और कै का कारण होता है। जिस प्रकार आंख में मिर्च पड़ जाने पर आंख से पानी निकलने लगता है और आंख फड़कती है ताकि मिर्च को बाहर निकाल दे, उसी प्रकार अन्न-मार्ग भी पीड़ा पहुंचाने वाले पदार्थ को बाहर निकालना चाहता है। अन्न-मार्ग को साफ करने के लिए बच्चों को आध-आध घंटे बाद जितना खाला हुआ नरम पानी वह पी सके पिलाइये। यह पानी अन्न-मार्ग में पहुंच कर उसे साफ करने में सहायता देता है। डेढ़ पाव पानी में आधा चम्मच नमक मिला दीजिये। हर बार दस्त होने के बाद बच्चों को इसी नमकीन पानी का आनमा दीजिये। (देखिये अध्याय २१) आनमा देने के पानी का तापमान १०५ डिग्री फ. होना चाहिये। हर तीन घंटे बाद बच्चों के पेट को गर्म पानी की सेंक दीजिये। बच्चों को बिस्तर में चुपचाप लेटा रहना चाहिये। उसे बिस्तर से बिलकुल न उठने दीजिये क्योंकि कोई भी शारीरिक काम करने से रोग बढ़ जाता है।

एक दिन तक इस प्रकार चिकित्सा करके दस्त रोकने के लिए हर तीन या चार घंटे बाद नरम पानी का आनमा और पौरीश्ट में न. ७ (ख) की आंशिक का एक चम्मच चार-चार या पांच-पांच घंटे बाद दीजिये। इबेतसार (Starch) का आनमा देने के लिये इबेतसार का घोल इस प्रकार बनता है: पहले कई चम्मच इबेतसार (मक्का, चावल या गेहूं का) थोड़े से ठंडे पानी में मिलाइये और फिर एक गिलास पानी डाल कर उसे खालने को रख दीजिये। फिर उसे ठंडा कर लीजिये। इबेतसार का घोल काफी पतला होना चाहिये। संकने की क्रिया पहले दिन की चिकित्सा की भाँति ही जारी रहे। पहले दिन की अपेक्षा रोगी को कम पानी देना चाहिये।

बच्चों के पेट को किसी हल्के कपड़े से ढंके रखना चाहिये जिस से कहीं ऐसा न हो कि बच्चों को सदाँ लग जाए और दस्तों की दशा और नब्भीर हो जाए।

बच्चों को जल्दी-जल्दी नहलाना चाहिये और उस के बिस्तर को साफ रखना चाहिये। मक्खियों से उसे बचाने के लिये उस के पलंग पर मच्छरदानी लनी रहनी चाहिये। जो चम्मच और बरतन रोगी बच्चा इस्तेमाल करता है उन्हें घर के दूसरे बच्चों को इस्तेमाल न करने दीजिये। रोगी के सब बरतनों और चम्मचों को उस के इस्तेमाल करने के बाद उबाल लेना चाहिये।

क्रीमो-सक्सिडाइन (Cremo-Suxidine) नाम की आंशिक अतिरिक्त के उपचार में अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई है। डॉक्टर के आदेशानुसार ही उसे देना चाहिए। यदि दस्त

किसी प्रकार बन्द ही न हों, तो पीड.।.सुमन-आर्षाधि (Paregoric) मिले "चपल-दुग्ध" (Milk of bismuth) का प्रयोग आवश्यक हो जाता है।

मुंह जाना

दूध पीते बच्चों में यह बीमारी आम होती है, क्योंकि बच्चे की दूध पीने की बोतल और चुसनी को साफ न रखने से ही यह होती है। अपनी उंगली पर जाली या पतला कपड़ा लपेट कर और उसे बाँरक एगसठ के घोल में डबा कर दूध पिलाने से पहले और बाद बच्चे का मुँह साफ करीजिये (देखिये पीरीश्ट, नुसखा नंबर १) एक या उस से अधिक वर्ष की आयु के बच्चों का मुँह आ जानें पर उस के मुँह को पोटोशियम क्लोरेट (Potassium chlorate) के सीमीशरत घोल से धोने पर बहुत लाभ होगा। यदि मुँह के अन्दर छोट-छोट सफेद छाल निकल आए हों तो फिट्करी का भस्म (देखिये पीरीश्ट, नुसखा नम्बर ८) लगाइये। यदि रोग निरन्तर बढ़ता जाए तो किसी योग्य डॉक्टर को दिखाना चाहिये।

उदर-झूल या वायु-झूल (Colic)

उदर-झूल के आक्रमण के साथ ही बच्चा अचानक जोर-जोर से रोने लगता है; ज्यों-ज्यों पीड.। बढ़ती है, त्यों-त्यों वह अधिक जोर से रोता है और पीड.। कम होने पर उस का रोना भी कम हो जाता है। आमाशय और आंतों में वायु भर जाती है और पेट तन जाता है और सख्त हो जाता है। इस पीड.। के होने पर बच्चा अपनी जांघों से सिकुड़ कर पेट के ऊपर ले जाता है। यह रोग प्रायः उन बच्चों को होता है जिन्हें ऊपरी दूध दिया जाता है या जिन को बार-बार दूध पिलाया जाता है या बहुत भीठा दूध दिया जाता है या ऐसा दूध दिया जाता है जिस में कोई कमी या दोष हो। बच्चों को ठीक तरह से न पकाया हुआ कोई भी भोजन देने से बहुधा उदर-झूल उत्पन्न हो सकता है।

चिकित्सा

चम्मच या बोतल से गरम पानी पिलाने से रोग जाना रहता है। कपड़े के टुकड़े, को गरम करके बच्चों के पेट पर रखिये। यदि इस से भी लाभ न हो तो १०५ डिग्री फ. के तापमान के डेटे. पाव पानी से बच्चों को अनीमा दीजिये। पानी में एक चम्मच नमक, दो चम्मच (एक आंस) ग्लिसरीन मिलाइये। अनीमे से आंतों का ऊपरी भाग साफ न हो सके, इस से अनीमे के आतिरिक्त एक खुराक अरंडी के तेल (Castor Oil) की भी देनी चाहिये। यदि झूल बार-बार हो, तो पीरीश्ट में दिये हुए नुस्खे नम्बर ७ (ख) की आर्षाधि तीन दिन तक, दिन में दो-दो बार दीजिये।

नोट: आर्यवैदिक ग्रंथों में Bismuth के लिए 'चपल' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यह Milk of bismuth के लिए 'चपल-दुग्ध' बनाया गया है—अनुवादक

बन्दे और अपचनीय भोजन से ही यह रोग होता है। इस उद्देश्य के लिए कि यह रोग फिर कभी न हो इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि भोजन साफ और अच्छा हो।

झरोर (पीछियों) में एंठन (Convulsions)

छोटे बच्चों में इस रोग के दौरे के कई कारण होने हैं, जैसे अनूचित और अपचनीय भोजन, सूखे का रोग, आंतों में परजीवी —parasites— (कृमि), मलेरिया और ईजा। इस का दौरा पहले पर मुँह या हाथों की पीछियाँ अकड़ने या एंठने लगती हैं, चंहरा अचानक पीला पड़ जाता है, आँखें स्थिर हो कर ऊपर की चढ़ जाती हैं, सिर पीछे की ओर झुक जाता है, हाथों की मूटियाँ बंध जाती हैं और टाँगें एंठन से ऊपर खिंच जाती हैं।

चिकित्सा

जितनी जल्दी हो सके बच्चों को नहलाने के लिये १०५ डिग्री फ. तापमान का पानी तैयार कर लिये। बच्चों को पानी में बिठाइये और उस के सिर पर ठंढे पानी में भिगा कर निचाँडा। हुआ कपडा रखिये। चूंकि यह रोग आंतों में सट्टे हुए या अपचनीय भोजन के कारण होता है इसलिए बच्चों को गरम पानी में बिठाने के बाद उसे गरम पानी का आनिमा और चाय का एक चम्मच भर या इस से कुछ अधिक आरंड़ी का तेल (Castor Oil) देना लाभदायक सिद्ध होता है। बच्चों को दिये जाने वाले भोजन के विषय में विशेष सावधानी बरतिये क्योंकि यह रोग सट्टे या अपचनीय भोजन से ही होता है। कमी गाय या बकरी का दूध बन्द करना आवश्यक हो जाता है और उस के बदले वाष्पीभूत दूध (Evaporated Milk) या बच्चों का कंडा बना-बनाया खाना दिया जाता है। बालक को टट्टी पर बठा। ध्यान देना चाहिये जिस से कब्ज को दूर किया जा सके।

सूखे का रोग

यह अस्थि-रोग है जो प्रायः ऊपरी दूध पीने वाले बच्चों को हो जाता है। जब बच्चा ६ से १५ महीने का होता है तब यह रोग होता है। "सिर के कोमल स्थान" (Fontanels) ठीक समय पर बन्द नहीं होते। टाँगों की हड्डियाँ टूटती हो जाती हैं। उदर प्रायः बड़ जाता है और बच्चा कमजोर और छोटा रह जाता है। इस का कारण अक्सर बच्चों को धूप न लगना होता है।

चिकित्सा

यह रोग उचित भोजन—बहु पदार्थ जिस की आवश्यकता हड्डियाँ बनने के लिये होती है—न मिलने के कारण होता है। अतः पहला काम उसे ठीक तरह का दूध देना होगा। दिन में कई बार उसे फलों का रस देना चाहिये। एक साल का या उस से अधिक आयु

के बच्चों को दूध के अतिरिक्त अंडे और फलों का रस भी देना चाहिये। दूध के रूप में इन बच्चों को प्रोटीन हेलीबट लिवर आयल (Halibut Liver Oil) को १५ या २० बूंदें या शार्क लिवर आयल (Shark Liver Oil) चाय का एक चम्मच भर देना चाहिये। यह अच्छी तरह उबाले हुए दूध में या ऐसे ही दे देना चाहिये। कौंठ लिवर आयल दिन में दो बार डेढ़ चम्मच तक दिया जा सकता है।

खांसी और जकम

बहुत से बच्चों को खांसी और सर्दी सदा सताया करती है। खांसी के कितने ही कारण हो सकते हैं। अतः यह सांच लेना महान् मूर्खता है कि कोई विशेष औषधि प्रत्येक प्रकार की खांसी का इलाज कर सकती है। खांसी को दूर करने की बहुत सी विज्ञप्त औषधियाँ में अफीम या मारफीया (Morphine) होता है। ये चीजें बहुत खतरनाक होती हैं, और उन्हें कभी बच्चों को नहीं देना चाहिये। खांसी का सब से अच्छा इलाज उस के कारण को नष्ट कर देना है। इस का कारण नदूद या ग्ल-ग्रैंथिया (Adenoids), या बड़े हुए जाना ग्लसू (Tonsils) या तालू का लम्बा और नरम हो जाना है। इन दशाओं में रोगी को किसी योग्य डॉक्टर के पास ले जाना चाहिये और नदूदों, ग्लसू या तालू का इलाज करवाना चाहिए। खांसी सर्दी लग जाने से या फेफड़ों के क्षय रोग से भी होती है। हर दशा में चिकित्सा का उद्देश्य खांसी के कारण को नष्ट करना होना चाहिये। यदि कारण ठीक तरह से मालूम न हो सके तो परीक्षित (न. ३१) में वर्णित बफारे (the steam inhalation) से अवश्य लाभ होगा।

जकम और उस की चिकित्सा

सब से पहले गरम पानी के जनिम से पेट को साफ कर लीजिये। (देखिये अध्याय २१) जनिम के साथ एक चम्मच कैस्टर आयल को भी दीजिये। (बच्चों को यदि संतरे के रस या किसी दूसरे फल के रस में कैस्टर आयल मिला कर दिया जाए तो वह उसे आसानी से पी लेगा)। बच्चों को कोई नरम चीज पीने को दीजिये, या तो एक-दो प्याले फलों का (मीठी मसामियाँ हों तो अच्छा है) नरम रस या कोई नरम झोरबा (Soup)। बच्चों को बिस्तर पर लिटा दीजिये। उस उस कमरे में रहना चाहिये जिस की खिड़कियाँ खुली हों और जहाँ रोखनी और हवा ठीक से आ सके। कुछ दिन तक उस का भोजन कम कर दीजिये। पसीना निकल जाने के पश्चात् बच्चों के शरीर को अच्छी तरह अंगोष्ठ कर उसे सुखा डालिये। यदि खांसी बन्द न हो तो सेंक का प्रयोग (देखिये अध्याय २१) आवश्यक हो जाएगा। यह सेंक दिन में दो बार छाती पर १५ मिनट तक देना चाहिये। यह काम ऐसे कमरे में करना चाहिये जहाँ प्रत्यक्ष रूप से रोगी पर हवा न आए। जब तक खांसी दूर न हो जाए तब तक चिकित्सा लगातार करनी आवश्यक है। सर्दी की चिकित्सा यदि यत्नपूर्वक न की जाए तो यह फेफड़ों का गम्भीर रोग बन जाएगा। सर्दी का रोग बिगड़ कर निमोनिया का रूप धारण कर लेता है और कभी छाती के गह्वर में पीप जमा हो जाती है या क्षय रोग हो जाता है।

उचित बाढ़

सा मान्यतया बच्चों को प्रति मास एवं प्रतिवर्ष उससेतर वृद्धि की प्राप्ति होना चाहिये। साधारणतः हर महीने बच्चे एक ही स्थिर गति से नहीं बढ़ते, प्रत्युत कुछ समय तक तेजी से बढ़ते हैं और फिर अगली बाढ़ के वन के लिये पर्याप्त ऊर्जा संचय करने के लिये रुक कर आराम लेते मालूम पड़ते हैं। जस्तु, सारे बाल्यकाल में तथा बचपन से कर्मार्थ अवस्था में बच्चों की बाढ़ की प्रक्रिया समान रूप से चालू रहनी चाहिये। यदि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक-ठीक बना रहे, तो निश्चित रूप से उस का वजन भी बढ़ना चाहिये।

अनेक बार किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ऊँचाई, वजन और उम्र का परस्पर निश्चित सम्बन्ध होता है। ये सम्बन्ध लड़कों और लड़कियों के लिए इस के साथ दी हुई तालिका में प्रदर्शित किए गए हैं।

यह बात जान लेनी चाहिये कि यावनारम्भ-काल में बालक की ऊँचाई और वजन में जल्दी-जल्दी बढ़ते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ जल्दी यावनारम्भ-काल को प्राप्त हो जाती हैं। ११ या १२ वर्ष की अवस्था की बालिका उसी अवस्था वाले या अपने से एक दो वर्ष बड़े बालक की अपेक्षा कद में बड़ी और प्रत्येक छोट से अधिक परिपक्व (विकसित) हो सकती है। यदि किसी कुटुम्ब में ऐसा हो तो चिन्ता की कोई बात नहीं। बालक को इन दिनों इस बात का विश्वास दिलाया जाए या इस अवस्था को प्राप्त होने से पीहले ही उसे सब बातें समझा कर तैयार कर दिया जाए, जिस से वह अपनी बहन का अपनी अपेक्षा अधिक तेज रफ्तार से बढ़ना स्वाभाविक बात समझे।

दी गई तालिकाएँ बड़े विश्वास के साथ प्रयोग में लाई जा सकती हैं, यद्यपि स्वभावतः यह बात स्मरणीय है कि कुछ जातियाँ लम्बी होती हैं और कुछ छोटी (नाटी)। इसी प्रकार कुछ कुटुम्ब के सदस्य लम्बे होते हैं तो कुछ के छोटे (नाटे)। अतएव ऊँचाई, वजन और अवस्था पर विचार करते समय ये जातीय अथवा पारिवारिक अंतरों का ध्यान रखना चाहिये। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी बच्चे की ऊँचाई और वजन की वृद्धि में किसी नम्बर रोग से रुकावट पड़ सकती है, परन्तु उचित देख-रेख और पोषक भोजन द्वारा बीमारी के समय की कमी पूरी हो जानी चाहिये। यह नितांत सत्य है कि लम्बे समय तक पोषक भोजन की कमी से बालक की वृद्धि सदा के लिये कुंठित हो सकती है—जिस से वह उस ऊँचाई और वजन को कभी पूरा नहीं कर सकता जो वह साधारणतया

बालकों के लिये ऊँचाई तथा आयु की तालिका

इसमें ऊँचाई	५ वर्ष	६ वर्ष	७ वर्ष	८ वर्ष	९ वर्ष	१० वर्ष	११ वर्ष	१२ वर्ष	१३ वर्ष	१४ वर्ष	१५ वर्ष	१६ वर्ष	१७ वर्ष	१८ वर्ष	१९ वर्ष
३८	३४	३४													
३९	३५	३५													
४०	३६	३६													
४१	३८	३८	३८												
४२	३९	३९	३९	३९											
४३	४१	४१	४१	४१											
४४	४४	४४	४४	४४											
४५	४६	४६	४६	४६	४६	४६									
४६	४७	४८	४८	४८	४८	४८									
४७	४९	५०	५०	५०	५०	५०									
४८		५२	५३	५३	५३	५३									
४९		५५	५५	५५	५५	५५	५५								
५०	५७	५८	५८	५८	५८	५८	५८	५८							
५१		६०	६१	६१	६१	६१	६१	६१							
५२		६३	६४	६४	६४	६४	६४	६४	६४						
५३		६६	६७	६७	६७	६७	६७	६८	६८						
५४			७०	७०	७०	७०	७१	७१	७२						
५५			७२	७२	७३	७३	७४	७४	७४						
५६			७५	७६	७७	७७	७७	७८	७८	८०					
५७			७९	८०	८१	८१	८१	८२	८३	८३					
५८			८३	८४	८४	८५	८५	८६	८६	८७					
६०				९१	९२	९२	९३	९३	९४	९५	९६				
५९				८७	८८	८९	८९	९०	९०	९०					
६१					९५	९६	९७	९९	१००	१०३	१०६				
६२					१००	१०१	१०२	१०३	१०४	१०७	१११	११६			
६३					१०५	१०६	१०७	१०८	११०	११३	११८	१२३	१२७		
६४						१०९	१११	११३	११५	११७	१२१	१२६	१३०		
६५						११४	११७	११८	१२०	१२२	१२७	१३१	१३४		
६६							११९	१२२	१२५	१२८	१३२	१३६	१३९		
६७							१२४	१२८	१३०	१३४	१३६	१३९	१४२		
६८								१३४	१३४	१३७	१४१	१४३	१४७		
६९								१३७	१३९	१४३	१४६	१४९	१५२		
७०								१४३	१४४	१४५	१४८	१५१	१५५		
७१								१४८	१५०	१५१	१५२	१५५	१५९		
७२									१५३	१५५	१५६	१५८	१६३		
७३										१५७	१६०	१६२	१६४	१६७	
७४											१६०	१६४	१६८	१७०	१७१

बालिकाओं के लिये ऊंचाई तथा आयु की तालिका

हजो मं	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
मंजारी	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
३८	३३	३३												
३९	३४	३४												
४०	३६	३६	३६											
४१	३७	३७	३७											
४२	३९	३९	३९											
४३	४१	४१	४१	४१										
४४	४२	४२	४२	४२										
४५	४५	४५	४५	४५	४५									
४६	४७	४७	४७	४८	४८									
४७	४९	५०	५०	५०	५०	५०								
४८		५२	५२	५२	५२	५३	५३							
४९		५४	५४	५५	५५	५६	५६							
५०		५६	५६	५७	५८	५९	६१	६२						
५१			५९	६०	६१	६१	६३	६५						
५२			६३	६४	६४	६४	६५	६७						
५३			६६	६७	६७	६८	६८	६९	७१					
५४				६९	७०	७०	७१	७१	७२					
५५			७२	७४	७४	७४	७५	७७	७८					
५६				७६	७८	७८	७९	८१	८३					
५७				८०	८२	८२	८२	८४	८८	९२				
५८					८४	८६	८६	८८	९३	९६	१०१			
५९					८७	९०	९०	९२	९६	१००	१०३	१०४		
६०					९१	९५	९५	९७	१०१	१०५	१०८	१०९	१११	
६१						९९	१००	१०१	१०५	१०८	११२	११३	११६	
६२							१०४	१०५	१०६	१०९	११३	११५	११७	११८
६३								११०	११०	११२	११६	११७	११९	१२०
६४								११४	११५	११७	११९	१२०	१२२	१२३
६५								११८	१२०	१२१	१२२	१२३	१२५	१२६
६६									१२४	१२४	१२५	१२८	१२९	१३०
६७									१२८	१३०	१३१	१३३	१३३	१३५
६८									१३१	१३३	१३५	१३६	१३८	१३८
६९										१३५	१३७	१३८	१४०	१४२
७०										१३६	१३८	१४०	१४२	१४४
७१										१३८	१४०	१४२	१४४	१४५

आवश्यक वृद्धि के समय ठीक-ठीक प्रकार का भोजन प्राप्त करने पर सुगमता से प्राप्त कर सकता है।

ऊँचाई, वजन और उम्र की तालिका वृद्धिमता से प्रयोग करने के लिये सब से पहले ऊँचाई को लेना चाहिये। दीवार पर सही प्रकार अंकित नाप लगा दी जाए। इस के लिये दो गजों या फीटों को दीवार के साथ बांध दिया जाए या ठीक-ठीक प्रकार से खींचे हुए पैमाने का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों के जूते उतरवा कर उसे दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ा कीजिये कि उस की एगड्या कंधे और सिर दीवार को छूते रहें। तब लकड़ी का एक समकोण टुकड़ा (कभी-कभी एक छंटा हत्का बक्सा या बटुई की गीनया) दीवार से बच्चों के सिर के ऊपर नापने के पैमाने के सहारे रखिये। इस से ऊँचाई का ठीक-ठीक पता चल जाएगा क्योंकि यदि लकड़ी का समकोण टुकड़ा दीवार के सहारे चपटा हो और बच्चों के सिर को ठीक तरह छूता हो तो ऊँचाई सही की जा सकती है। ऊँचाई बच्चों के सिर की चाँटी (चाँद) से लेनी चाहिये। गुंथे बालों के ऊपर से नहीं।

इस के बाद बच्चों की आयु का निश्चय करना चाहिये। बच्चों की उम्र का हिसाब लगाने में गिनती के लिये सब से निकट का जन्म-दिन गिनना चाहिये। इस तालिका में जन्म के बाद एक वर्ष के बालक की अवस्था एक वर्ष की मानी गई है।

तीसरी बात इस बालक के ठीक-ठीक वजन की जानकारी के लिये उम्र और ऊँचाई को देखना चाहिये। पहले बाएँ स्तम्भ में ऊँचाई ज्ञात कीजिये। इस प्रकार ज्ञात किया हुआ अंक यह विदित करेगा कि इस बच्चों की ऊँचाई और उम्र के अनुसार इस का वजन क्या होना चाहिये। चौथी बात—बच्चों का वजन लेना—बच्चों को सामान्य कपड़े पहनाइये परन्तु जूते पहनाने की आवश्यकता नहीं। वजन की मशीन के बीच में उसे खड़ा कर दीजिये। आसानी से बच्चों का वजन ले लिया जा सकता है, परन्तु नियमित रूप से मासिक वजन लेने पर ऊँचाई और वजन का लेखा रखने वाला व्यक्ति ही बच्चों के वजन का भी लेखा रखे।

इस के बाद वह व्यक्ति नियमित तालिका के रूप में वजन, ऊँचाई और अवस्था का लेखा रखे।

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये तालिकाएँ किसी दी हुई अवस्था में ऊँचाई और वजन के खास नमूने न होकर मुख्यतः अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। महत्व की बात जिस पर बल दिया जाना चाहिये प्रतिमास वजन में वृद्धि और कीमोरा-वस्था प्राप्त होने तक ऊँचाई इत्यादि की सर्वोत्तम उन्नति का अध्ययन है।

ऊँचाई और वजन की वृद्धि के सम्बन्ध में माता-पिता तथा शिक्षकों को भोजन के तत्व और बच्चों की बाढ़ से उन के सम्बन्धों का अध्ययन करना चाहिये। इस के अतिरिक्त स्वास्थ्य के अनुकूल आदतों और बच्चों की ऊँचाई तथा वजन पर उन के प्रभाव का भी अध्ययन करना चाहिये।



सामान्य संक्रामक रोग

डिफ्थीरि-प्रदाह (Diphtheria)

यह एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो बच्चों को हो जाती है। यह डिफ्थीरि-प्रदाह के कृमियों द्वारा होती है। गले और नाक में जहाँ ये कृमि इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ न केवल घाव कर देते हैं बल्कि एक प्रकार का विष भी पैदा करते हैं जिस से हृदय को हानि पहुँचती है।

डिफ्थीरि-प्रदाह संक्रामक रोग है। जिन्हें यह रोग हो या जिन को हाल में ही हो चुका हो और जिन के गले में अभी तक रोग-कृमि हों और जो छींक कर या खांस कर उन्हें फैलाते हों, उन से बच्चों को यह बीमारी लग जाती है।

बच्चों को यह रोग उन चम्मचों और प्यालों से भी लग जाता है जिन का प्रयोग पहले रोगी द्वारा किया जा चुका हो और फिर जिन को खालिते हुए पानी से साफ न किया गया हो। दूसरों के खेलते हुए खिलाने, विशेषकर सीटियाँ और ऐसी चीजें जिन्हें बच्चे मुँह में डाल लेते हैं, इस बीमारी को फैलाने के साधन होते हैं।

डिफ्थीरि-प्रदाह से पीड़ित जब कोई बच्चा खांसता या छींकता है तो वह कमरे की हवा में हजारों-लाखों डिफ्थीरि-प्रदाह के कृमि फैलाता है। यही कारण है कि यदि कोई दूसरा बच्चा उस कमरे में आए तो निश्चित रूप से उसे यह रोग लग जाएगा। यदि यह रोग मुहल्ले में फैला हुआ हो तो अपने बच्चों को उन घरों के पास तक न जाने दीजिये जहाँ रोगी बच्चे हों। डिफ्थीरि-प्रदाह फैला हुआ हो तो बच्चों को घर ही में रखना चाहिये और बाहर जा कर दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलने देना चाहिये।

लक्षण

डिफ्थीरि-प्रदाह का प्रथम लक्षण गला दुखना है। यह लक्षण रोग लगने दो दिन से सात दिन के बाद प्रगट होता है। यदि आप के पड़ोस में डिफ्थीरि-प्रदाह फैला हुआ हो और आप का बच्चा गला दुखने की शिकायत करे, तो उस की उपेक्षा न कीजिये, बल्कि गले का निरीक्षण कीजिये। हो सकता है कि पतली चपटी साफ लकड़ी या बांस के टुकड़े से जीभ को दबा कर गले को देखना आवश्यक हो

पहले-पहल गला गहरे लाल रंग का दिखाई देना, परन्तु तीसरे दिन बलसूजों या तालुमूलों (Tonsils) पर दूसरे रंग की झिल्ली सी दिखाई देगी (पृष्ठ २० पर चित्र देखिये)। बच्चों के निगलने में भी कठिनाई होती है और थोड़ा-बहुत उबड़ भी रहता है।

चिकित्सा

ज्योंही पता चले कि बच्चों को डिफ्थीरिया-प्रदाह है त्योंही किसी योग्य डॉक्टर को बुलाना चाहिये। यह सोच कर कि हम स्वयं ही रोग को चिकित्सा कर लेंगे डॉक्टर को बुलाने में विलम्ब न कीजिये। केवल एक आँषाधि है जो इस को ठीक करती है और वह है 'डिप्थीरिया एन्टी-टॉक्सिन' (Diphtheria Anti-toxin)। यह रक्त-रस (Serum) घोंढे के रक्त में से निकाला जाता है और डिफ्थीरिया-प्रदाह के विषयों को कर्मियों का अवरोध करता है। जितनी जल्दी इस का प्रयोग किया जाए, उतना ही अच्छा है। यदि इसे बीमारी के पहले दिन ही लगा दिया जाए तो १०० में से ९९ रोगी अच्छे हो जाएंगे। यदि बीमारी के तीसरे या चौथे दिन लगाया गया तो १०० में से ७५ से लेकर ८५ तक ठीक हो जाएंगे, और यदि इस का प्रयोग बिलकुल न किया गया तो रोग ग्रस्त बच्चों में से आधे मर जाएंगे।

यह तरल आँषाधि है और मांस में सुई (Hypodermic Needle) द्वारा प्रविष्ट की जाती है। इसे डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स ही ठीक तरह लगा सकती है। कभी-कभी डॉक्टर की सहायता पाना सम्भव नहीं हो सकता इस दशा में बच्चों को मरने देने की अपेक्षा माता-पिता को स्वयं उस के यह टीका लगा देना चाहिये। टीका लगाने की सुई और 'एन्टी-टॉक्सिन,' ये दोनों चीजें आँषाधि-विक्रताओं की दुकानों से मिल सकती हैं। इस का टीका इस प्रकार लगाइये। टीका लगाने की सुई को कुछ मिनट तक खाली लीजिये, फिर कुछ मिनट तक एन्टी टॉक्सिन की छोटों से झींझी को झराव में डाले रख कर झींझी का एक सिरा ताँड, दीजिये और सुई में आँषाधि भर लीजिये। कंधे के कुछ इंच नीचे बांह की बाहर की ओर की त्वचा को साबुन और गरम पानी से अच्छी तरह धोइये। फिर उसे सुखा कर थोड़ा 'टैक्चर आबु आयोडीन' लगाइये। त्वचा को उंगलियों में दबा कर ऊपर कीजिये। फिर टीके की सुई को त्वचा की सतह की सीध में रख कर एक इंच तक इस प्रकार प्रविष्ट कीजिये कि वह त्वचा में हो कर त्वचा और मांस के बीच के स्थान में पहुँचे ३,००० ५,००० यूनिट का टीका लगाइये। यदि १२ घंटे तक कोई विशेष लाभ दिखाई न दे, तो, ३,००० से ५,००० यूनिट तक का एक और टीका लगाइये। गंभीर परिस्थिति में टीका तीसरी बार भी लगाया जा सकता है।

ज्योंही बच्चों को डिफ्थीरिया-प्रदाह होने का पता चले, त्योंही उसे अलग कमरे में लिटा दीजिये और दूसरे बच्चों को उस के पास बिलकुल न आने दीजिये। रोगी की देख-भाल करने वाले दो-तीन व्यक्तिओं के अनिवार्य बहाने और कोई न आए। बच्चों की सेवा-शुश्रूषा करने के लिये जो कोई आए उसे अपने कपड़ों के ऊपर ढीला-ढाला एक और वस्त्र पहन लेना चाहिये और बाहर जाते समय उस वस्त्र को उसी कमरे में छोड़ जाना चाहिये। कमरे के बाहर जाने से पूर्व उसे हाथ-मुँह अच्छी तरह धो लेना चाहिये क्योंकि

यह दूसरे लोगों से मिलना और परिवार के दूसरे सदस्य जिन वस्तु का प्रयोग करते हैं वह उन से छूटना। कोई खिलौना या कपड़ा दूसरों के प्रयोग के लिये कमरे से बाहर न जाने दीजिये।

रोगी बच्चे के खाने-पीने के बरतनों को उसी कमरे में रखना चाहिये और हर बार काम में ला चुकने के बाद उन्हें खालिते हुए पानी में धोना चाहिये। रोगी को तरल पदार्थ दीजिये।

बालक को नाक पेंछते या छिनकते समय कागज या पुराने कपड़ों का प्रयोग करना चाहिये; इन्हें बाद में जला देना चाहिये।

बच्चे को चुपचाप बिस्तर में लिटाए रखना आवश्यक है। जब तक बच्चा पूर्ण रूप से अच्छा न जाए तब तक उसे बिस्तर से उठ कर खेलने-बढ़ने न दीजिये। बाहर खेलने-बढ़ने और चलने-फिरने से रोग के विष से हृदय को हानि पहुंच सकती है, और इस के फलस्वरूप बच्चे की अचानक मृत्यु भी हो सकती है।

परीक्षित में दिए हुए नुसखे न. १० या ९ की दवा घंटे-घंटे भर बाद फुरी से अन्दर गले में लगाइये। नुसखे न. १० की दवा रबड़ की पिचकारी द्वारा धीरे-धीरे नाक में डाली जाए। बच्चे का गला या मुंह साफ करते समय नर्स को अपने मुंह और नाक पर कहीं तहें किया हुआ स्वच्छ कपड़ा बांध लेना चाहिये।

गले के सामने और दोनों ओर गरम पानी की सेंकों से भी पीड़ा कम हो जाती है। बच्चे को गरम पानी का आनमा प्रतीदिन देना चाहिये। बच्चा जितना पानी और फलों का रस पी सके पीलाइये।

जब परिवार में किसी बच्चे को इल्ल्लीक-प्रदाह हो जाए, तो परिवार के दूसरे सदस्यों को 'अन्टी टॉक्सिन' का टीका लगवा लेना आवश्यक होता है, क्योंकि यह पता चला है कि जो दवा इल्ल्लीक-प्रदाह का इलाज करती है वही उसे रोक भी सकती है। ५०० से लेकर १००० यूनिट तक का टीका बच्चे के और १००० से २००० तक का टीका वयस्क के लगाना चाहिये। यदि एक महीने बाद भी यह रोग पड़ोस से न जाए तो इन टीकों को फिर लगवाना आवश्यक हो जाता है।

ज्योंही बच्चा इस रोग से छूटकरा पा ले त्योंही उस के कपड़े, बिस्तर और कमरे का विसंक्रमण करना चाहिये जिस से दूसरों को यह बीमारी न लग सके। (दीखिये विधि, अध्याय २१ में)।

इस ज्ञान-वृद्धि के युग में प्रत्येक बालक को इल्ल्लीक-प्रदाह जैसे भयंकर रोग से बचाए रखने के लिए 'इड्थीरिया टॉक्साइड' का टीका लगवा देना चाहिये। आठ महीने से कम की अवस्था के बच्चे के—अच्छा हो कि चार महीने के बच्चे के—किसी डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स से यह टीका लगवा दिया जाए।

खसरा (Measles)

यह एक छूत का बहुत आम रोग है। प्रायः इस रोग को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, परन्तु जिस बच्चे को खसरा हो उस का बहुत ध्यान रखना चाहिये जिस से इस के बाद ही रोगी को कोई और भीषण रोग न आ घरे।

खसरा बहुत जल्दी फैल जाता है। यदि कोई बच्चा खसरा वाले बालक के कमरे में आए या उस के समीप आ जाए तो दस या बारह दिन में उस बच्चे को भी इस रोग का शिकार बनना पड़ेगा। इस के पहले लक्षण नाक में सदी लबना, नाक का बहना, आंखों का लाल होना और कुछ-कुछ बुखार आना है। रोग आरम्भ होने के तीन-चार दिन पश्चात् खसरे के दाने निकल आते हैं। पहले-पहल ऐसे छोटे-छोटे लाल दाने निकल आते हैं। ये दाने फैल जाते हैं और एक या दो दिन में सारे शरीर में हो जाते हैं। चेहरे के दाने बड़े-बड़े हो जाते हैं और कई दाने मिल कर एक बड़ा सा चकत्ता बना देते हैं।

खसरे के बाद जिन खतनाक बीमारियों का डर रहता है वे कानों या फेफड़े या गुर्दे की बीमारियां हैं। अधिक गम्भीर दवाओं में हृदय पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

चिकित्सा

कोई भी आँधी खसरे को ठीक नहीं कर सकती। यदि बच्चों को देख-भाल ठीक तरह से रखी जाए तो दाने निकलने के पश्चात् यह रोग अच्छा हो जाता है। बच्चों को साफ कमरे में साफ-सुथरे बिस्तर पर लेटना चाहिये। उसे नर्म रखना चाहिये, क्योंकि जब बच्चों को खसरा निकलता है तो सदैव उस के ठंड रखा जाने का डर रहता है। यदि उसे सदी लब नई तो फेफड़ों की गम्भीर बीमारी हो सकती है। दूसरे बच्चों को कमरे के अन्दर नहीं आने देना चाहिये क्योंकि उन को भी यह रोग लग जाने का डर रहता है।

जब तक दाने न निकल आए तब तक प्रायः यह पता नहीं चलता कि उसे कौन सा रोग है। ऐसी दशा में बच्चों को चाय के दो चम्मच कैंस्टर आयल और (१०८ डिग्री फ. के तापमान के) पानी का आनमा दीजिये। मुँह साफ करने की आँधी से बच्चों का मुँह दिन में कई बार साफ कीजिये। (परीश्रुष्ट दिए गए नुसखे न. ९ का प्रयोग कीजिये)। नमक के पानी (डेढ़ पाव पानी में एक चम्मच नमक डाल कर) से नाक के भीतरी भाग को दिन में कई बार फव्वारे की पिचकारी से साफ करना चाहिये। यदि छाती में किसी प्रकार का दर्द हो या खांसी हो तो दिन में दो बार छाती सेँकिये। डॉक्टर को बुला लेना चाहिये जिस से वह सल्फा ड्रग्स (Sulpha Drugs) या पीनीसिलिन (Penicillin) का प्रयोग करे। इन से निर्मोनिये का खतरा नहीं रहता। डॉक्टर इन दवाइयों की उचित खुराक जानता है जो बच्चों की उम्र, उस के स्वास्थ्य और उस की दशा पर निर्भर होती है।

खसरे के समय नेत्रों का ध्यान रखना चाहिये। नेत्रों की रक्षा के लिये कमरे को अंधेरा रखना चाहिये; बाँक एंसाइड के घोल (देखिये परीश्रुष्ट नुसखा न. १) से आँखें दिन में कई बार धोइये। आँखें लाल और फूल जाने पर उन का पूरा इलाज अध्याय ३ में दी हुई अधिसूचनाओं के अनुसार करना चाहिये।

इस बात को सदा याद रखिये कि खसरा एक गम्भीर रोग है जिस से बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जब रोग पड़ोस में फैला हुआ हो तो माता-पिता को अपने बच्चों को ऐसे स्थानों पर नहीं आने देना चाहिये जहाँ इस रोग के लग जाने का खतरा हो। जब परिवार में एक बच्चे को खसरा हो जाए तो उसे अलग कमरे में रखिये जिस से परिवार के दूसरे बच्चे इस रोग से बचे रहें।

मोतिया-चंचक (Chicken-pox)

मोतिया-चंचक भी छूत की बीमारी है, परन्तु यह बहुत भयंकर नहीं होती। थोड़ा-खांपड़ा या कलाई पर पहले कुछ दाने निकलने लगते हैं। इस के दाने बहुत कुछ झीतला (Small-pox) के से होते हैं। इस की चिकित्सा यही है कि बच्चा जितना पानी पी सके पिलाइये, और गरम पानी के जलाने से उस का पेट प्रतीदिन साफ कीजिये। (देखिये अध्याय २१)

जब दानों में पानी भर जाए तो उन पर बैसलीन लगानी चाहिये (देखिये पीरीश्वष्ट नुसखा न. ११)। इन दानों को खोजने न दीजिये नहीं तो दाब पड़ जायेंगे। नुसखे न. १ के अनुसार आंखों को दिन में तीन बार धोना चाहिये।

कन-सुए (Mumps)

इस रोग का पहला लक्षण यह है कि कान के नीचे पीड़ा होने लगती है। थोड़ा सा बखार भी आ जाता है। कोई वस्तु चबाने या निगलने से यह पीड़ा और भी बढ़ जाती है। एक या दोनों कानों के नीचे या सामने थोड़ी सूजन दिखाई देने लगती है। यह सूजन बढ़ते-बढ़ते बहुत बढ़ जाती है। कुछ दिन बाद यह सूजन कम होने लगती है और प्रायः एक सप्ताह में गायब हो जाती है।

इस की चिकित्सा में इस बात की सावधानी रखनी चाहिये कि बच्चों को ठंड न लग जाए। नुसखे न. १० के अनुसार मुंह को कई बार धोइये। (देखिये पीरीश्वष्ट) सूजे भाग को संकने से दबा कम हो जाता है। रोगी को दूसरे लोगों से अलग रखना चाहिए।

इस बात को याद रखना चाहिये कि जब तक सूजन बिल्कुल उतर न चूके, तब तक रोगी को अक्रिय रहना चाहिये, नहीं तो पुरुष-जननोद्भयों के सदा के लिए बहुत भारी आघात पहुंच सकता है।

झीतला (Small-pox)

सब से भयंकर संक्रामक रोगों में से एक है झीतला। यह रोग बहुत जल्दी फैलता है। जब यह रोग फैलने लगता है तो बिना टीका लगे हुए प्रत्येक १०० व्यक्तियों में से एक या दो ही इस से बच पाते हैं। यह बूढ़े-जवान, स्त्री-पुरुष किसी को नहीं छोड़ती। पुराने समय से आज तक प्रत्येक देश के लोग किसी और रोग से इतना नहीं डरते आए हैं जितना झीतला से, क्योंकि यह न केवल फैलने वाली बीमारी है, बल्कि बिना टीका लगे हुए लोगों पर जब इस का आक्रमण होता है तो लोगों के मरने की संख्या २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक पहुंची जाती है। यदि कोई रोगी मरने से बच भी गया तो उस का मुंह झीतला के दानों से बड़ा भद्दा हो जाता है और वह काना या अंधा भी हो जाता है।

डॉक्टर एक मत से कहते हैं कि झीतला एक प्रकार के संक्रामक विष (Virus) द्वारा होती है। यह तो सब को मालूम है कि रोगी के नाक और मुंह से जो कुछ निकलता है,

और अच्छा होते समय उस की त्वचा से जो सूखे छिलके जाद निकलते हैं वे झीघ, ही दूसरों को यह रोग लगा देते हैं। यह स्पष्ट है कि बिना टीका लगने प्रत्येक १०० व्यक्तियों में से ९८ या ९९ अवश्य इस के छिकार बनेंगे; फिर भी जो लोग खराब या तन्माक नहीं पीते और जो सदाचारी होते हैं उन की इस रोग के आक्रमण के पश्चात् अच्छे होने की अधिक सम्भावना रहती है, उन लोगों की अपेक्षा जो ऐसी बातों में संयमी नहीं होते।

लक्षण

यह रोग लग जाने के पश्चात् १२ दिन तक इस का पता नहीं चलता। बच्चों को आरम्भ में सदी लगने के पश्चात् सिर-दर्द शुरू हो जाता और फिर पीठ एवं दूसरे अंगों में पीड़ा होने लगती है। पहले ही दिन बुखार १०३ डिग्री फ. पहुँच सकता है। रोग आरम्भ होने के चौथे दिन दाने निकलने लगते हैं, और प्रायः पहले माथे और कलाईयों पर ही दिखाई देते हैं। दाने पहले लाल मसूर के दानों की भाँति दिखाई देते हैं परन्तु एक या दो दिन में फूल जाते हैं और उन के अन्दर दूधिया सा लस भर जाता है और फिर एक या दो दिन में लस पीप बन जाता है।

चिकित्सा

झीतला की कोई विशेष चिकित्सा नहीं है। सब से मुख्य बात है सावधानी से रोगी को देख-रेख करना। रोगी को चुपचाप बिस्तर में लेटा रहना चाहिये। कमरे को बिल्कुल बन्द न कीजिये बल्कि ऐसा प्रयत्न कीजिये कि कमरे में रोगी को अधिक मात्रा में ताजा हवा मिले। खाँता कर ठंडा किया हुआ पानी रोगी जितना पी सके पीलाइये। जब ज्वर बहुत तेज हो तो रोगी को ठंडे पानी से अंगीछिये। पेट साफ रखने के लिए रोज आनमा दीजिये।

पीप भरे दानों (Vesicles and Pustules) की चिकित्सा इस प्रकार कीजिये—मुलायम कपड़े से एपसम साल्ट का घोल (डेढ पाव पानी में एक आउंस नमक मिला कर) रोगी के मुँह और हाथों पर निरन्तर लगाइये। जब दाने सूखने लगें और खुरंद बनने लगें तो उन पर बार-बार सल्फाथियाजोल आयन्टमेंट (Sulfathiazole-Ointment) का लेप कीजिये। बच्चों को दानों को खुजलाने या रगड़ने न दीजिये, नहीं तो झीतला के गहरे दाग पड़ जायेंगे।

आंखों की देख-भाल करना बहुत आवश्यक है। बोरिक एसिड के घोल में मुलायम कपड़े के एक टुकड़े को भिगो कर तीन-तीन, चार-चार घंटे पश्चात् पलकों को धोइये (देखिये परीक्षण, नुसखा न. १)। पलकों को धो कर और फिर सूखा कर उन के किनारों पर थोड़ा सा सल्फाथियाजोल मरहम लगा दीजिये। बोरिक एसिड के समीक्षित घोल की थोड़ी थुँदें प्रति तीन-तीन घंटे बाद या उस से भी जल्दी-जल्दी आंखों के अन्दर छालनी

चाहिये। मुँह और नलके को कुत्ली और गरारे कर के साफ रखना चाहिये। (दीखिये पीरीछट नुस्खा न. ९)

झीतला का टीका

१७९६ ई. से पूर्व झीतला की चिकित्सा का कोई उपाय नहीं था और न ही कोई ऐसे उपाय ज्ञात था जिस से इस रोग की रोक-थाम की जा सकती, परन्तु उसी वर्ष एक अंग्रेज डॉक्टर जीनर ने झीतला से बचाव के लिए टीका लगाने की ऐसी विधि सोच निकाली।

मनुष्य में झीतला का रोग पैदा करने वाले अदृश्य रोग-कृमि इसी प्रकार की बीमारी गाय में भी उत्पन्न करते हैं जिसे 'गाय-मसूरिका' या 'गो-चेचक' (Cow-pox) कहते हैं गो-चेचक से पीड़ित बछड़े के झरोरे से लसीका (Lymph) ली जाती है जो टीका लगाने में काम आती है। इस लसीका का टीका जब मनुष्य के लगाया जाता है तब टीका लगे स्थान पर टीके का एक दाना निकल आता, इस के बाद सारे झरोरे में थोड़ा उबर होता है। इस के परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति अल्प या दीर्घ काल तक झीतला के रोग से बचा रहता है, चाहे वह झीतला से पीड़ित रोगी के साथ एक चारपाई पर ही क्यों न सो जाए।

जेनर (Jenner) की टीका लगाने की इस खोज के पश्चात् पश्चिमी राष्ट्रों ने इस उपाय का प्रयोग आरम्भ किया जिस से पिछले १०० वर्षों में इस रोग से मरने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। उदाहरण के लिये, १८७४ में जर्मनी में एक कानून बना जिस के अनुसार सब को टीका लगवाना और कुछ समय बाद फिर टीका लगवाना अनिवार्य हुआ। इस कानून के अनुसार सब बच्चों के १२ महीने की आयु से पहले और फिर बारह वर्ष की आयु में टीका आवश्यक है। उस वर्ष के बाद झीतला का रोग जर्मनी में कभी नहीं फैला। जर्मनी में प्रति वर्ष ५ करोड़, ४० लाख की आबादी में से दस व्यक्तियों (जिस में बड़े और बच्चे शामिल हैं) से अधिक झीतला से नहीं मरते।

फिलिपाइन के टापुओं में, मनीला राजधानी के अधिकारियों ने पहले झीतला को रोकने के लिये इस टीके पर कोई ध्यान नहीं दिया इस लिए प्रति वर्ष ६,००० लोग वहाँ मर जाते थे। बाद में जब टीका लगाने का नियम चालू किया गया तो उस क्षेत्र में झीतला के रोग से एक भी मौत नहीं हुई।

अब जब कि यह पता लग गया है कि गो-चेचक से ली हुई लसीका झीतला से रक्षा करती है तो प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य है कि एक वर्ष का होने से पूर्व बच्चों के (लड़का हो या लड़की) टीका लगवाएँ और दस वर्ष का होने से पूर्व एक बार फिर लगवाएँ।

कूकर खांसी (Whooping Cough)

कूकर या काली खांसी के बीमारों को "तरल अदूर तरल आहार" चाहिये इस का कोई विशेष उपचार नहीं है और माता-पिता को अधिक औषधियों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिये। मादक दवायें देने से ऊँचाई और बेहोशी तक आ सकती है। बेल्लाडोना (Bella donna—एक विषैली बूटी) के प्रयोग से चित्त-विभ्रम उत्पन्न हो सकता है। इस

से आंखों की पुतली फैल जाती है और तेज रोशनी से इस दृष्टि में आंखों को स्थायी रूप से हानि पहुंच सकती है। पेट बिगड़ जाता है और कुनीन खाने से अन्य हानियां भी हो सकती हैं। विज्ञात औषधियों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये और डॉक्टर की बताई हुई दवा को नियमित मात्रा और नियमित समयों से अधिक नहीं देनी चाहिये और न ही डॉक्टर से बिना पूछे इस दवा को अन्य बच्चों को देना चाहिये।

रोग को हल्का करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। स्वास्थ्य-कर उपायों का बहुत महत्व है। यदि मौसम ठीक हो तो रोगी को बाहर आराम करना चाहिये। धूप और ताजी हवा बहुत लाभप्रद है। बहुत अधिक सीलन, धूल और तेज हवा में रोगी को नहीं रखना चाहिये। बिस्तर को हवा और धूप लगानी चाहिये और फिर बच्चे को उस में सुलाने से पूर्व उसे गरम कर लेना चाहिये। बच्चे को किसी बात से चौंकाना नहीं चाहिये। भोजन हल्का, पर पोषक होना चाहिये। केवल दूध ही सब से अच्छा आहार है, विशेष कर जब बच्चा उल्टी करता हो।

औषधिक रूप में बफारा लेना लाभप्रद है। बफारा के लिए यूकैलिप्टस (eucalyptus) के तेल और बेनजोइन (Benzoin) का प्रयोग किया जाता है। इन में से किसी भी दवा का एक चम्मच खालते हुए डेढ़ सेर पानी में डाल कर बफारा लेना चाहिये। जब खांसी तेज हो तो दिन में कई बार या रात को भी बफारा दिया जाए। (देखिये पीरीसिप्ट, उपचार न. ३१)।

छाती और गले को यदि सावधानी से गरम कमरे में गरम पानी की दौ हुई सेंक से भी रोगी को लाभ होगा। सेंकने के बाद सांते समय यदि छाती पर कपूर मिले हुए तेल की मालिश की जाए तो कई आपत्ति नहीं।

अब काली खांसी का उपचार क्लोरोमाइसीटिन (Chloromycetin) के द्वारा सफलता पूर्वक होता है और रोग को अबोध भी घटाई जा सकती है।


जब बच्चा छः मास का हो जाए तो उस के कालीखांसी का टीका लगवाना चाहिये जिस से काली खांसी से बचाव हो जाए। इस के टीके में काम आने वाली लसीका (Vaccine) श्विन-रोहत भी होती है और गुणकारी भी।

कॉट.

कॉट. भी क्षय रोग की भांति कृमि-रोग है। इस रोग के कृमि रोगी के घावों और नाक के सूत्र में मिलते हैं।

इस बात का निश्चयपूर्वक पता चल गया है कि कॉट. किसी विशेष भोजन—जैसे मछली—से नहीं होता न ही यह रोग पशुओं द्वारा लगता है बल्कि यह उस व्यक्ति से लगता है जो पहले से ही इस से पीड़ित हो।

यह भी सम्भव है कि कॉट. जू, खटमल और पिस्सू जैसे कीड़ों द्वारा फैलता हो। जब घर में किसी एक को कॉट. होता है तो परिवार के दूसरे सदस्यों को भी लग जाता है। अतः यह पता चल गया कि कॉट. व्यक्ति के बहुत निकट रहने और स्पर्श आदि से यह रोग फैलता है। यह रोग प्रायः उन लोगों को होता है जो गन्दे, जो बहुत ही घनी



खीतला का टीका

आवादी वाले महुल्लों में रहते हैं और जो अपने शरीर या कपड़ों को बार-बार साफ नहीं करते ।

लक्षण

खेद, दो प्रकार का होता है, परन्तु दोनों का कारण एक ही कृमि है । खेद का प्रथम चिन्ह है ज्वर, सिर-दर्द, शरीर के विभिन्न भागों में पीड़ा या सदा लगाव और शरीर के अवयवों का सुन्न हो जाना । प्रथम अवस्था में दूसरा चिन्ह पसीना आना है । पसीना सारे शरीर में भी आ सकता है और शरीर के केवल एक भाग—हाथ, पैर या सिर में भी आ सकता है । फिर चोखे और दूसरे अंगों में दाने निकलने लगते हैं और त्वचा—विशेषकर माथे, गालों, नाक, कानों और हाँठों की त्वचा—पर गाँठें भी निकलने लगती हैं । दाढ़ी, मूँछों और भौंहों के बाल झड़ने लगते हैं । बाद में पलकें, नाक, उँगलियाँ, पंजे और शरीर के दूसरे भाग सड़-सड़ कर गिरने लगते हैं ।

दूसरी तरह के कैंड. में केवल चेंताओं (Nerves) पर ही प्रभाव पड़ता है और सम्पूर्ण स्पष्टीकरण ज्ञान जाता रहता है। परन्तु इस ज्ञान के समाप्त होने के पूर्व तीक्ष्ण पीड़ाएँ बिखेरकर हाथों और टांगों के सामने बाले भाग में होने लगती हैं। बाद में त्वचा पर धब्बे से दिखाई देने लगते हैं। यह दाग पहले लाल होते हैं और धोड़। देर में इन दागों का केन्द्र सफेद हो जाता है और इन में कुछ भी स्पष्ट-ज्ञान नहीं रहता, बाल झड़ने लगते हैं और झुर्रियाँ और छिलके दिखाई देने लगते हैं। कालांतर में हाथ और पैर की पीछियाँ सुन्न पड़ जाती हैं। हाथ, पांव, उंगलियाँ और शरीर के दूसरे भाग सड़ कर गिर जाते हैं।

चिकित्सा

कैंड. के प्रत्येक रोगी का समाचार स्वास्थ्य-अधिकारियों को देना चाहिये। बहुत सी सरकारें कैंड.यों के लिये अस्पताल खोलती हैं। इन अस्पतालों में बहुत अच्छी चिकित्सा की जाती है और रोगियों से कैंड. पैसा भी नहीं लिया जाता। यदि रोगी अस्पताल चला जाए तो उस के अच्छा होने की आशा रहती है। जब रोगी पर इस का आक्रमण हो तो उस की जांच तत्क्षण करा लेनी आवश्यक है क्योंकि जितनी जल्दी चिकित्सा होगी उतनी ही अधिक आशा रोगी के अच्छा होने की होगी। अतः ज्योंही रोगी कैंड. के किसी लक्षण को अपने शरीर में देखे तभी उसे किसी अच्छे अस्पताल में जाना चाहिये।

मोतीझरा या नाँत्रक ज्वर (Typhoid Fever)

मोतीझरा (Typhoid Fever) ऐसा ज्वर है जो मोतीझरे के कौटाणुओं द्वारा होता है। यह ज्वर प्रायः तीन सप्ताह या उस से अधिक दिन तक रहता है परन्तु कभी-कभी केवल



कैतली की टाँटी में लगे हुए कगज के चोंगे द्वारा आँधी-युक्त भाप बच्चे के मुँह पर जा रही है—बपारे की एक मुणकारी नीध।

सात से दस दिन तक ही रहता है। इस के आरम्भ के लक्षण बे-चैनी, सिर-दर्द और आलस्य व दुर्बलता हैं। सारे शरीर में या केवल आमाशय में ही पीडा होने लगती है। बहुधा आरम्भ में जाड़ा भी लगता है।

इस के बाद सबरे ज्वर १०१ डिग्री और शाम को १०३ या १०४ डिग्री फ. तक पहुँच जाता है। नाड़ी एक मिनट में ८० या ९० की चाल से चलती है। बहुत बार यह ज्वर एक या दो दिन के बाद कुछ जाता रहता है और रोगी ८, १० दिन तक थोड़ा बहुत ज्वर अनुभव करने पर भी यदि रोगी पड़ा न रहे और थोड़ा-बहुत घुम-फरे तो कोई हानि नहीं।

रोग के प्रथम कुछ दिनों के पश्चात् ज्वर नियमानुसार १०३ डिग्री फ. रहता है। रोगी को सिर-दर्द की शिकायत रहती है, जीभ पर सफेद तह सी जम जाती है। खाना खाने की इच्छा बहुत कम या शिल्बल नहीं होती, यदि खाना खा लिया तो उल्टी हो सकती है। पेट तन जाता है और दुःखता रहता है। या तो कब्ज हो जाता है, या फिर दस्त लग जाते हैं। रोगी अधिक समय तक ऊँघता रहता है।

रोग के दूसरे सप्ताह में ज्वर साधारणतः बढ जाता है। पिप्सू के काटे जैसे लाल दाग पेट या छाती पर प्रकट होने लगते हैं। साधारणतः होंठ और जीभ पर बहरे भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है। प्रत्येक आठ या दस ऐसे रोगियों में से एक की आंखों में से खून निकलने लगता है, कभी-कभी तो इतना निकलता है कि मल को इल्के लाल रंग का कर देता है। परन्तु कभी-कभी इतना अधिक निकलता है कि रोगी की मृत्यु ही हो जाती है। कभी-कभी रोगी भ्रान्तीचत रहता है। बहुधा रोगियों को कब्ज रहता है।

तीसरे सप्ताह में ज्वर धीरे-धीरे उतरने लगता है और बीमारी के २१ दिन बाद प्रसव अवस्था में आ जाता है। आंखों में से रक्त बहने और उन में छेद हो जाने का खतरा रोग के तीसरे सप्ताह में अधिक होता है।

निरन्तर ज्वर रहने पर किसी योग्य डॉक्टर को बुलाना चाहिये क्योंकि रोगी के खून की परीक्षा कर के डॉक्टर ही बता सकता है कि मोतीझरा है या नहीं? मोतीझरे के ज्वर में रोगी की देख-भाल बहुत सावधानी से करनी चाहिये और उसके मल-मूत्र का विसंक्रामण आवश्यक है, इस कारण रोग का जल्दी ही पता लगा लेना बहुत आवश्यक है।

चिकित्सा

मोतीझरे की सब से नवीन चिकित्सा क्लोरोमाइसीटीन (Chloromycetin) का प्रयोग है। उस के प्रयोग के लिए पूर्ण अधिसूचना उस कागज में होती है जो उस दवा की बॉक्सी के इन्ट्रिंगेड लिपटा रहता है। डॉक्टर के कहने पर ही दवा देनी चाहिये। इस आँधी से रोग की अवधि बहुत ज्यादा घट जाती है।

उचित देख-रेख और उचित आहार का बड़ा महत्व है। रोगी को रोज़नी वाले और हवादार कमरे में रखना चाहिये आरम्भ से ही उसे बिस्तर में लिटा देना चाहिये।

आहार का अधिकांश भाग तरल पदार्थ हो। यदि अच्छा ताज़ा दूध मिल सके तो वह भी भोजन का एक भाग होना चाहिये। रोगी को देने से पूर्व दूध को उबाल लेना

चाहिये। ठोस पदार्थों से छना हुआ खोरवा, अंडे—या तो जेली बना कर या आंशिक रूप से उमाले हुए, चावल की लपसी, लाल आटे की लपसी, कस्टर्ड (Custard), मिल्क टोस्ट (Milk toast)---इस को अच्छी तरह चबाया जाए---भुने हुए आलू (Baked Potatoes), उमाले हुए या भुने हुए चावल---ये सब चीजें रोगी को दी जा सकती हैं। (इन भोजनों को बनाने की विधि के लिए देखिये अध्याय २१) एक समय में बहुत सा भोजन न करने दीजिये। यदि रोगी को निरन्तर देख-रेख करने के लिये कोई नर्स न हो तो रोगी की चारपाई के पास सुराही या किसी और बरतन में साफ खाला हुआ पानी रख दीजिये जिस से वह बार-बार आसानी से पानी पी सके।

मूत्र को बार-बार साफ करना चाहिये और दांतों और जीभ को ब्रश से बार-बार साफ किया जाए। नुसरखा न. ९ का प्रयोग कीजिये (देखिये पीरीप्लेट)।

यदि पेट में दर्द हो तो दर्द दूर करने के लिए एक बार में १५ या २० मिनट तक रोगी का पेट नरम पानी से सेंकिये।

यदि रोगी को दस्त आएँ तो ह्वेतसार (Starch) का नरम आनिमा दीजिये। (देखिये अध्याय २२)। यदि कब्ज हो तो प्रोटीडिन नरम पानी का आनिमा देना चाहिये (देखिये अध्याय २१)।

बुखार कम करने के लिये रोगी को ठंडे पानी से अंगोछिये। १५ या २० मिनट तक या इस से भी ज्यादा देर तक अंगोछिये। त्वचा को हवा कर के सुखाइये, तौलिये से पोछ कर न सुखाइये। यह बहुत लाभदायक चीकल्सा है क्योंकि इस से ज्वर कम होता है जिस से रोगी का चित्त प्रसन्न हो जाता है। अंगोछने में रोगी को ठंड लग जाने का कोई खतरा नहीं है। यदि ज्वर तेज हो तो ठंडे पानी से दिन में कई बार अंगोछा जा सकता है। (देखिये अंगोछना, अध्याय २१)

जब बुखार बहुत बढ गया हो तो लगातार आनिमा देने से ताप कम किया जा सकता है। विधि अध्याय २१ में वर्णित है।

रोगी का सिर-दर्द दूर करने के लिये एक कपडा बहुत ठंडे पानी में भिगो कर उस के सिर पर रखना चाहिये। थोडा-थोडा देर (कुछ मिनट) बाद कपडे को फिर ठंडे पानी में भिगो लेना चाहिये।

यदि रोगी के मल में खून दिखाई दे तो १० या १२ घंटे तक उसे कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिये। यदि थोडा बर्फ मिल सके तो उस के कुछ टुकडे, एक कपडे, में लपेट कर रोगी के पेट पर रखिये। इस ठंडक से मल में खून जाना बन्द हो जाएगा।

जब ज्वर कम हो जाए और रोगी को भूख लगने लगे, तो उसे सरसत मांस और सब्जी खाने को न दीजिये।

मोतीझरे के रोगी को देख-भाल करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह रोग फैले न। मल-मूत्र और दूध में इस रोग के कृमि होते हैं। अतः विसंक्रामक डाल कर इन तीनों के कृमि मार डालना आवश्यक है। यदि, 'बाइक्लोराइड ऑफ मेरकरी' (Bichloride of Mercury) मिल सके तो कोई एक सेर में १५ ग्रैन के हिसाब से डाल कर मल-मूत्र को फेंकने से पूर्व एक घंटे तक ऐसे ही रक्खा रखने दीजिये। मल-मूत्र के विसंक्रमण की विधि अध्याय २१ में दीखिये। दूध को कागज के टुकडों में लपेट कर जला डालना चाहिये।

रोगी की अपनी थाली, चम्मच आदि अलग होने चाहिये और वे बरतन परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बरतनों से अलग रहने चाहिये। उन्हें रोगी के कमरे में ही रखना चाहिये और खाने के बाद उबाल लेना चाहिये। रोगी के बच्चे हुए भोजन को नहीं खाना चाहिये। रोगी की टहल करने वाले व्यक्तिओं को रसोई-घर से बाहर रहना चाहिये जहाँ दूसरों का भोजन तैयार हो रहा हो।

रोगी द्वारा प्रयोग किए गए तौलिये और रुमाल उबाल लेने चाहिये।

नर्स को अपनी रक्षा भी करते रहना चाहिये। एक सेर जल में १५ ग्रैन 'बल्लक्लोराइड ऑव मरकरी' डाल कर उस का घोल बना लेना चाहिये और उसे कमरे में रख लेना चाहिये। प्रत्येक बार रोगी को साफ कर के या उसे खाना खिला कर नर्स को इस घोल से अपने हाथ धोने चाहिये।

रोगी के ठीक हो जाने पर चारपाई पर बिछी हुई चटाई को जला देना चाहिये और उस के पहनने के कपड़ों और बिस्तर की चादर आदि को अच्छी तरह उबाल लेना चाहिये। कमरे में अच्छी तरह से सफेदी करानी चाहिये। प्रत्येक एक सेर पानी में १५ ग्रैन 'बल्लक्लोराइड ऑव मरकरी' डाल कर घोल बना लेना चाहिये और फर्श को अच्छी तरह साफ करना चाहिये। कमरे की सफाई आदि के विषय में अतिरिक्त बातों के लिए (देखिये अध्याय ११)।

रोग के समय और उस के बाद कुछ हफ्तों तक दस ग्रैन 'यूरोट्रोपिन' (Urotropin) मूत्र में के रोग-कृमियों को नष्ट करने के लिए प्रति दिन देनी चाहिये।

मांतीझरे की रोक-थाम

मांतीझरा एक ऐसी बीमारी है जिस को मुंह में जाने वाली प्रत्येक वस्तु के विषय में सावधान रह कर रोका जा सकता है। कृमि केवल मुंह द्वारा ही शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रायः पानी और भोजन में होते हैं। प्रायः मल ऐसे स्थानों में फेंक दिया जाता है जहाँ से इस का कुछ अंश अन्त में कुओं, नदियों और तालाबों में पहुँच जाता है। इस कारण पीने या मुंह धोने के लिये या बिना पकाया हुआ पदार्थ खा कर खाने के लिये सर्वदा खाले हुए पानी का प्रयोग करना चाहिये। मांतीझरा ज्वर बढ़ा दूध से भी लगता है; अतः पीने से पूर्व दूध को उबाल लेना बहुत आवश्यक है।

जिस भूमि में सब्जी उगती है वहाँ कभी-कभी मनुष्य के मल की खाद छाली जाती है। मल में के रोग-कृमि सब्जी की पत्तियों तथा जड़ों पर चिपटते रहते हैं। अतः ऐसे स्थानों में उनी सब्जियों को खाने से पूर्व पका लेना चाहिये। फलों के तोड़ने वालों के हाथ नन्दे होते हैं और फलों को पोटों से तोड़ कर बहुत नन्दे स्थानों में रख दिया जाता है। इस कारण फलों को पहले उखलते पानी से साफ कर के और छील कर खाना चाहिये।

मौखिक मांतीझरा फैलाती है। इसे फैलाने में वे इतना बड़ा काम करती हैं कि साधारण मक्खी को 'मांतीझरे' की मक्खी कहा जाता है। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगा कर मक्खियों को रसोई-घर से बाहर ही रखना चाहिये। पके हुए भोजन को ऐसी जगह रखिये जहाँ मक्खियाँ न पहुँच सकें। जब भोजन मेज पर खाने के लिये

रक्ता जाए तो उस के ऊपर एक जाली छाल दीर्घायु जिस से मोक्खियां दूर ही रहें।

रोगी द्वारा प्रयोग किए हुए किसी बरतन, ज्वाले, चम्मच, तौलिये या रूमाल को कुछ मिनट तक उबाले बिना किसी दूसरे व्यक्ति को उस का प्रयोग नहीं करना चाहिये। मोतीझरे के रोगी के कमरे के अन्दर रक्ता भोजन कभी नहीं खाना चाहिये।

हाल ही में मोतीझरा ज्वर को रोकने का एक नया उपाय निकला है। यह बहुत कुछ उसी प्रकार का है जैसा बड़ी माता को रोकने के लिए टीका लगाने का होता है। मोतीझरा ज्वर का टीका हाइपोडर्मीक (Hypodermic) पिचकारी से लगाया जाता है। टीका लगवा कर आदमी दो-तीन साल तक सुरक्षित रहता है। मोतीझरे से प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है यदि वह प्रथम बार इस की तीन सूइयां लगवा ले और फिर हर साल एक सूई लगवाता रहे। यह सुरक्षित युक्ति है। यह तरीका उन लोगों को अवश्य अपनाना चाहिये जो ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ मोतीझरे का रोग फैला हुआ हो और जो लोग अधिक यात्रा करने के कारण अपने भोजन और पीने के पानी के विषय में अधिक सँवधान न रह सकते हों।

मोतीझरे को रोकने का एक और तरीका यह है कि रोग के विरुद्ध शरीर प्राकृतिक रूप से संघर्ष करे। शराब, तम्बाकू, पान-सुपारी या अफीम आदि शरीर को निर्बल बनाती हैं और मोतीझरे के कीड़ों को शरीर में घुसने का आसानी से रास्ता मिल जाता है। यदि किसी को अपच या दस्त हो तो उस का अन्न-मार्ग ऐसी दशा में है कि उसे मोतीझरा उस व्यक्ति की अपेक्षा छीघू ही लग सकता है जिस का अन्न-मार्ग अच्छी दशा में रहता है।

हैजा

इस पृथ्वी पर कोई ऐसा देश नहीं जहाँ कभी-न-कभी हैजा न फैल चुका हो। इस रोग के प्रत्येक दस रोगियों में से पांच मर जाते हैं। यह बीमारी एशिया के बड़े-बड़े सब शहरों में फैली है। सभी को जानना चाहिये कि यह किस प्रकार फैलती है जिस से लोग इस बीमारी से अपनी रक्षा कर सकें। इस का रोगी सदा ही मरता नहीं इस कारण इस की लाभकारी चिकित्सा भी प्रत्येक को जाननी चाहिये।

इस रोग का कारण हैजा-कृमि है। यह कृमि भोजन या पानी के साथ मुंह में से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या उंगली या कोई और वस्तु मुंह में डालने से शरीर में पहुँच जाते हैं। शरीर में घुसने के एक दो दिन पश्चात् वे रोग फैलाने लगते हैं जिस का पता बाहर से पांच दिन में लगता है। हैजा के कीटाणुओं वाली कोई वस्तु खाने-पीने के कुछ ही घंटे बाद हैजा हो जाता है।

लक्षण

हैजे के प्रमुख लक्षण ये होते हैं: हैजे के कीटाणुओं वाला भोजन करने या पानी पीने के १२ या १८ घंटे बाद पेट में पीड़ा होने लगती है। थोड़ी देर में दस्त शुरू हो

जाते हैं और थोड़ा ही देर में इन की स्थिति बम्भीर हो जाती है यद्यं तक कि पतली पीच की भांति दस्त लगातार होने लगते हैं ।

कुछ दशाओं में यह रोग सदीं लगने, प्यास लगने, जीभ पर पपड़ा जम जाने, पेट में धीमा-धीमा दर्द होने और दिन में तीन चार बार पानी जैसे दस्त आने से आरम्भ होता है । रोगी बहुत कमजोरी अनुभव करता है । उस से अगले दिन दस्त और भी तेजी से होने लगते हैं । दस्त पीच जैसे सफेद और पतले होते हैं । वे बड़े, बंग से होते हैं । उल्टी भी जोर से होने लगती है । उल्टी में निकलने वाला पदार्थ तो किए हुए भोजन जैसा ही होता है, परन्तु बाद में वह दस्त जैसा ही दिखाई देता है । प्यास बहुत लगती है और टांगों, बांहों, पीठ और शरीर के दूसरे भागों में सख्त दर्द होने लगता है ।

ज्यों-ज्यों बीमारी बम्भीर होती जाती है त्यों-त्यों रोगी की दशा बाहर से चिन्ता-जनक प्रतीत होने लगती है । आंखों भीतर की ओर धंस जाती हैं और उन के चारों ओर काले बड़बड़े पड़ जाते हैं, नाक पतली और नुकीली दिखाई देने लगती है, बाल पीचक जाते हैं, छेठ नीले पड़ जाते हैं, शरीर ठंडा और पसीने से चिपचिपा रहता है, हाथों और उंगलियों की त्वचा उस धोबी की त्वचा जैसी दिखाई देने लगती है जिस ने सारा दिन साबुन और गरम पानी में हाथ डाले काम किया हो, स्वर धीमा पड़ जाता है, सांस ठंडी हो जाती है, मूत्र बहुत थोड़ा-थोड़ा होता है ।

हृजे का रोग सदा ऊपर लिखी परिस्थितियों में ही नहीं होता । कभी-कभी साधारण दस्त लग जाते हैं जो बाद में हृजे में बदल जाता है ।

हृजे की बहुत सी दशाएँ ऐसी भी हैं जिन में रोगी पलंग पर लेटा नहीं रहता । उसे दस्त आते हैं, वह बहुत कमजोर हो जाता है और उसे बहुत कम मूत्र होता है । हृजे के ऐसे रोगी बीमारी को अधिक दूर तक फैलाते हैं क्योंकि वे चल-पैर सकते हैं और दूसरे लोगों से मिल-जुल सकते हैं ।

हृजे की बम्भीर दशाओं में रोग का आक्रमण इतना प्रबल हो सकता है कि टांग और बांहों में जोर की अकड़न होने लगती है और यिना दस्त हुए रोगी कुछ घंटों में मर जाता है ।

जब रोग के भयंकर लक्षण नहीं रहते हैं तो भी रोगी को पेशाब न उतरे तो उस के मरने का डर रहता है ।

रोग-निदान

हृजे की व्यापकता के समय दस्त किसी भी प्रकार के क्यों न हों इन का उपचार इसी प्रकार करना चाहिये मानो हृजा ही हो । पीच की भांति पतले दस्त आना, कमजोरी, त्वचा का चिपचिपाना और ठंडा पड़ जाना, मृषाकृति का बिबड़ जाना, पीरों की उंगलियों और पंजों का सिकुड़ जाना, अकड़न, थोड़ा-थोड़ा मूत्र जाना— ये सब हृजे के मुख्य लक्षण हैं ।

बच्चों में हृजा

बच्चों को हृजा हो जाने पर भी प्रायः यह पहचाना नहीं जाता, इस का कारण यह

है कि बचस्कों और बच्चों में इस रोग के लक्षण भिन्न होते हैं। बहुत से बच्चों में इस रोग के लक्षण दस्तों या पीचबल के लक्षणों जैसे होते हैं। इस रोग में बहुत से बच्चों के हाथ-पैरों में बहुत अधिक एंठन होने लगती है और थोड़े-थोड़े दस्त भी होते हैं। जब किसी मूहल्ले में ईजा फैला हुआ हो और कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, उसे दस्त आने लगे, पेट में मरोड़े होने लगे, या शरीर में एंठन हो, तो उस का इलाज उसी प्रकार करना चाहिये जिस प्रकार ईजे के रोगी का किया जाता है।

चिकित्सा

जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा आरम्भ हो जानी चाहिये। रोग-निदान के पश्चात् ही सब से पास के स्वास्थ्य-धिकारी को सूचना दे दी जाए, और सम्भव हो सके तो किसी योग्य डॉक्टर की सहायता प्राप्त की जाए।

रोगी को मरोड़े, और दस्त आरम्भ होते ही पलंग पर लिटा देना चाहिये। उस के पास की एक 'बेड पैन' (बिस्तर में लेटे-लेटे मल त्याग करने का बरतन) और पेशाब करने का बरतन रख दीजिये जिस से रोगी को पलंग से उठना न पड़े। खांला हुआ ठंडा पानी उसे अधिक मात्रा में पीने को दीजिये, पानी में नीबू या कागजी नीबू का अर्क मिला सकते हैं। पीच और जंढे की सफेदी के पानी के अतिरिक्त रोगी को और कोई चीज खाने-पीने को न दीजिये। (दीखिये अध्याय २१) यदि बमन हो जाए तो कुछ देर तक कुछ भी खाने को न दीजिये, केवल पानी जितना रोगी मांगे, उतना पिलाइये। गरम पानी से पेट सेकने से लाभ होता है।

हाल ही में ईजे की चिकित्सा का एक अधिक प्रभावशाली उपाय खोज निकाला गया है, इस के अनुसार नमक के घोल की सूई शिराओं में लगाई जाती है। डेढ़ पाव खाले हुए पानी में १२० ग्रैन साफ नमक मिलाया जाता है और खांला कर इसे कृमि-मुक्त कर लिया जाता है। इस के बाद उसे ठंडा कर के पैर या बांह की किसी शिरा में इस की सूई लगाई जाती है। ईजे का यह सब से अच्छा इलाज है। प्रायः ये सूइयां कई बार लगानी पड़ती हैं और इन्हें कोई योग्य डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स ही लगा सकती है।

यदि डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स न मिल सके तो नीचे लिखी हुई चिकित्सा कीजिये: रोगी को गरम रखिये। उस के शरीर के पास ही गरम पानी की बातलें कपडों में लपेट कर रखनी आवश्यक हैं। प्रत्येक तीन घंटे के बाद १०५ डिग्री फ. तापमान के दो सेर नमकीन पानी से आनमा दीजिये। पानी में चाय के जाठ चम्मच भर नमक मिलाइये। दिन में तीन बार १०५ डिग्री फ. तापमान के टैनिन एसिड (Tannic Acid) का आनमा दीजिये। यह डेढ़ पाव पानी में ७५ ग्रैन 'टैनिन एसिड' मिला कर तैयार किया जाता है। यह दस्तों को रोकने में सहायता देता है।

हाल ही में एक और नया इलाज निकला है जो बहुत प्रचलित और गुणकारी है उस के अनुसार नमक के आनमे के अतिरिक्त पोटैशियम परमैंगनेट (Potassium Permanganate) दिया जाए। रोगी को पानी के बदले पोटैशियम परमैंगनेट का घोल जो डेढ़ पाव पानी में ६ ग्रैन पोटैशियम मिला कर तैयार किया जाता है। एक बार में घोल दो या तीन आउंस पीना चाहिये। इस के अतिरिक्त प्रत्येक आधे घंटे बाद पोटैशियम परमैंगनेट की दो ग्रैन की



मोतीझरे, ईजे और अन्य आंग्रिक रोगों के संक्रमण का प्रभव ।

गोली भी देनी चाहिये ।

दस्तों के बंद होते ही रोगी को थोड़ा-थोड़ा चावल की लपसी देनी चाहिये ।

यद्यपि लक्षण जाते रहें और रोगी तनिक स्वस्थ अनुभव करने लगे, तो भी नमक का अंशमा देते रहना चाहिये । (दस्त बन्द होने के पश्चात् टॉनिक एसिड का अंशमा बन्द कर देना चाहिये) रोगी को पानी अधिक मात्रा में पीने पर बाध्य कीजिये । इस में नीबू का अर्क मिला हुआ हो । ईजे के उपचार में एक दवा जिस का नाम टम्ब्स मिक्चर (Tomb's mixture) है बड़ा गुणकारी है ।

जब तक रोगी को मूत्र न आने लगे तब तक उसे खतरे से बाहर नहीं समझना चाहिये । इस कारण नमक का अंशमा तब तक जारी रखिये जब तक मुर्दे मूत्र निकलने का काम ठीक तरह से न कर सकें । पीठ के निचले भाग में गरम पानी की सेंके कीजिये और मालिश जारी रखिये ।

दस्त या पौचछ की विह्वल आंधियों का प्रयोग कभी न कीजिये । शराब या किसी दूसरी मद्यक वस्तु का प्रयोग भी न कीजिये ।

ईजे में रोगी की परिचर्या करने वाली परिचारिका (नर्स) के लिए आंधसूचनार्थ

ईजे के रोग में सब से पहला काम यह है कि रोगी को छत की बीमारियों के अस्पताल में ले जाना चाहिये । यदि ऐसा अस्पताल न हो तो रोगी को एक ऐसे कमरे में रखना चाहिये जिस में केवल एक चारपाई, एक मेज और एक कुर्सी हो । खिड़कियों को खुला

रखना चाहिये और यदि सम्भव हो तो दरवाजे और खिड़कियों पर चिके लगा दी जाएं जिस से मौखिकाएं अन्दर न आ सकें।

यदि हैजे के रोगी के मल-मूत्र का निःसंक्रमण न किया जाए, तो एक रोगी सारे गांव और शहर में फैला सकता है। उस के मल को एक टीन में डालिये और फिर १ से १००० 'बाइक्लोराइड ऑब मरकरी सल्युशन' (जो डेड. पाव पानी में साढ़े. सात ग्रैन 'बाइक्लोराइड ऑब मरकरी' मिला कर तैयार किया जाता है) समान मात्रा में मिलाइये। और फेंकने से पहले एक घंटे तक उसे ऐसे ही रहने दीजिये। इसे तालाब में या नदी में या कुएं के पास कभी न फेंकीए।

यदि 'बाइक्लोराइड ऑब मरकरी' न प्राप्त हो सके तो कुएं या तालाब से कम-से-कम १०० फुट दूर एक बड़्छा खादना चाहिये और उन में यह मल फेंक कर ऊपर से चूना या राख डाल कर दबा देना चाहिये। यह उपाय केवल खुले मौसम में ही काम में आ सकता है, बरसात में नहीं। बरसात में यदि निःसंक्रमण प्राप्त न हो तो मल को एक टीन में डाल कर फेंकने से पूर्व खोला देना चाहिये।

हैजे के रोगी का मल इतना विषला होता है (हैजे के कृमिओं के कारण) कि उस की एक बूंद भी जो राई के दाने से भी बड़ी न हो यदि भोजन में या पीने के पानी में चली जाए, तो उसे खाने या पीने वाले व्यक्ति को हैजा हो जाएगा।

जिन बरतनों में हैजे के रोगी ने खाया-पीया है उन में एक भी बरतन बिना उबाले रोगीके कमरे से बाहर नहीं ले जाना चाहिये। जो वस्तु भी हैजे का रोगी अपने छोटों या हाथों से छूता है वह विषली हो जाती है, क्योंकि उस के हाथों और छोटों में हैजे के कृमि होते हैं, अतः उसे दूसरों को नहीं छूना चाहिये। रोगी की देख-भाल करने वाली नर्स को बार-बार १ से १००० 'बाइक्लोराइड ऑब मरकरी सल्युशन' से अपने हाथ धोने चाहिये। उसे अपनी उंगलियां अपने मुंह में कभी नहीं डालनी चाहिये और रोगी के कमरे में बैठ कर कुछ भी नहीं खाना चाहिये। खाना खाने के पूर्व उसे अपने हाथ साबुन और पानी से धोकर १ से १००० 'बाइक्लोराइड ऑब मरकरी सल्युशन' में कुछ मिनटों तक भिगोए रखने चाहिये।

रोगी के ठीक हो जाने के पश्चात् उस कमरे और उस में के सारे फर्नीचर का अध्यय २१ में दी हुई अधिसूचनाओं के अनुसार निःसंक्रमण कीजिये।

हैजे से बचने के उपाय

यह पता लगा है कि यदि हैजे के कृमि अधिक संख्या में शरीर में न हों, तो स्वस्थ व्यक्ति का जठर रस इन्हें नष्ट कर देता है। अतः इस रोग से बचने का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक उपाय यह है कि आमाशय और आंतों को स्वस्थ रखा जाए जिस से सारा शरीर शक्तिशाली और स्वस्थ रहे। हैजे की व्यापकता में मींदरा का सेवन करने वाले अशक्त लोग सब से पहले इस रोग का शिकार बनते हैं और मर जाते हैं।

जब आमाशय खाली हो और शरीर थका हुआ हो तो यदि उस समय हैजे के कृमि शरीर के अन्दर प्रवेश कर जाएं तो हैजे हो जाने का अधिक भय रहता है।

हैजे के कृमि सदा मुंह से अन्दर पहुँचते हैं। अतः इस रोग से बचने के लिए निम्नलिखित बातें बहुत आवश्यक हैं कि खाना अच्छी तरह पका दें, और पानी खाला लिया गया हो और इन पर मीकड़ियाँ न बैठ चुकी हों।

उनीलियाँ कभी मुंह में नहीं डालनी चाहिये

बहुधा कच्चे फल और सब्जी खाने से यह रोग लग जाता है।

जो सावधानी की बातें अतिसार और मोतीझरे के सम्बन्ध में लिखी जा चुकी हैं उन्हीं पर अमल कर के हैजे से भी बचा जा सकता है। उन्हें एक बार फिर दोहराया जाता है।

जो लोग हँजाग्रस्त क्षेत्रों में यात्रा करते तथा जो उन इलाकों में रहते जहाँ हैजे का प्रकोप है, उन को हैजे का टीका लगवा कर सुरक्षित हो जाना चाहिए। यह टीका स्वास्थ्य-केन्द्रों में लगाया जाता है।

हैजे से बचने के १० नियम

१. हैजे का टीका अवश्य लगवाइये।
२. पूर्ण रूप से इस बात का निश्चय कर लीजिये कि पीने के लिए या दांत और मुंह साफ करने के लिए जिस पानी का प्रयोग करें, वह खाला हुआ हो।
३. कोई भी ऐसा खाना न खाइये जो पकाया हुआ न हो और जिस में से भाप न निकल रही हो।
४. खरबूजे, खीरे और कच्चे फल कभी न खाइये।
५. सड़क के किनारे खरीदी हुई प्रत्येक वस्तु हानिकारक होती है और उसे बिना उबाले हुए कभी नहीं खाना चाहिये।
६. जिन वस्तुओं का हैजे के रोगी ने प्रयोग किया है—जैसे तौलिया, रुमाल, बिस्तरा, कठारे और चम्मच आदि—उन को रोगी के कमरे से बाहर ले जा कर उबाले बिना उन का प्रयोग नहीं करना चाहिये।
७. मीकड़ियाँ, किलचट्टा और च्यूटियाँ अपने साथ हैजे के कृमि लाती हैं। भोजन को ढक कर रखना चाहिये जिस से ये उस तक न पहुँच सकें। इस विषय में सावधानी चाहिये कि पकाने के पश्चात् भोजन पर कोई मक्खी न बैठ सके।
८. खाने या पानी को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लीजिये।
९. जिन पीरकारों या मुहत्सों में हँजा फैला हुआ हो उन से घनिष्ट सम्पर्क न रखिये।
१०. यात्रा करते समय पानी पीने का बिल्ला, चिलमची, तौलिया आदि साथ रखिये क्योंकि होटल आदि के या स्टेशनों पर के प्याले आदि का प्रयोग करना खतरनाक है।

पाचन संस्थान के रोग

संसार में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन को कभी-न-कभी निम्न रोगों में से एक या सब ने न आ घेरा हो। यद्यपि ये रोग नातिझरा या मलोरिया जैसे बन्धीर नहीं होते, परन्तु फिर भी बहुत कष्ट देते हैं और दूसरी खतरनाक बीमारियों के लिये रास्ता बना देते हैं।

अजीर्ण (Dyspepsia) के कारण और लक्षण

अजीर्ण के सब से साधारण लक्षण हैं पेट-दुर्द, छाती में जलन, पेट के ऊपर हाथ लगाने से पीडा, जीभ का मैला होना, खट्टी हकारें या हकार द्वारा पेट में से वायु निकालना। सिर दुर्द और बगन भी हो सकता है। कभी-कभी पीठ के पीछे कंधों के बीच में दुर्द होने लगता है। प्रायः कुछ भोजन करने से पेट की पीडा कम हो जाती है, परन्तु फिर और भी तेजी से दुर्द होने लगता है। यद्यत् अपना कार्य ठीक तरह से नहीं करता जिस के परिणाम स्वरूप खट्टी हलके रंग की होती है।

अजीर्ण के कारण इतने अधिक हैं कि उन का वर्णन विस्तार पूर्वक नहीं किया जा सकता। सब से साधारण कारणों में से एक है जल्दी-जल्दी खाना। जल्दी-जल्दी खाने का मतलब है कि खाना ठीक तरह से चबाया नहीं जाता, बल्कि बड़े-बड़े निबाले (ब्रास) यही पेट में उतारे जाते हैं। इस ठोस भोजन को पचाने में पेट को बहुत सा जठर रस बनाना पड़ता है जिस से छाती में जलन होने लगती है और खट्टी हकारें आने लगती हैं। आवश्यकता से अधिक खा लेने पर भी यह रोग हो जाता है। बहुत अधिक मात्रा में बौट-या खाना खाने से भी बढ़जमी हो जाती है, और अधिक मात्रा में मोटा-झोटा खाने से भी (गरीब लोगों में इस रोग का यही कारण होता है)। अचार-मुरब्बे, या ऐसा भोजन जिस में मिर्च, मसाले, अदरक आदि होते हैं—ये सब पेट को हानि पहुंचाते हैं और वह अपना काम करने में अयोग्य हो जाता है।

जिन को शराब पीने की आदत पड़ जाती है उन सब को अजीर्ण रोग होता है, उन को मुख कम लगती है विशेष कर सुबह को भोजन करते समय। वे पेट-दुर्द की शिकायत किया करते हैं और बार-बार उल्टी कर देते हैं। तम्बाकू भी शरीर के लिये उसनी ही हानिकारक है जितनी शराब, और अजीर्ण होने का एक साधारण सा कारण है। बहुत से लोगों में, विशेषकर अधिकारियों, विद्यार्थियों तथा व्यवसायी लोगों में अजीर्ण का कारण यह है कि वे लोग प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते। मनुष्य के रचीयता ने कहा था "तू अपने ही पसीने की रोटी खाएगा।" शरीर का स्वास्थ्य भोजन और व्यायाम पर निर्भर होता है। जो व्यक्ति

खाना खाता है परन्तु व्यायाम (शारीरिक परिश्रम) नहीं करता, उस की पाचन-क्रिया बिगड़ जाती और उसे दुःख भोगना पड़ेगा।

ऊपर दिए हुए कारणों के अतिरिक्त कुसमय भोजन करने से भी अजीर्ण होता है अर्थात् भोजन के नियमित समयों के बीच-बीच में कुछ खाना और रात को देर में पेट भर कर भोजन करना, ये दोनों आदतें कभी-न-कभी मनुष्य को इस रोग का शिकार बना देती हैं। कौन सा भोजन लाभदायक और कौनसा हानिकारक है—इस के विस्तार के लिये अध्याय १४ देखिये।

चिकित्सा

अजीर्ण रोग का इलाज करने के लिये इस के कारण का पता लगाना और उस का उप-मूलन आवश्यक है। तन्मात्र और और अन्य प्रकार के सभी मादक पदार्थों का परित्याग भी आवश्यक है। अस्वस्थ पेट इतना काम नहीं कर सकता जितना स्वस्थ पेट करता है। इस कारण भोजन की मात्रा को कम कर देना उचित होता है। केवल वही भोजन करना चाहिये जो आसानी से पचाया जा सके। ऐसे पचनीय भोजन की सूची यह है: गेहूं की अच्छी तरह सेंकी हुई रोटी, अच्छी तरह मलाए हुए पचपचो चावल (कंजी), दम किए हुए चावल, पानी में पकाए हुए (पोच किए हुए) अंडे,* अंडे की जेली, पकाए या बिना पकाए हुए आड़ू, नाछपाती और अमरुद।

मिठाई न खाना ही अच्छा है: तला हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिये।


यदि अजीर्ण गम्भीर हो तो एक खुराक जलाव (cathartic) की ले लीजिये और २४ घंटे तक कुछ न खाइये। उपवास से अजीर्ण रोग की चिकित्सा करने में सहायता मिलती है क्योंकि इस से पाचन क्रिया के अवयवों को आराम करने का अवसर मिलता है।

जब हृदय में जलन हो और खट्टी डकारें आएँ, तो स्वतःसारा बाला (starchy) भोजन कम करना चाहिये और उसे के बदले चिकनी चीजें खानी चाहिये। यदि हृदय की जलन और खट्टी डकारें बहुत कष्टदायक हों, तो परीश्रष्ट में दिए हुए नुसखे नं. १२ की दस या बीस ग्रैन दवा खाइये। प्रातःकाल उठते ही और रात्रि को सोने से पूर्व थोड़ा सा बहुत गरम पानी पीने से पेट के रोग में कमी होती है। इस के अतिरिक्त जब पेट में दर्द हो तो दिन में दो-तीन बार बीस-बीस मिनट तक सेंक देने से भी बहुत लाभ होता है।।

अजीर्ण किसी प्रकार का क्या न हो इस की चिकित्सा में इस बात पर बल दिया जाए कि रोगी भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास को अच्छी तरह चबाए और भोजन धीरे-धीरे करे। इस उद्देश्य के लिए कि पाचन-क्रिया के अवयव ठीक तरह काम कर सकें प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। जल्दी-जल्दी स्नान कर के त्वचा को साफ रखना चाहिये।

अजीर्ण के साथ प्रायः जो कब्ज होता है, उस की चिकित्सा नीचे के अनुभाग में दी गई अधिस्तूचनाओं के अनुसार की जाती है। ऊपर दिए गए चिकित्सा के नियमों से अजीर्ण का प्रत्येक रोग ठीक नहीं हो सकता। कभी-कभी रोगी के लिये यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कौनसा-कौनसा भोजन भरे लिये ठीक नहीं और उसी-उसी भोजन से उसे बचना चाहिए।

*बीघ के लिए पृष्ठ १५९ देखिये



आमाशय और आंतों का चित्र । बड़ी आंत (वृहदन्त्र) में का बहुत सा तरल शरीर द्वारा शोषित हो जाता है ।

कब्ज (Constipation)

दिन में एक बार या अधिक बार टूट्टी होना आवश्यक है । परन्तु जब दो या तीन दिन में केवल एक बार टूट्टी हो तो इसे कब्ज कहते हैं । कब्ज उन लोगों को भी होता है जो टूट्टी के उतरने के लिये रोज ज़ुलाब लेते हैं । कब्ज के दूसरे लक्षण हैं जीभ का गन्दा होना, श्वास में दुर्गन्ध आना कभी-कभी सिर में दर्द होना, विशेषकर चाद में और पीछे, और कभी-कभी पेट में भी बेचैनी होती है ।

कब्ज का कारण सदा बँठे रहने की आदत, चाय, कॉफी, तम्बाकू या नशे की चीज़ों का सेवन है । कभी-कभी पेट की व्यवस्था के प्राकृतिक दृष्टांत भी उत्पन्न हो जाती हैं जिन

से कब्ज हो जाता है। निरन्तर जलाब लेने से कब्ज का रूप निवृत्त कर बहुत भयंकर अवस्था पैदा कर देता है। स्त्रियों को मुख्यतः यह रोग इस कारण होता है कि जब मल-त्याग की आवश्यकता होती है, तो वे इस पर ध्यान न देकर इसे दबा लेती हैं। समय बीत जाने पर जब मल आंतों के निचले सिरे पर पहुँच जाता है तो फिर मल-त्याग की इच्छा भी जाती रहती है और कब्ज बहुत भयंकर रूप धारण कर लेता है।

चिकित्सा

बहुधा कब्ज का इलाज मलत आंतों को सुधारने से होता है। उचित भोजन और प्रतीदिन शारीरिक व्यायाम (पारहम) करने से विज्ञप्त आर्थियों की अपेक्षा बहुत अधिक लाभ होता है। घुमना या बनीचों में काम करना या इसी प्रकार का कोई शारीरिक व्यायाम प्रतीदिन करना चाहिये। एक बहुत लाभप्रद व्यायाम यह है कि—चिच लेट कर कमर के नीचे कम्बल या कोई और कपड़ा तह कर के रखिये और दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाइये। प्रतीदिन बीस या तीस बार कीजिये। टंगों को ऊपर उठाने से पहले लम्बी सांस लीजिये और टंगों नीचे करके एक बार लम्बी सांस लेकर थोड़ी देर विश्राम कीजिये। टंगों को ऊपर उठाते समय जल्दी न कीजिये। घटने मुड़ने न पाएँ। टंगों को धीरे-धीरे नीचे लाइये एक दम गिरने न दीजिये इस व्यायाम से पेट के स्नायु पट्ट होते हैं और इस प्रकार कब्ज के बहुत से रोग दूर हो जाते हैं।

प्रातःकाल उठ कर एक प्याला गर्म या ठंडा पानी धीरे-धीरे पीने से बड़ा लाभ होता है। बहुत से लोग यथेष्ट मात्रा में पानी आदि नहीं पीते और उन के कब्ज का कारण यही हो सकता है। इसलिए कब्ज के रोगियों को भोजन के समय पानी आदि पीने के अतिरिक्त पाँच या छः गिलास पानी पीने का नियम बना लेना चाहिये। पानी के कुछ भाग के बदले फलों का रस पीना चाहिये।

कब्ज की कुछ दशाओं में टट्टी का रंग सफेद सा होता है। पर कब्ज के इस कारण का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जिनर (यकृत) अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है। इसे प्रसम रीत में लाने के लिये इसे दिन में दो बार १५ से २५ मिनट तक गरम पानी की सेंक पहुँचानी चाहिये और प्रतीदिन सबेरे १/४ ग्रेन इपेकाक (Ipecac) का सेवन करना चाहिये।

कब्ज को दूर करने के लिये जलाब लेने की आदत नहीं डालनी चाहिये, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गोलियाँ खानी आरम्भ कर देता है, तो उन का प्रतीदिन खाना आवश्यक सा हो जाता। जलाब लेने की इस विधि से एक बड़ी हानिकारक आदत पड़ जाती है। दवा के बदले प्रतीदिन एक या आधा आउंस 'agar-agar' का सेवन कीजिये। इस को थोड़ी देर चूल्हे में भून कर खाना चाहिये। इसे उबालना नहीं चाहिये।

किसी भी समय आनिमा द्वारा आंतों को साफ किया जा सकता है, परन्तु प्रतीदिन इस का प्रयोग करना ठीक नहीं। सब से अच्छा उपाय तो यह है कि टट्टी उतारने के लिये पहले एक दो दिन तक तो डेट. पाव या अधिक मात्रा में गरम पानी का आनिमा लीजिये, तीसरे दिन थोड़ी मात्रा में ठंडे पानी का आनिमा लीजिये और चौथे दिन उस से भी कम ठंडे पानी का आनिमा लीजिये। इस प्रकार एक या दो सप्ताह में बिना आनिमा लिये टट्टी अपने आप ही उतरने लगती।



कोष्ठबद्धता (कब्ज) को रोकने में सहायता देने वाले दो व्यायाम

साधारण कब्ज को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि एक छोटी रबर की पिचकारी लीजिये (देखिये २०२ पृष्ठ पर चित्र)। इससे आंतों के निचले सिरे में ठंडा पानी अन्दर पहुँचाइये। साफ़ खाले हुए पानी का प्रयोग कीजिये। पानी अन्दर पहुँचा कर कुछ मिनट खीरये और फिर टट्टी करने जाइये। थोड़ा सा ठंडा पानी आंतों को उत्तेजित करने के लिये पर्याप्त होता है जिस के परिणाम स्वरूप टट्टी उतरती है। यह तरीका ज़ीनमे की अपेक्षा अधिक सहज है और उतना ही गुणकारी भी है।

कब्ज की प्रत्येक दृष्टा की चिकित्सा करने के लिये रोगी को नियमित समय पर मल-त्यागने के महत्व को समझ लेना चाहिये। सब से अच्छा समय प्रातःकाल नाश्ते के बाद का होता है। प्रातःदिन इसी समय टट्टी जाना उचित है चहूँ मल-त्यागने की इच्छा भी न हो, क्योंकि कुछ समय बाद आंतों समय पर टट्टी उतरने की अभ्यस्त हो जाएंगी।

यदि ज़लाब लेना आवश्यक ही हो तो सब से अच्छा ज़लाब यह है कि १५ बूंदें कैसर्का सैगरेडा (cascara sagrada) की पी लीजिये या हर सुबह पांच ग्रेन की कैसर्का सैगरेडा की गोलीयाँ खा लीजिये।

बवासीर—Hæmorrhoids (Piles)

गुदा के ठीक मुँह पर या अन्दर छोटी-छोटी गिल्टियाँ हो जाती हैं। ये गिल्टियाँ इस भाव की नसों (नॉड.यों) के फैल जाने के कारण बढ़ जाती हैं। बवासीर का एक कारण कब्ज भी है।

चिकित्सा

बवासीर या अर्ध रोग (Hæmorrhoids) की चिकित्सा करने का सबसे आवश्यक उपाय कब्ज का इलाज करना है। इस के लिये पहले अनुच्छेद में बौणर्त उपचारों को

काम में लाइये। यदि किसी को गम्भीर अर्द्ध रोग हो तो उसे किसी योग्य डॉक्टर को दिखाना चाहिये क्योंकि ऐसी दशा में सफल चिकित्सा करने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर की ही आवश्यकता होती है।

जब यह रोग गम्भीर न हो तो निम्नीलिखित उपाय अधिक लाभदायक होंगे। टट्टी जानने का एक समय निश्चित कर लेना चाहिये, हो सके तो नाश्ते के बाद, कमजोर अन्त-च्छेद में बताई गई छोट्टी पिचकारी के समान पिचकारी में एक या दो बार साफ ठंडा पानी भर कर आंतों में पड़ना चाहिये, इस के बाद कुछ मिनट ठहरिये और फिर मल-त्याग के लिए जाइये। आंतों को इस प्रकार साफ करने के पश्चात् ठंडे पानी की एक और पिचकारी अन्दर डालिये और तत्क्षण उसे बाहर निकाल लीजिये। इस से आंतों का निचला सिरा साफ हो जाता है और यह चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है। आंतों को साफ करने के बाद एक साफ कपड़े को पानी में भिगो कर गुदा साफ कीजिये। उसे सुखा कर फिर थोड़ा सल्फा-थियोजोल मरहम चारों ओर गुदा पर लगाइये। यह मरहम दिन में दो तीन बार लगा सकते हैं। इसे गुदा के मुंह पर और भीतर आंत में लगाइये।


आंतसार या दस्त (Diarrhoea)

दस्त स्वयं तो कोई रोग नहीं है परन्तु यह दूसरे रोगों का लक्षण अवश्य है। यदि पेट-स में हँजा फैला हुआ हो तो दस्तों का आना उस का पहला लक्षण है और इस की चिकित्सा भी अध्याय २४ में वर्णित विधि के अनुसार करनी चाहिये। यदि दस्त कुछ दिनों तक जारी रहें और मल लाल रंग का हो, जिस में आंव भी हों, तो जो चिकित्सा इस अध्याय में पौचिष्ठ के लिये बताई गई है उस का प्रयोग कीजिये।

दस्त का साधारण आक्रमण बहुधा अनीचित भोजन करने या खराब पानी पीने से होता है। जिस भोजन ने किसी को दस्त लगा दिये हों, सम्भव है वह अपचनीय हो, या ठीक तरह से पकाया न गया हो, या बासी हो, या कच्चे फल हों, या केकड़ा हो, या सूखी मछली हो। दस्तों का एक बहुत बड़ा कारण है मौसम-विषमता। किसी भी रूप में अधिक खाना खा लेने, खराब पानी पीने, आंतों में कीड़े हो जाने और पेट में ठंड लग जाने से भी दस्त लग जाते हैं।

चिकित्सा

बार-बार मल-त्याग की आवश्यकता से यह स्पष्ट हो जाता है कि आंतों अपने अन्दर से विकार उत्पन्न करने वाले किसी पदार्थ को बाहर निकाल-फेंकने का प्रयत्न कर रही हैं; और इसीलिए बार-बार पानी पी कर और प्रत्येक बार मल-त्यागने के बाद १०५ डिग्री फ. तापमान के पानी के अनियंत्रित प्रयोग कर के, और कुछ खुराकें कैंस्टर आयल की पी कर आंतों की इस काम में सहायता करनी चाहिये। पानी थोड़ा-थोड़ा और धीरे-धीरे पीना चाहिये। यदि साधारण पानी अनुकूल न हो, तो पतली-पीच (rice water) पीनी चाहिये (डेढ. पाव पीच में चाय का एक चम्मच नमक मिला हुआ हो)। पानी आंतों में से गुजरता



साधारण कोष्ठबद्धता (कब्ज) की चिकित्सा में एक छोटी पिचकारी का प्रयोग किया जा सकता है।

है और उस पदार्थ को जो दस्तों का कारण बना हुआ होता है, थोड़ा बाहर निकाल देता है। तीन-तीन, चार-चार घंटे बाद पंद्रह-बीस मिनट तक पेट को गर्म पानी से सेंकना चाहिये जिससे दर्द कम हो जाए और रोग दूर हो।

एक दिन अनिद्रा लेने और बतर्ह हर्ह रीति से पानी-पीने के बाद दस्तों को रोकने के लिए यह उपाय कीजिये। पीने के पानी की मात्रा कम कर दीजिये और प्रत्येक बार मल-त्याग के पश्चात् गर्म शर्बतसार (Starch) के अनिद्रा का प्रयोग कीजिये (देखिये अध्याय २२)। चार-चार घंटे बाद परीक्षित में दिए हुए नुसखे नम्बर सात की दवा का प्रयोग कीजिये।

दस्तों की सब दशाओं में रोगी का चुपचाप बैठ रहना आवश्यक है। बिस्तर पर लेटा रहना और भी लाभदायक है। चलना-फिरना या हिलना-डुलना चाँट लकी हुई आँख या हाथ को हिला कर दर्द बढ़ाने ही के समान है।

२४ या ४८ घंटों तक केवल पीच और अंडे की सफेदी का पानी ही पीना चाहिए। (देखिये परीक्षित, नुसखा नं. २७)। जब तक दस्त रुक न जाएं तब तक कोई ठोस भोजन नहीं करना चाहिये और रोग के ठीक हो जाने के बहवात् भी कुछ दिनों तक ठोस भोजन कम करना चाहिये दस्तों के पूर्ण रूप से बंद हो जाने पर भी सज्जी या मांस का एक ग्रस रोग को फिर उभार सकता है।

दस्तों के रोगी का भोजन और पानी बहुत साफ रहना चाहिये; और जिन बरतनों और चम्मच आदि का वह प्रयोग करता हो, उन्हें भी खाली हो पानी में थोड़ा साफ रखना आवश्यक है। रोगी को खाना खाने से पूर्व सदा अपने हाथ थोड़े लेने चाहिये। जब तक दस्त पूर्ण रूप से न रुक जाएं तब तक रोगी के पेट पर १० या १५ इंच की फलार्लन की पट्टी बंधी रहनी चाहिये। इस से पेट को सदा नहीं लग सकती।

पीचिछ या संग्रणी (Dysentery)

पीचिछ के रोग में भी दस्तों की भाँति पतली छट्टी होती है, परन्तु पीचिछ में नीचे की आंतों में मरोड़ा और जलन होती है। मल-त्याग की इच्छा तो बार-बार होती है परन्तु उस की मात्रा बहुत कम होती है, और उस में जाँव और रक्त रहता है। कभी-कभी यह रोग तेज ज्वर के साथ अचानक आ घेरता है।

पीचिछ एक साधारण रूप में एंझिया के लगभग सब देशों में अमीबा (Amoeba) के कारण होती है। अमीबा एक अत्यंत सूक्ष्म रोग-कृमि होता है जो भोजन और पानी के साथ आंतों में चला जाता है। जब अमीबा की पीचिछ होती है तो मल में रक्त और जाँव होते हैं, पेट में दर्द रहता है, मल-त्याग के समय आंतों के निचले सिरे पर जलन होने लगती है। एक दिन में तीस बार या उस से अधिक बार मल-त्याग की आवश्यकता होती है। रोगी कमजोरी महसूस करता है और उस का वजन भी बहुत कम हो जाता है। यह रोग प्रायः जड़, जमा लेता है; कुछ दिन तक दस्त होते हैं, इस के बाद बन्द हो जाते हैं और कुछ दिन तक कब्ज रहता है जिस के बाद फिर दस्त और भी गम्भीर रूप में शुरू हो जाते हैं। अमीबा की पीचिछ बहुत दिनों तक रहने पर भोजन किया जाने के पश्चात् तुरन्त ही अ-पीरवर्तित दूध में छरीर से निकलता है।

जिन लोगों को अमीबीक की पीचिछ होती है उन के क्लैजे (यकृत) के अन्दर कभी कभी पीप पड़ जाती है जिस के परिणाम स्वरूप पसली के निचले सिरे पर दाढ़ और सामने की ओर दर्द होने लगता है। कभी-कभी पीठ में दाढ़ कंधे के नीचे भी पीठ होती है।

चिकित्सा

पीचिछ प्रत्येक रूप में एक खतरनाक रोग होता है, इसलिए यदि सम्भव हो सके तो किसी अच्छे डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिये। पीचिछ की चिकित्सा पीचिछ के रूप को ही देख कर की जा सकती है, और इस के विभिन्न रूपों में अन्तर केवल डॉक्टर ही बता सकता है।

रोगी को बिस्तर में आराम से लिटा देना बहुत आवश्यक है। उसे बिस्तर में लेटे-लेटे ही मल-त्याग के बरतन (bed pan) में मल त्यागना चाहिये। पीचिछ के प्रत्येक रूप में बिस्तर में आराम करना एक आवश्यक चिकित्सा है। किसी भी विज्ञापित औषधि का प्रयोग न किया जाए। ऐसी बहुत कम दवाएँ हैं जिन का प्रयोग इस रोग की चिकित्सा के लिये किया जा सकता है। बिना सोच-समझें आम दस्तों की दवाएँ या लेने से रोग बढ़ जाता है। छराब का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिये। इस से हानि होती है।

पीचिछ के साधारण रूप

पीचिछ के साधारण रूपों और दांतों के रोग के आरम्भ में क्रीमो-सक्सिडिन (Cremo-Suxidine) जैसी किसी औषधि के प्रयोग से तुरन्त ही लाभ होता है। बयस्क रोगी के लिए इस दवा की पहली खुराक खाने के दो चम्मच भर होनी चाहिये; और फिर जब तक रोग ठीक न हो जाए, तीन-तीन घंटे बाद एक-एक चम्मच दवा देते रहना चाहिये। बच्चों को यह औषधि अवस्था आदि के अनुसार देनी चाहिये।

अमीबा की पीचिस में भोजन बहुत नर्म और द्रव्य पदार्थों तक सीमित रखना चाहिये। ठोस सब्जियां, मिर्च, चटनी और मसालों का प्रयोग बंद कर दीजिये। भोजन प्रोटीन की अधिक मात्रा वाला होना चाहिये ---- जैसे दूध और दूध से बने दूसरे पदार्थ, अच्छी तरह पकाई हुई मटर, बीन, दालें आदि। उपर्युक्त भोजनों की यथार्थ मात्रा के साथ-साथ चावल भी साधारण मात्रा में दिए जा सकते हैं। विशेष आर्षांध के प्रयोग में — कुरची बिस्मथ टिकियां (Kurchi bismuth tablets), प्रतिदिन तीन बार एक-एक कर के १०० टिकियां खाई जाएं। एक सप्ताह तक विश्राम कीजिये, और यदि आवश्यक हो तो फिर ये टिकियां खाना आरम्भ कर दीजिये। दूध अथवा दही का प्रयोग प्रतिदिन तीन बार किया जाए।

क्वीनक्राइन (quinacrine) और कारबारसोन (carbarsone) को मिला कर प्रयोग करने से भी चिकित्सा में लाभ होता है, और यदि रोग तीव्र हो तो ऑरिजोमासिन (aureomycin) भी मिला लेनी चाहिये।

अमीबा की पीचिस की आधुनिक चिकित्सा

एक सप्ताह तक प्रति दिन तीन बार दो-दो टिकियां "डाइओडोक्विन" (Diodoquin) की दी जाती हैं। यदि रोगी अच्छा न हो तो दस दिन के पश्चात् ये टिकियां फिर से इसी रीति से दी जाएं।

अमीबा की पीचिस के रोगियों की चिकित्सा किसी अच्छे डॉक्टर से करानी चाहिए। रोग की गम्भीर अवस्था में जब पेट में मरोड़े, और जलन हो तो पेट को नर्म पानी में कपड़ा भिगो कर तथा खूब निचाँह कर इस से संकटा चाहिये अथवा पत्थर या इंट के टुकड़े को नर्म कर के और मोटे कपड़े की तह में रख कर उस से पेट को संकने से दूर दूर होता है। नर्म श्वेतसार (Starch) का जिनमा दीजिये (दीखिये अध्याय २२); डेढ़ पाव नर्म श्वेतसार में जफीम के तत्व (Laudanum) की ४० या ५० बूंदें मिला ली जाएं; इस से पीड़ा दूर हो जाती है। तेज नर्म पानी का जिनमा देने से आंत का नीचे का भाग साफ हो जाता है और बार-बार मल-त्यागने की इच्छा कम हो जाती है; डेढ़ पाव पानी में चाय का एक चम्मच भर नमक मिला लिया जाए।

पीचिस के छेनें रप

पीचिस के दोनों रूपों में "ऑरिजोमाइसिन" (Aureomycin) का प्रयोग किया जा सकता है। यह आर्षांध २५० मिलीग्राम के 'केप्सुल्स' में आती है। इस दवा के खिलाते की साधारण रीति यह है कि जब तक रोग के लक्षण दूर न हो जाएं, तब तक छः-छः घंटे बाद दो-दो केप्सुल्स खिलाते रहिये। फिर दवा कम कर दी जाती है, अर्थात् प्रत्येक छः घंटे के पश्चात् केवल एक 'केप्सुल' दी जाती है, और इस प्रकार २ या ३ दिन तक दवा देते हैं। बालकों के लिए "ऑरिजोमाइसिन" (Aureomycin) की एक विशेष प्रकार होता है जिसे "स्पर्सोडिस" (Spersodis) कहते हैं। यह दवा पिसी हुई चॉकलेट में मिला देते हैं; एक छोटे चम्मच भर चॉकलेट में ५० मिलीग्राम दवा मिलाने में है। इस दवा के

साथ प्रयोग करने की जो अधिसूचनाएं होती हैं, उन से पता लग जाता है कि कितनी उम्र के बालक को कितनी दवा देनी चाहिए।

पीचिश के सब रूपों में उचित भोजन का ध्यान रखना। बहुत आवश्यक है। पीचिश की भाँति जब आँतों में सूजन या कोई दूसरी बीमारी हो जाती है, तो साधारण भोजन करने पर भी आँतें छिन्न जाती हैं और रोग बढ़ जाता है। पीचिश के रोगी के लिये साधारण व्यक्ति की भाँति भोजन करना वैसे ही है जैसे दूसरी आँतों में रेत डाल देना। अहार की मात्रा भी जितनी कम की जा सके कर देनी चाहिये। यदि जीभ पर गन्दी तह जम जाए तो चावल का माँह, या अंडे की सफेदी का पानी देना चाहिए। कच्चे अंडे साधारण रीति से या पीरीइष्ट में दिये हुए एग-नोग (Egg-Nog) की तरह खाने चाहिये। दू-दो घंटे पश्चात् थोड़ा-थोड़ा भोजन करना दिन में तीन बार छक कर खाने की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है। भोजन बहुत ठंडा नहीं खेना चाहिये। खट्टा और कसी भोजन कभी नहीं करना चाहिये। यदि जीभ गन्दी न हो तो दूध पीया जा सकता है। दूध का साफ और ताजा होना आवश्यक है और उस का प्रयोग करने से पहले उसे उबाल लेना चाहिये। रोगी के अच्छा होने के साथ-साथ भोजन की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाते रहना चाहिये। उसे पदार्थ खाने के विषय में अत्यन्त सावधान रहिये। सब्जियां नहीं खानी चाहिये, और बहुत से फल भी ऐसे होते हैं जिन्हें रोगी सहन नहीं कर सकता। प्रत्येक ठोस भोजन निगलने से पहले बहुत अच्छी तरह से चबा लेना चाहिये। यदि एक कण भी बिना चबाए हुए निगल लिया गया तो वह पूर्ण रूप से दूर हुए रोग को फिर से उभार सकता है। नुसखे नम्बर ९ (देखिये पीरीइष्ट) की दवा से मुँह को बार-बार धोकर साफ रखना चाहिये।

दस्त और पीचिश को रोकने की विधि

दस्त और पीचिश को रोका जा सकता है और यह दूसरी बीमारियों की अपेक्षा अधिक आसान भी है। रोग कृमि सदा शरीर में प्रवेश करते हैं; अतः रोग को दूर रखने के लिए केवल साफ भोजन करना और साफ पानी पीना चाहिये और मुँह में कोई गन्दी वस्तु नहीं रखनी चाहिये।

जो लोग निम्नीलिखित नियमों का पालन करेंगे उन्हें दस्त (अतिसार) और पीचिश नहीं हो सकती।

१. दस्त और पीचिश के रोग बहुधा गन्दा पानी पीने से लगते हैं। इन रोगियों के मल में इस प्रकार के बहुत से रोग-कृमि पाए जाते हैं। बहुत सी टीट्टियां कुओं और नदियों के पास होती हैं। कभी-कभी असावधान लोग उस मल को कुएं और नदियों में फेंक देते हैं। अतः जो लोग कुएं या नदी में से पानी लेकर उसे बिना उबाले हुए पी लेते हैं उन्हें सदा दस्त और पीचिश होने का खतरा रहता है। इस कारण पीने या मुँह और दांत साफ करने के लिए पहले पानी को उबाल लीजिये।

२. जब तक हाथों को धोकर साफ न कर लिया जाए तब तक पीने के पानी या भोजन को हाथ न लगाइये।

३. यदि भोजन उन बरतनों में परांस दिया गया है जिन्हें पहले से साफ नहीं किया जा चुका है या बरतन जमीन पर गिर पड़ा है तो उस में रोग कृमि लग सकते हैं जिस से दस्त और पीचछू हो जाती है। इसलिए हर बार जब भोजन के बरतन या कपड़े का प्रयोग किया जाए तो उस को नर्म पानी में उबाल लीजिये। यदि खाने की चीज जमीन पर गिर जाए तो उसे फेंक देना चाहिए या उस को उबाल कर स्वच्छ कर लेना चाहिये या उस भाग को काट कर फेंक देना चाहिए।

४. सारे भोजन को मक्खियों से बचाइये। मक्खियाँ उन लोगों का मल खाती हैं जो दस्त या पीचछू से पीड़ित होते हैं। यह मल मक्खियों के पैरों पर भी लग जाता है। ये मक्खियाँ साफ भोजन पर बैठती हैं और लाखों रोग-कृमि इन पर छेड़ जाती हैं। (मक्खियों को दूर रखने के उपाय के लिये देखिये अध्याय १६)।

५. भोजन का बहुत सा भाग पका हुआ होना चाहिये। भोजन बनाने के पश्चात् उस ठंड कर रख देना चाहिये जिस से मक्खियाँ उस तक न पहुँचें। बाजार से खरीदी हुई सब सब्जियों को पकाना चाहिये सिवाए उन के जो खीरे-ककड़ीयों के समान उबलते हुए पानी में साफ करके और छिलका उतार कर खाई जाती हैं। बाजार से खरीदे हुए सब फलों को खाने से पहले उन का छिलका उतार देना चाहिये। यदि फल को पहले साबुन और पानी से धो लिया जाए और फिर उस का छिलका उतारा जाए, तो उस को साफ हो जाने में संदेह नहीं रहता।

खरबूजों और तरबूज की फाँके बाजार में बिकती हैं; उन से पीचछू दस्त के रोग बहुत अधिक संख्या में फैलते हैं।

६. यदि परिवार के किसी सदस्य को दस्त या पीचछू हो तो उस के मल को फेंकने से पूर्व कोटाणुमुक्त कर लेना चाहिये। यह उपाय अध्याय २१ में बताया जा चुका है। रंगी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी भी प्लेट, प्याले, चिलमची या तौलिये का प्रयोग परिवार के किसी दूसरे सदस्य को नहीं करना चाहिये।

७. उंगलियों को मुँह से दूर रखिये। उंगलियाँ बहुत सी गन्दी वस्तुओं को छूती हैं और यदि उन्हें मुँह में डाला जाए तो दस्त के कोड़े शरीर के अन्दर घुस जाते हैं। साफ भोजन और पानी के अतिरिक्त पेसा या कोई दूसरी वस्तु मुँह में न डालिये।

८. जब भी मल में पतलापन दिखाई दे, तभी उस का उपचार आरम्भ कर दीजिये—चलना-फिरना बन्द कर के आराम कीजिये और भोजन को केवल द्रव्य-पदार्थों तक सीमित रखिये। उपचार जल्दी आरम्भ करने से रोग बम्भीर स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाता।

कृपया याद रखिये:— जब कभी 'सल्फा' खुरी की आँधी नसखे में हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिये कि जब तक आँधी का सेवन किया जाए, तब तक पानी अधिक मात्रा में पिया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि गुरों (बक्को) को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे।

तीक्ष्ण आन्त्रपृच्छ-प्रदाह (Acute Appendicitis)


लक्षण: आन्त्रपृच्छ उदर के दाहिनी ओर स्थित है। यह कूड़े की हड्डी तथा नाभ के बीच लगभग मध्याब्द पर स्थित है। आन्त्रपृच्छ-प्रदाह का प्रथम लक्षण बच्ची अथवा

वास्तविक वेदना हो सकती है। रूग्ण स्थान को दबाने पर क्लेशता भी हो सकती है। डीघू ही दर्द अत्यंत तीव्र हो जाता है। कहीं उदाहरणों में शुरू में दर्द आन्त्रपृच्छ के स्थान पर, मालूम न पड़े, कर सम्पूर्ण पेट में फैल जाता है परन्तु नाभि में अधिक तीव्रता का अनुभव होता है। अतः पेट-दर्द को भी मामूली धात नहीं समझना चाहिये।

यदि रूग्ण तंतु-जाल झांत रखे जाएं और उन्हें छेड़-। न जाए तो आन्त्रपृच्छ की सूजन कम हो सकती है। यदि अरण्डी के तेल (Castor Oil) अथवा किसी अन्य रेंचक की एक खुराक दे दी जाए, तो आंतें उत्तेजित हो कर अधिक क्रियाशील हो जाती हैं और आन्त्रपृच्छ फट सकती है। फटी हुई आन्त्रपृच्छ को काबू में लाना साधारण रूप से सूजी हुई आन्त्रपृच्छ की अपेक्षा अधिक कठिन है।

केवल दर्द ही आन्त्रपृच्छ का निश्चय करने के लिये काफी नहीं है और न दबाने पर क्लेशता का अनुभव ही इस का विश्वस्त लक्षण हो सकता है, किन्तु यदि कठोरता, दृढ़ता तथा पेट की दीवार की पीछियों, विशेष रूप से दाहिनी ओर की पीछियों की क्लेशता आदि लक्षण भी उपस्थित हों तो बहुत संभव है कि आन्त्रपृच्छ-प्रदाह का ही आक्रमण हो। खांसी तथा गहरी सांस दर्द को तीव्रतर करती हैं। इस का आक्रमण चाहे 'कपकपी लग कर शुरू हो या न हो किन्तु शुरू से थोड़ा-बहुत ज्वर होगा ही। आम तौर पर रोगी को कंष्ठबद्धता (कब्ज) होती है तथा वह भूख न लगने, जी मिचलाने व उल्टी की शिकायत करता है। बिस्तरे पर लेटने पर रोगी पीड़ा-युक्त भाग के तनाव से मुक्ति पाने के लिये अपनी दाहिनी टांग ऊपर को खींचता है।

यदि इन लक्षणों से आन्त्रपृच्छ-प्रदाह की पीड़ा का संदेह हो तो डीघू ही डॉक्टर को बुला लीजिये। उस के आने तक रोगी को बिस्तरे में पूर्णतया झांत लिटाए रखिये। यदि डॉक्टर को संदेह हो तो वह कुछ परीक्षण कर सकता है जिन के लक्षणों से वह रोग का पक्का निर्णय कर सके। बांछित सूचना मिल जाएगी।



स्थूल आंत्राशय और आंत्र-पृच्छ

साधारणतः आन्त्रपुच्छ-प्रदाह प्रतिकरोध-शक्ति (resistance) की दुर्बलता के कारण होता है। खाने-पीने की अधिकता, कोष्ठबद्धता (कब्ज), कार्य की अधिकता, चिन्ताएं, ठंड लगना तथा गिरा हुआ स्वास्थ्य इन में से एक या सब, रोगों के प्रति अवरोध-शक्ति के क्षीण होने का कारण हो सकते हैं।

अगली अवस्था सृजन उत्पन्न करने वाले अथवा मवाद उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं का सम्पर्क हो सकती है। कष्ट का ठीक-ठीक क्या रूप होगा यह इस बात पर निर्भर है कि किस अंग पर रोग-आक्रमण हुआ है। यदि आन्त्रपुच्छ पर आक्रमण हुआ है तो रोग आन्त्र-पुच्छ-प्रदाह (Appendicitis) होगा। जब डॉक्टर द्वारा आन्त्रपुच्छ-प्रदाह की पुष्टि हो जाए तो इल्युक्रिया की जाए या नहीं यह रोगवृद्धि तथा रोगी की सामान्य अवस्था द्वारा ही निर्णयित होगा। यदि हालत बदतर होती जाए या गिल्टी की वृद्धि से मवाद उत्पन्न होने का पता चले, तो इल्युक्रिया चिकित्सा करनी होगी।

सामान्यवश आन्त्रपुच्छ के अनेक रोगी बिना इल्युक्रिया के हँसीं ठीक हो जाते हैं। यदि इल्युक्रिया आवश्यक हो और इसे करने में अधिक देर न की जाए तो रोगी के जल्दी अच्छा हो जाने का अच्छा अवसर होता है।

यदि आन्त्रपुच्छ के सीधे ऊपर बर्फ की थैली रख दी जाए तो बेदना कम हो जाएगी और रोग-वृद्धि विलम्बित हो जाएगी रोग स्थान को संकना नहीं चाहिये, परन्तु रोग की जगह बर्फ का प्रयोग करते समय यदि टांगों और पैरों में बर्फी पहँचाई जाए तो उस से लाभ होगा।

बहुमूत्र-रोग (Diabetes)

बहुमूत्र-रोग प्लोम-ग्रांथि (Pancreas) की रोग अवस्था से उत्पन्न होता है। इस अवयव से 'इन्सुलिन' (insulin) निकलता रहता है जिस की आवश्यकता साधारणतया शरीर के उस ईंधन को जलाने के लिये पड़ती है जो शक्कर के रूप में जिगर द्वारा रक्त को प्रदान किया जाता है। जब 'इन्सुलिन' की कमी अथवा उस का निरन्तर अभाव हो जाता है, तो रक्त में उपस्थित शक्कर प्रयोग में नहीं आती और फलतः मूत्र में दिखाई देने लगती है। बहुमूत्र-रोग के अन्य विशेष लक्षण, शरीर के वजन में द्रुतगामी कमी, कमजोरी, असामान्य रूप से क्षुधा-वृद्धि, तीव्र प्यास, पीठ में दर्द, फोड़े-फुंसी इत्यादि, रक्त-विकार, विषर्ले फोड़े, (carbuncles), चर्मरोग (eczema) और खाज के रूप में प्रगट होते हैं।

बहुमूत्र-रोग के बढ़ जाने पर बार-बार आंखों में अन्य लक्षण उपस्थित होने लगते हैं। तब नेत्र-रोग विशेषज्ञ (आंख के डॉक्टर) को रोगी की आंखों में बहुमूत्र जनित मांति-या-विन्द, नाडी-पटल अथवा नेत्र-चित्र-पट-प्रदाह (inflammation of retina) या आंख के गोलक (टोले) की कमजोरी इत्यादि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बहुमूत्र-रोग किसी भी उम्र में बिना किसी जाति अथवा यौन-भेद के हो सकता है। यदि आप के कुटुम्ब में किसी सदस्य को यह रोग हो तो आप को भी यह बीमारी हो जाने की सम्भावना है। बहुमूत्र-रोग चालीस वर्ष से अधिक अवस्था वाले लोगों में अधिकतर होता है विशेषतः जब उन का वजन अनूचित रूप से अधिक हो। स्त्रियों को यह रोग पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है।

बहुमूत्र-रोग एक चिरस्थायी रोग है। इस की कोई चिकित्सा ज्ञात नहीं है। इन्सुलिन (insulin) की सुइयों और सुनिश्चित आहार द्वारा यह नियंत्रित किया जा सकता है। प्रत्येक रोगी को उस की दृष्टानुसार चावल, रोटी साबूदाना, शक्कर इत्यादि का प्रयोग करने को कहना चाहिये। इसी पलेबाली सब्जी का अधिक प्रयोग किया जा सकता है।

अध्याय २६

कृमियों द्वारा फैलने वाले रोग


मोह ज्वर (Typhus Fever)

मोह-ज्वर एक ऐसा रोग है जिस के कितने ही नाम हैं जैसे जेल (बन्दी-बूढ़) का ज्वर, जहाज का ज्वर, अकाल का ज्वर। इन नामों से ज्वर के स्वरूप का पता चल जाता है अर्थात् यह एक ऐसा ज्वर है जो उन लोगों को होता है जिन को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता और जो धनी और बन्दी बास्तियों में रहते हैं। अकाल के स्थानों में यह महामारी के समान फैल जाता है।

इस बात का निश्चयपूर्वक पता चल गया है कि यह रोग शरीर की और सिर की जगहों से फैलता है। चारपाई के खटमल जैसे दूसरे कीड़ों द्वारा भी इस रोग का फैलना सम्भव होता है इस के लभने की एक और सम्भावना यह भी है कि मोह-ज्वर के रोगी के मल-मूत्र पर से मीकट्रिया उड़ कर रोग-कृमियों को भोजन और पीने के पानी पर ले जाती हैं, जिस से यह रोग फैलता है।

लक्षण

मोह-ज्वर के रोगी को काटने के पश्चात् जब जूएं किसी दूसरे व्यक्ति को काटती हैं तो उसे बहुत जल्दी १२ दिन से पहले-पहले ही रोग लग जाता है। पहले-पहल सर्दी लगती है, इस के बाद ज्वर तेजी से बढ़ता है और चित्तीवभ्रम (delirium) की सम्भावना भी रहती है। आंखें लाल हो जाती हैं और उन में से पानी निकलने लगता है। तीसरे या चौथे दिन बुखार १०४ डिग्री फ. या १०५ डिग्री फ. १०६ डिग्री फ. तक जा सकता है। फिर अगले चार या पांच दिन तक प्रतीदिन प्रातःकाल ज्वर पहले की अपेक्षा कम होगा, परन्तु शाम को १०३ डिग्री फ. १०४ डिग्री फ. तक पहुँचता रहेगा। साधारणतया रोग के १४वें दिन ज्वर अचानक उतरने लगता है। ज्वर के उतरते समय बहुत पसीना आता है।



शरीर की जंई या चीलर (Body Louse) चूहों का पिस्सू (Rat Flea) खुजली का कीटाणु (Itch Mite) मच्छर (Mosquito) खटमल (Bedbug) मनुष्य का पिस्सू (Human Flea) काष्ठ-कीटाणु (खून चूसने वाला) (Wood Tick) मक्खी (Housefly)

रोग के दूसरे या तीसरे दिन शरीर में कुछ दाने से निकल आते हैं और ये अन्न-बहनों और कंधों पर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। ये दाने पहले खसरा के दानों की भांति दिखाई देने, थोड़े समय बाद पहले निकल हुए दानों के बीच में गहरे नीले रंग का बिन्दु दिखाई देने लगता।

चिकित्सा

दवाइयां न तो इस रोग का इलाज कर सकती हैं और न ही इस का मियाद को कम कर सकती हैं। २४वें अध्याय में मोतीहरा ज्वर को जो चिकित्सा बताई गई है वही मोह-ज्वर के लिये भी बहुत लाभदायक होती है। रोगी को चारपाई पर लिटा देना चाहिये। मकान के बाहर बरामदे में या किसी सायेदार स्थान में जहाँ धूप न आ सके, वहाँ रोगी का बिस्तर लगाना चाहिये। रोगी को खोला हुआ पानी बहुत अधिक मात्रा में पीने को दीजिये, उसे फलों का रस भी दीजिये। चावल का मांड़, शोरबा, कस्टर्ड, डबल रोटी के टोस्ट और खोला हुआ दूध आदि भोजन दीजिये।

रोग से बचे रहने का उपाय

जो लोग साफ स्थानों में रहते हैं और जो साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, उन्हें प्रायः यह रोग नहीं लगता क्योंकि उन के कपड़ों या बिस्तरों में जुए नहीं होते।

यदि पड़ोस में कहीं मोह-ज्वर हो तो इस बात में पूरी सावधानी रखनी चाहिये कि जू न काटने पाए अर्थात् साफ सुथरे रहना चाहिये। यदि किसी व्यक्ति को रोगी के पास जाना ही पड़े, तो उसे रोगी के कपड़ों को नहीं छूना चाहिये, उस की चारपाई पर नहीं बैठना चाहिये और रोगी के किसी भी कपड़े, हेट, टोपी, जूते, भोज को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिये।

रोगियों की देख-भाल करते समय उन की चारपाइयां और बिछाने साफ रखने चाहिये और उन के बालों को भी छोटा करवा देना चाहिये। रोगी के निरोग हो जाने पर उस के बिस्तर और कपड़ों का निःसंक्रमण कर लेना चाहिये।

लंगड.१-ज्वर (Dengue Fever)

लंगड.१-ज्वर एक ऐसा रोग है जो मच्छरों से फैलता है। लंगड.१-ज्वर वाले मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो रोग के उभरने में तीन से छः दिन तक लग जाते हैं। इस का आक्रमण सहसा होता है। पहले थोड़ा ठंड सी लगती है और उस के बाद छप पिर, सिर या पीठ में तीक्ष्ण पीड़ा होने लगती है। सिर में बहुत तीव्र पीड़ा होती है विशेष कर माथे में, और आंखों के पिछले भाग में। आंखें लाल हो जाती हैं और उन में से पानी निकलने लगता है। ज्वर बहुत तेजी से १०३ से १०५ डिग्री फ. तक पहुँच जाता है। भूख मर जाती है। जी मिचलने लगता है और के होने की सम्भावना भी रहती है।

बच्चों को बड़े-सी सी आने लगती है और हाथ-पांव एंठने लगते हैं। तीसरे दिन सहसा ज्वर उतर जाता है और उस के साथ-साथ पसीना आने लगता है और कभी-कभी पेशाब बहुत तेजी के साथ आता है और दस्त भी आने लगते हैं। इस के बाद रोगी एक-दो दिन तक ठीक रहता है और फिर पीडा होने लगती है, और ज्वर भी बढ़ जाता है। हाथों, शरीर और टांगों में दाने भी निकल सकते हैं। दूसरी बार का यह ज्वर बहुत घांटे, समय तक ही रहता है, और फिर तापमान प्रसन्न अवस्था में आ जाता है।

घीकत्सा

रोगी को बिस्तर में लेटा रहना चाहिये और रात-दिन मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिये जिस से मच्छर उसे काट न सके और फिर यह रोग फैल न सके। चावल का मोड़, आंशिक रूप से उबले हुए अंडे और फलों तक ही उस का भोजन सीमित रखना चाहिये। आरम्भ में ही उसे एक खुराक कैस्टर आयल या एपसम साल्ट की दीजिये। सिर को दर्द दूर करने के लिये ठंडे पानी में भिगो कर निचांढा हुआ कपड़ा या बर्फ उस के सिर पर रखिये। रोगी को खाली हुआ ठंडा पानी और फलों का रस या लेमन पीने को दीजिये। शरीर के जिन भागों में दर्द होता है उन पर नर्म पानी की सेबों का प्रयोग कीजिये।

रोग को रोकने के लिये मच्छरों से अपने आप को बचाना आवश्यक है। अपनी चारपाई पर मच्छरदानी लगाइये, और सफर करते हुए उसे अपने पास रखिये।

महामारी (Plague)

प्लेग को, 'काली मृत्यु' या 'गिल्टी का प्लेग' या 'ताऊन' भी कहते हैं। यह रोग कृमि द्वारा फैलता है। ताऊन-कृमि चूहों में एक प्रकार का व्यापक रोग (Epizootic) उत्पन्न करते हैं और यह रोग-उत्पादक कृमि चूहों से मनुष्य में पिस्सुओं द्वारा फैल जाता है। प्लेग मनुष्य को लगने वाली बीमारियों में से एक भीषण रोग है। जब यह बीमारी किसी स्थान में फैलती है तो लोगों को लाशों की संख्या में मर डालती है।

लक्षण

प्लेग-कृमियों के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात् यह रोग बहुत जल्दी फैल जाता है प्रायः तीन दिन में। आरम्भ में एक दम सदा लगे हुए ज्वर बहुत तेजी से १०३ या १०४ डिग्री फ. तक पहुँच जाता है। सिर-दर्द, हाथ-पैरों में पीडा, बमन और दस्त भी आने लगते हैं। कुछ ही घंटों में आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरे की मृदा डरावनी और चिन्ताजनक हो जाती है। ज्वर शीघ्र ही १०७ डिग्री फ. तक पहुँच सकता है और फिर रोगी शीघ्र ही मर जाता है।

यदि रोग कम गम्भीर प्रकार का हो तो ज्वर प्रायः १०४ डिग्री फ. तक ही पहुँचता है। भिन्न-भिन्न आकार की गिल्टियाँ जाँघ के जोड़, बगल या नर्दन में निकलती हैं। इन

से बहुत पीडा होती है। रोग के बढ़ने के साथ-साथ रोगी प्रति दिन कमजोर होता जाता है और प्रायः बेसुध (भ्रान्तिचिन्त) सा हो जाता है।

रोग के आरम्भ होने के कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो सकती है। इस रोग के एक रूप "काली मृत्यु" में त्वचा पर काले दाग पड़ जाते हैं। इस रोग के एक रूप है जिससे फुफ्फुसीय महामारी (Pneumonic Plague) कहते हैं, इस में फेफड़े, मुख्य रूप से रोग-ग्रस्त होते हैं, इस से दो या तीन दिन में मृत्यु हो जाती है।

चिकित्सा

प्लेग की सब से अच्छी चिकित्सा प्लेग का टीका लगवाना है जो प्लेग के कृमियों द्वारा फैलाए हुए बिष पर कब्ज पा लेता है। सल्फाडायजीन (Sulfadiazine) या सल्फाथियाजोल (Sulfathiazole) की खुराक भी लाभप्रद होती है (बयस्कों के लिये प्रत्येक चार घंटे पश्चात् दो गोलीयाँ)। प्लेग की बीमारी की सूचना तुरन्त स्वास्थ्य अधिकारी (Health Officer) को पहुँचा देनी चाहिये। रोगी को किसी कुशल डॉक्टर की देख-रेख में रखना उचित है।

रोगी को बिस्तरे में लिटाए रखना चाहिये और उस के कमरे की खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिये। उसे पानी यथेष्ट मात्रा में पीने को दीजिये। ज्वर होने पर ठण्डे पानी से अंगोष्णना चाहिये, देखिये अध्याय २१। ठण्डे पानी में कपड़ा भिगो कर रोगी के सिर पर रखना चाहिये। कपड़े को बार-बार भिगोइये। भोजन में खोरबा, चावल का मांड और आंशिक रूप से उबाले हुए अंडे होने चाहिये (देखिये अध्याय २१)।

रोग की रोक-थाम

प्लेग की रोक-थाम करने के लिये अधिकारियों को जनता की भलाई के लिये और लोगों को व्यक्तिगत रूप से बड़ी प्रतिबन्धक उपाय करने चाहिये जो हैजा फैलाने पर किए जाते हैं।

जिस क्षेत्र में महामारी फैली हुई हो वहाँ के अधिकारियों और दूसरे लोगों को चाहिये कि सारे चूहों को नष्ट कर दें। यह बहुत पहले ही पता चल चुका है कि मनुष्यों से पहले चूहों को यह रोग लगता है। चूहों के मरने के पश्चात् उस के चूहे शरीर के पिप्पु निकल कर लोगों के शरीरों में घुस जाते हैं। प्लेग के चूहों को काट कर पिप्पु उन के कृमि अपने शरीर में ले लेते हैं और जब वे आदमी को काटते हैं तो वे कृमि उस के शरीर में चले जाते हैं जिस से उसे प्लेग हो जाती है।

जहाँ चूहे नहीं होते, वहाँ प्लेग भी नहीं हो सकती। चूहों को मारने वाले लोगों की टीलीयों को नियमित रूप से चूहे मारने चाहिये। चूहेदान, जहर, बिोल्लियाँ और चूहे पकड़ने वाले कुत्ते चूहों को मारने का काम भली प्रकार से कर सकते हैं। परन्तु इस का सब से बौद्धिगम उपाय यह है कि भोजन और खाने पीने का सामान घरों में ऐसे स्थानों में रखना चाहिए जहाँ चूहे न पहुँच सकें। चूहे बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते। इस के अतिरिक्त जिन दीवारों और फर्शों में चूहों ने अपने भट बना रखे हैं उन

के स्थान पर ऐसी दीवारें और फर्श बनवाइये कि वहाँ चूहे न आ सकें। शहर के विभिन्न भागों में एकठे हुए चूहों की परीक्षा करने से यह बता सकते हैं कि शहर के किस भाग में प्लेग है और किस में नहीं है।

प्लेग की दवा रक्त-रस (Serum) होती है जो टीका लगाने के काम में आती है। यह ज्ञात हुआ है कि बिना टीका लगे लोगों के प्लेग होने की अधिक अशंका रहती है और टीका लगे लोगों के कम, और बिना टीका लगे लोगों के यह रोग हो जाता है उन की मृत्यु की सम्भावना बिना टीका लगे रोगियों से कम होती है। यदि प्लेग किसी मुहल्ले में फैल जाए तो वहाँ के सब रहने वालों के, बूढ़े, छोटें या जवान, प्रतिबन्धक उपाय के तौर पर, इस का टीका लगा देना चाहिये।

जब किसी मुहल्ले में प्लेग फैलती है तो रोग का मनुष्य पर आक्रमण होने से पूर्व चूहे मरने लगते हैं। बीमारी के दिनों में जब कभी कोई मरा हुआ चूहा घर में या घर के आस-पास मिले तो तुरन्त इस की सूचना स्वास्थ्यधिकारी को दीजिये। उस के जान तक मरे हुए चूहे को अपने पास रखे रहिये। चूहे को हाथ से न उठाइये। चूहे को बाहर फेंकने से पूर्व उस पर कार्बोलिक एसिड (Carbolic Acid) या खालता हुआ पानी छाल दीजिये।

प्लेग वाले पिस्तुलों से अपने आप को बचाने के लिये उन घरों में नहीं जाना चाहिये जहाँ प्लेग के रोगी हैं। घर के फर्श पर मिट्टी का तेल, फिनाइल, क्रेयल का तेल (Crude Coal Oil) जेज फ्ल्यूइड (Jees' Fluid) सिलियम (Cylliom) छिड़कने से उस घर में पिस्तु प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह तेल दीवारों की जड़ों में बार कमरे के खानों में छिड़किये। पिसी हुई फिटकरी या डी. डी. टी. पाउडर भी फर्श पर छिड़कने से पिस्तु कमरे के अन्दर नहीं आएंगे।

यदि प्लेग के रोगियों वाले मकान में जाना आवश्यक हो तो पहले प्लेग का टीका लगवा लीजिये और उस के अतिरिक्त मांमजामे या प्लास्टिक का मूट जो घोंघे के भी ढकल पहन लीजिये। यह शरीर की रक्षा करेगा और पिस्तु उस के अन्दर घुस कर त्वचा को काट न सकेंगे।

यदि यह फुफ्फुसीय महामारी (Pneumonic Plague) हो, तो नर्स और रोगी के घर में रहने वाले दूसरे लोगों को अपने मुँह पर एक ऐसा मुखारण (Mask) लगाना चाहिये जो रुई की पतली तह का बना हो और जिस के दोनों किनारों पर गॉज (Gauze) के दो टुकड़े हों।

फुफ्फुसीय महामारी (Pneumonic Plague) सब से अधिक संक्रमक रोगों में से एक है। श्वास लेते समय रोग-कृमि हमारी नाक में घुस जाते हैं, इसी लिये मुखारण चेहरे पर लगाना चाहिये।

मलेरिया


मलेरिया भारतवर्ष में एक आम बीमारी है और प्रायः वर्ष इस से हजारों जादमी मरते हैं। मलेरिया एक ऐसा रोग है जिससे बड़ी आसानी से रोक जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह रोग केवल एक ही तरीके से लग सकता है अर्थात् मच्छर

मलैरिया-मुखार वाले किसी व्यक्ति को काट कर किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है और रोग लग जाता है।

मलैरिया, मलैरिया के रोग-कृमि द्वारा होता है जो रोगी के रक्त में पलता है। जब कोई मच्छर मलैरिया के रोगी को काटता है तो वह उस व्यक्ति का थोड़ा सा रक्त चूस लेता है। इस रक्त में मलैरिया के कीटाणु होते हैं और कुछ दिनों बाद जब यह मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उस के शरीर में मलैरिया के कुछ कीटाणु प्रविष्ट कर देता है और इस के परिणाम स्वरूप खीघ, ही सदी लगने लगती है और ज्वर आने लगता है।

सब मच्छरों में मलैरिया के कीटाणु नहीं होते। इस रोग को फैलाने वाले मच्छरों की पहचान उन के आकार और किसी वस्तु पर खड़े होने के ढंग से की जा सकती है। चित्र में मलैरिया वाले मच्छर और दूसरे मच्छरों में अन्तर स्पष्ट रूप से बोधित हो रहा है।

यद्यपि मलैरिया वाले मच्छर दूसरे मच्छरों की अपेक्षा इतने आम नहीं हैं फिर भी यह कहा जा सकता है कि जहाँ दूसरे मच्छर होते हैं वहाँ ये भी प्रायः उपस्थित रहते हैं।



बाईं ओर: मलैरिया का मच्छर और जंघे से निकलने के बाद उस की प्रथम अवस्था; ऊपर पंख दिखाया गया है।

दाहिनी ओर: सामान्य मच्छर और जंघे से निकलने के बाद उस की प्रथम अवस्था; ऊपर पंख दिखाया गया है।

मलीरिया को फैलने से रोकने की विधि


मलीरिया को फैलने से रोकने के लिये मच्छरों को नष्ट कर देना आवश्यक होता है। इस का सब से अच्छा उपाय यह है कि उन्हें पंदा ही न होने दिया जाए। मच्छर केवल पानी में ही उत्पन्न हो सकते हैं। मादा मच्छर तालाब के पानी, धान के खेतों, पोखरे, बाल्टी, घड़े, खाली टिन, खाली नारियल की खोपड़ी और हर उस पात्र में जिस में पानी भरा हो अंडे देती है। ये अंडे दो या तीन दिन में रेंगने वाले कीड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। तालाब और पोखरों में रेंगने वाले कीड़ों की गति और आकार को प्रत्येक व्यक्ति ने देखा होगा। दो हफ्ते में ये रेंगने वाले जन्तु पूर्ण रूप से बिकसित मच्छर बन जाते हैं।

मच्छरों को बढने से रोकने के लिये तालाबों और पोखरों में नालियां बना देनी आवश्यक हैं। मच्छर बहुत हल्के पानी में कभी पंदा नहीं डूबते। खाइयां गहरी खोदनी चाहिये और इन के किनारे सीधे (लम्बाकार) होने चाहिये जिस से घास-पात इन में न जा सके। बरसात के मौसम में तालाबों और पोखरों में पानी जमा होने से रोकने के लिए बहुत से स्थानों पर नालियां बनाना सम्भव नहीं होता। यदि किसी तालाब में नालियां न बन सकें तो उस में बहुत सी छोटी-छोटी मछलियां डाल दीजिये या बत्खें पालइये क्योंकि मछलियां और बत्खें दोनों इन कीड़ों को खा लेंगी—इस प्रकार मच्छरों को बढने से रोकिये। मच्छरों को न बढने देने का सब से अधिक गुणकारी और उत्तम उपाय यह है कि तालाबों या पानी के अन्य स्थानों पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाए। तेल पानी पर फैल कर अपनी तह जमा देता है जिस से उन कीड़ों को सांस लेने को हवा नहीं मिलती और वे झीघू ही मर जाते हैं। इस में अधिक तेल की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। एक बड़े पीपे या उतने ही बड़े दूसरे बरतन में भरे पानी के लिये मिट्टी के तेल का एक बड़ा चम्मच काफी है। बीस फूट लम्बे और बीस फूट चौड़े तालाब के लिये मिट्टी के तेल का एक गिलास पर्याप्त है। यदि प्रतिदिन या तीसरे दिन बारिश हो तो हफ्ते में एक बार तेल छिड़क देना चाहिये।

अब इस बात का पता चल चुका है कि यदि हवा अनुकूल हो तो मच्छर बहुत दूर-दूर उड़ कर जा सकते हैं। यह बात कुछ वर्षों पहले ज्ञात नहीं थी; इसीलिए मच्छरों को नष्ट करने और पंदा होने से रोकने का काम किसी अकेले परिवार या किसी व्यक्ति विशेष का उत्तरदायित्व नहीं, बरन् सारे मुहल्ले और पास-पड़ोस वालों का है।

इस बात में भी सावधानी की आवश्यकता है कि पुराने टीनों, घड़ों या बांस के खोखले ठूँखों में पानी जमा न होने दिया जाए। यदि मकान की छत के किनारे परनाला हो तो उसे कुछ सप्ताह बाद साफ करवाते रहना चाहिये जिस से उस में पानी जमा न हो जाए।

मलीरिया को रोकने का एक और उपाय है जिस का प्रयोग बूढ़े-जवान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिये और वह है मच्छरदानी लगा कर सोना। मलीरिया को फैलाने वाले मच्छर लोगों को दिन में बहुत कम काटते हैं, वे रात को अपना काम करते हैं। मच्छरदानी पतली जाली की होती चाहिये जिस से कोई मच्छर अन्दर न घुस सके। हर रात को इस का प्रयोग करना चाहिये। यात्रा करते समय इसे अवश्य अपने साथ ले जाना चाहिये और हर रात को इसे लगा कर सोना चाहिये। बच्चों की चारपाई पर भी मच्छरदानी लगानी चाहिये।



मच्छरों के सामान्य उत्पात-स्थान

लक्षण

मलेरिया के साधारण लक्षणों से तो सभी लोग परिचित हैं, वे लक्षण ये हैं—पहले सदी लगती है, फिर ज्वर चढ़ता है और उस के बाद पसीना आता है और सिर में दर्द होता है। साधारण सदी लगने से पहले रोगी कमजोरी का अनुभव कर सकता है। सिर-दर्द, जी मिचलाना और कै करना भी सम्भव है। छोटे बच्चों के शरीर में (पीछियों में) कभी-कभी एंठन भी होने लगती है। सदी लगने के पचात् ज्वर १०३ या १०४ डिग्री फ. तक पहुँच जाता है। ज्वर दो तीन घंटे तक रहता है फिर रोगी को पसीना आने लगता है, इस के बाद ज्वर कम हो जाता है। इस प्रकार का आक्रमण प्रतिदिन, तीसरे दिन या दो दिन छोड़ कर हो सकता है। यह ज्वर अनियमित रूप से एक हफ्ते में दो बार या महीनों में एक आध बार भी हो सकता है।

मलेरिया कई प्रकार का होता है। कुछ लोगों में लक्षण मलेरिया के मांतीझरे जैसे होते हैं, परन्तु कुछ रोगियों में सब से प्रमुख लक्षण तीक्ष्ण मिर-पीडा भी हो सकती है। बच्चों में कभी-कभी मलेरिया के लक्षण दस्त और कमजोरी ही होते हैं।

चिकित्सा

मलैरिया के रोगी छोटे बच्चों को दिन में पांच बार एक-एक ग्रैन क्वीन देनी चाहिये। एक से तीन साल तक के बच्चों को एक या दो ग्रैन क्वीन दिन में पांच बार देनी चाहिये। दस साल तक के बच्चों को दो से तीन ग्रैन, क्वीन दिन में पांच बार देनी चाहिये।

६ साल के बच्चों को प्रतिदिन दो ग्रैन क्वीन देना चाहिये जिस से रोग को रोक जा सके। परन्तु बहुत दिन तक क्वीन का सेवन करना उचित नहीं है क्योंकि इस से स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है।

चूँकि मलैरिया कितने ही प्रकार का होता है इसीलिए जिस प्रकार का मलैरिया है उसी प्रकार की चिकित्सा का प्रबन्ध होना चाहिये। मलैरिया के विशेष प्रकार का निदान तो अस्पताल या प्रयोगशाला में ही सम्भव होता है, परन्तु घर पर सब प्रकार के मलैरिया की चिकित्सा का प्रबन्ध रखना चाहिये। इस रोग की चिकित्सा के लिए कई प्रकार की औषधियाँ हैं और कई मालूम की जा रही हैं। साधारणतया प्रयोग में आने वाली दो औषधियाँ हैं—क्वीन और अंटाग्रिन (Quinacrine, Mepacrine)। अंटाग्रिन अधिक अवस्थाओं में गुणकारी सिद्ध होती है। बयस्क के (११½ ग्रैन की) एक-एक या दो-दो गोलीयाँ, दिन में तीन बार, पांच दिन तक दी जाएँ, और इस के बाद पंद्रह दिन तक प्रतिदिन एक गोली दी जाए। कम वजन के और कमजोर लोगों के लिए दिन में तीन बार एक-एक गोली काफी होती है। बाहर काम-काज करने और चलने-फिरने वाले मोटे-ताजे लोगों के लिए दिन में तीन बार दो-दो गोलीयाँ अधिक लाभकारी होती हैं।

दस दिन तक, दिन भर में—सबरे, दोपहर के और रात के—कुल दस ग्रैन क्वीन खिलानी चाहिये, इस के बाद बीस दिन तक, दिन भर में—सबरे और शाम के—कुल पांच ग्रैन क्वीन देनी चाहिये। बच्चों को उन की आयु के अनुसार क्वीन दी जाए। क्वीन की मात्रा निश्चित करने के लिये यह सुझाव ध्यान में रखना चाहिये। मलैरिया के रोगी छोटे बच्चों को दिन में पांच बार एक-एक ग्रैन क्वीन देनी चाहिये।

मलैरिया को दूर करने की एक तीसरी औषधि भी है। यह दवा पैलुड्रिन (Paludrine) के नाम से बिकती है। अंटाग्रिन की भाँति इस का त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिकतर मलैरिया के रोगी को तीन गोलीयाँ एक साथ देने से तुरन्त आराम होता है। पूरी चिकित्सा के लिये दस दिन तक एक-एक गोली दिन में तीन बार खानी चाहिये। हफ्ते में दो बार-बुधवार और रविवार को एक-एक गोली खाने से मलैरिया नहीं हो सकता। दस साल से ऊपर के बच्चों को बयस्क मानना चाहिये। दस साल से कम आयु वाले बच्चों को ¼ (एक चौथाई) गोली देनी चाहिये।

मलैरिया की चौथी औषधि विशेष क्मोक्विन (Camoquin) है। बयस्क व्यक्ति को तीन गोलीयाँ की एक खुराक करके दी जाए तो मलैरिया उबर जाता रहता है। बालकों को भी यह दवा दी जाती है परन्तु कम मात्रा में। यह मलैरिया का सब से नया इलाज है।

काला आजार

काला आजार रक्त रोगों का रोग है। यह मुख्यतः आसाम, मद्रास और बंगाल और ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारों पर पाया जाता है। शायद यह एक छोटी सी मक्खी (Phlebotomus) के काटने से होता है। यह मक्खी अपने साथ बहुत ही नन्हा सा परजीवी (Parasite) लिए फिरती है। इस परजीवी को लेइशमानिया डोनावानी (Leishmania donovani) कहते हैं। इस अण्डाकार परजीवी के चंप को शीशे के टुकड़े पर लगा कर सूक्ष्मदर्शक-यंत्र से जब इस का परीक्षण किया जाता है, तो इस के अनुभावपूर्ण चिह्न (Characteristic markings) दिखाई देते हैं। ये नन्हे-नन्हे परजीवी शरीर के कोशों (Cells), विशेष कर अस्थि-मज्जा, (हड्डियों के रूंद), जिगर (यकृत), तिल्ली (प्लीहा) और रक्तवाहिनीयों में भर जाते हैं।

इस रोग का आक्रमण बकायक या धीरे-धीरे होता है। आरम्भ में ही प्रायः तेज बुखार चढ़ता है और कभी-कभी इस बुखार से पहले ठंड लगती है या के छेने लगती है। यह ज्वर संकटमय तिजारी मलेरिया ज्वर के समान दो से छः सप्ताह तक रहता है, या यह बुखार लहरों के भाँति आता है और इसे घटने-बढ़ने वाला ज्वर समझा जाता है। प्रायः पहले तिल्ली बढ़ने लगती है और कुछ महीने पश्चात् जिगर भी बढ़ने लगता है। रोगी की दवा सुधारने लगती है परन्तु इस के बाद फिर तेज बुखार चढ़ने लगता है और तिल्ली और जिगर सूजने लगते हैं। अन्त में कहीं महीने तक ज्वर और बिना ज्वर की दवा के पश्चात् ज्वर कुछ कम हो जाता है और निरन्तर बना रहता है। मरीज कमजोर हो जाता है और पीला पड़ जाता है और उस का पेट फूल कर बढ़ जाता है। इस रोग का नाम काला आजार इसीलिये पड़ गया है कि रोगी की त्वचा का रंग विशेष कर पैरों, हाथों और पेट की त्वचा का काला सा हो जाता है। बाल झड़ने लगते हैं और रोगी के मसूढ़े और नाक में से खून निकलने लगता है।

ज्वर होने, पेट बढ़ जाने, दूबले होने और पीला पड़ जाने पर भी रोगी की भूख सदा बढ़ती रहती है, उस की जीभ साफ रहती है और वह अच्छी तरह काम भी कर सकता है। प्रायः यह रोग कई-कई साल तक लगा रहता है, और श्वेत रक्त-कोष बहुत घट जाते हैं इस का परिणाम यह होता है कि रोगी को श्वासनली-वायुनली प्रदाह (Broncho-Pneumonia) और मुँह में छाले जैसे संक्रामक रोग लगने की सम्भावना रहती है। इस रोग के ९० प्रतिशत रोगी अंततः से मर जाते हैं।

बच्चों में यह रोग ज्वर और जठर-आंत्र-विकार (Gastro-intestinal upset) के साथ लुप्त रूप से आरम्भ होता है। बच्चों की न केवल तिल्ली ही बढ़ जाती है, यौत्क प्रायः उस की लीसका-त्रिधि भी बढ़ जाती है।

इस रोग का एक और रूप है जो त्वचा से सम्बन्ध रखता है और इसे पूर्वीय क्षय (Oriental Sore) इस में परजीवी त्वचा की छोटी-छोटी गाँठों में, बन्दे घावों में, या शरीर के खुले भागों की श्लैष्मिक झिल्ली में होते हैं।

इस रोग का निदान रक्त, हड्डी के रूंद, जिगर या तिल्ली के छेद या त्वचा के घावों का परीक्षण करने से होती है।

चिकित्सा

इस की चिकित्सा अन्जन के पंच योजी मिश्रणों के टीकों (Injections of Pentavalent Compounds of Antimony) द्वारा की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि 'नीस्टी-बोसन' (Neestibosan) नामक बनी-बनाई आंशिक का प्रयोग हो रहा हो, तो प्रतिदिन दस या इस से अधिक सूइयों की आवश्यकता होती है और वह इस प्रकार के घोल में पच्चीस प्रतिशत यह आंशिक हो। जब तक शरीर में २.७ ४.० तक ग्राम तक आंशिक न पहुँच जाए, तब तक सूइयाँ जारी रहें। इस चिकित्सा में कँठे की सम्भावना होती है, इसलिए पहले दिन इस की खुराक ०.१ ग्राम, दूसरे दिन ०.२ ग्राम और तीसरे दिन ०.३ ग्राम होनी चाहिये। यदि रोगी को अधिक उल्टियाँ हों, सिर चकराए, चित्तभ्रम हो, ज्वर में (तापमान में) विशेष परिवर्तन हों, या टाँगों में एंठन हो, तो इस चिकित्सा को बन्द कर देना चाहिये। पूर्वीय क्षेत्र कितनी ही विधियों से ठीक किया जा सकता है क्योंकि उस की कोई निश्चित आंशिक नहीं है। कई अधिकारियों ने इस के इलाज के लिए कार्बन डाइ-ऑक्साइड स्नो (Carbon Dioxide Snow) एक्स-रेज (X-rays) जीव-देह के तन्तुओं को जलाने वाला पदार्थ (Cautery), रोग ग्रस्त भाग को काट कर अलग करना (Excision), टीके और मरहम बताए हैं। मेथिलोन ब्लू (Methylone blue) बेरालीन और लैनोलीन (Lanolin) बराबर-बराबर मात्रा में मिला कर बनाया हुआ मरहम कोई छान नहीं पहुँचाता।

इस रोग में शरीर की स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियमों पर जोर डालना चाहिये और इस के साथ मलीरिया जैसी कोई और बीमारी लग जाए तो उस का इलाज अवश्य करना चाहिये। जब काले आजार के साथ रक्ताभाव (Anæmia) हो तो उस के लिए लोहा मिश्रित किसी आंशिक का सेवन करना चाहिये और भोजन तथा विटामिन की मात्रा भी उचित होनी चाहिये।

रोग की रोक-थाम

काला आजार फैलाने वाली मक्खी (Phlebotomus) सीलन वाले गन्दे स्थानों, दरारों, सुराखों, नालियों के किनारों, कुँड़े, -करकट के ढेरों में पैदा होती है। अतः अपने आंगनों को साफ-सुथरा और दीवारों को अच्छी हालत में रखना चाहिये। अंधेरे और सीले स्थानों को प्रकाशमय बनाना चाहिये और सूखा रखना चाहिये। सफेदी और चूना भी सहायता देते हैं। कमरे में धुँआँ छीनकारक होता है और सोने वाले स्थानों पर समय-समय पर गन्धक और क्रिसोल (Cresol) की धुँनी देनी चाहिये। इस मक्खी के पैदा होने के सभी स्थानों पर मिट्टी का तेल पानी में मिला कर (Kylpest) छिड़कना चाहिये। डी. डी. टी. से भी निरसन्देह यह काम हो सकता है।

मकानों के पास पाँधे नहीं उगाने चाहिये और दीवारों पर बेलें नहीं चढ़ानी चाहिये। कुछ जानवर छूत के रोगों का प्रभव होते हैं, अतः बत्तखें, मुँहियाँ, गायों और सुअरों को सोने वाले स्थान के नीचे या पास नहीं रखना चाहिये। कुत्ते भी यह रोग फैलाते हैं। रोगों वाले मकान और स्थानों में नहीं जाना चाहिये। ३०० गज की दूरी वाले घरों पर इन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

जिन इलाकों में ये बीमारियाँ फैली हुई हैं वहाँ पर रात को बड़ी मझीन जाली की मच्छरदानी लगा कर सोना चाहिये। बिजली के पंखे जैसी हवा की जोर की गति इस सूक्ष्म मक्खी को दूर रख सकती है। मकानों की ऊपर की मंजिलें सोने के स्थानों के लिये उपयुक्त होती हैं। त्वचा पर तेज मरहमों के लगाने से भी लाभ होता है। अच्छे मरहम में ओलियम एनिसी (Oleum Anisi) यूकैलिप्टी (Eucalypti) और टेरैबिन्थ (Terebinth) मिला हुआ होता है। हर एक की मात्रा ३ ग्राम (minims) और लैनोंलिन (Lanolin) एक अऊंस होता है।

फीलिपांव (Elephantiasis or Filariasis)

शरीर के विभिन्न भागों की दृढ़, रबड़ के किस्म की और धीरे-धीरे बढ़ने वाली सूजन का नाम फीलपांव या फीलपाया है। इस रोग को दो प्रकार के परजीवी उत्पन्न करते हैं। अपरिपक्व परजीवी को भिन्न-भिन्न प्रकार के मच्छर मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट कर देते हैं इस रोग में बहुधा टांगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। शरीर के अन्य प्रभावित होने वाले अवयव, पैर, बांहें, अंडकोष, स्तन और योनि-कण्ठ हैं।

फीलपाए की पूरी तथा वास्तविक चिकित्सा के लिये कोई व्यक्ति अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है।



हीनान्न रोग

(Food Deficiency Diseases)

बेरीबेरी (Beri-beri)

कुछ समय पहले तब यह रोग एशिया के बहुत से भागों में बहुत अधिक पाया जाता था। इस रोग के लक्षण विभिन्न दशाओं में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। इस रोग के कुछ रोगियों के हाथ और बांहें आंशिक रूप से पक्षाघात-ग्रस्त हो जाते हैं और उन की त्वचा विशेषकर पिंडीलों के ऊपर, पैरों के पीछे और उंगलियों के सिरों पर सुन्न पड़ जाती है। रोगी की टांगें पतली हो जाती हैं और यदि उस की पिंडली को दबा दिया जाए तो वह दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। टांगों के आंशिक रूप से पक्षाघात-ग्रस्त हो जाने पर रोगी कुछ लंगड़ा कर चलता है और उस का सांस बहुत जल्दी चल जाता है। हृदय कभी-कभी बहुत जोर से धड़कने लगता है। उसका स्वर बहुत धीमा हो जाता है और कभी-कभी तो सुनाई ही नहीं पड़ता।

बेरीबेरी के दूसरे रोगियों की बांहें और टांगें बुरी तरह फूल जाती हैं। उन्हें सांस लेते समय बहुत कठिनाई होती है। इन का हृदय बहुत जोर-जोर से धड़कता है। यदि उन की पिंडली दबाई जाए तो वे दर्द से कराहने लगेंगे। इन दशाओं में ज्वर बिल्कुल नहीं होता। जीभ विशेषकर किनारों पर लाल-लाल चमकने लगती है।

बेरीबेरी में सारे शरीर की चेताएं सूज जाती हैं और इस कारण चेताओं द्वारा नियंत्रित पेशियों आंशिक रूप से या पूर्णतया अक्रिया हो जाती हैं। इस सूजन का प्रभाव शरीर के विभिन्न भागों में पीड़ा होने से स्पर्श-इन्द्रिय द्वारा प्रगट होता है। रक्त-वाहीनियों पर नियंत्रण रखने वाली कुछ चेताएं भी इस सूजन के प्रभाव को प्रकट करती हैं और वह इस प्रकार कि रक्त-वाहीनियों में से रक्त निकलने लगता है। इस से टांगें, बांहें और धड़ में सूजन चढ़ जाती है।

बेरीबेरी के कारण

बेरीबेरी प्रायः उन्हीं लोगों को होता है जो सफेद चावल को अपने भोजन का मुख्य पदार्थ बना लेते हैं। रसायन-विज्ञाताओं ने इन चावलों का परीक्षण कर के यह पता

लगाया है कि चावल के बाहर का भाग भीतर जैसा नहीं होता। चावल को साफ कर के चिकनाया जाता है तो उस के बाहर की तह उतर जाती है। यह ऊपर का भाग चावल का छिलका नहीं होता। धान से छिलका उतारने के पश्चात् चावल पर लाल से रंग की तह जमी रहती है। इस लाल रंग की तह में बहुत से ऐसे सार हैं जिन्हें विटामिन कहते हैं, विशेषकर विटामिन 'बी', और शरीर को उचित पोषक पदार्थ देने के लिए ये आवश्यक हैं। यदि चावल को साफ कर दिया जाए तो यह लाल तह उतर जाती है। जो विटामिन इस लाल तह में पाए जाते हैं वही दूसरे खाद्य पदार्थों—विशेषकर सेम में भी मिलते हैं। अतः जो लोग साफ किये हुए चावलों के साथ सेम या दूसरी सांझियां तथा मछली भी खाते हैं उन्हें बेरीबेरी नहीं होता।

बच्चों को भी बेरीबेरी का रोग लग जाता है और एक साल से कम उम्र के बच्चों की जो मांते होती हैं वे इसी रोग के कारण होती हैं। यह सच है कि छोटे बच्चे चावल नहीं खाते, परन्तु उन की माताएं तो खाती हैं। जब उन की माताएं अधिक मात्रा में साफ किया हुआ चावल खाती हैं तो उन के दूध में विटामिन 'बी' कम होता जाता है, यह विटामिन चावल की ऊपर की तह में होता है और इस की आवश्यकता शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पड़ती है। इस कारण केवल मां के दूध पर निर्भर रहने वाले बच्चे बेरीबेरी के शिकार बन जाते हैं।

बच्चों में बेरीबेरी के लक्षण निम्नीलिखित होते हैं: जिन बच्चों को बेरीबेरी रोग होता है वे केवल मां के दूध पर निर्भर रहने वाले होते हैं और जब वे दो महीने के हो जाते हैं, तब उन्हें यह रोग लगता है। बच्चा रोगी नहीं दिखाई देता क्योंकि उस का मुंह भरा हुआ होता है और वह बड़ी प्रसन्नता से दूध पीता है और यह स्वस्थ और निरोग बच्चों की भांति मुस्कराता और खेलता है। परन्तु उस के मुंह और नाक पर कुछ नीलापन सा दिखाई देता है, वह बेचैन सा रहता है, उसे नींद नहीं आती और उस का रोना धीमा पड़ता जाता है। कुछ दशाओं में बच्चा यकायक रोने लगता है; रोना बढ़ता जाता है यहां तक कि उस का शरीर एंटेने लगता है और कुछ ही घंटे में उस की मृत्यु हो जाती है। बेरीबेरी से पीड़ित बच्चों को कठिनाई से सांस लेने का रोग (dyspnoea) हो जाता है। बच्चा कराहता है, उस का चेहरा नीला पड़ जाता है और सांस और नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। ज्वर नहीं होता। यदि इस की पृष्ठता की जाए तो पता चलेगा कि बच्चों की मां केवल चावलों पर ही निर्भर रहती है।

बेरीबेरी को रोकने की विधि

जो कुछ ऊपर कहा गया है उस से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेरीबेरी को किस प्रकार रोका जा सकता है। इस का सब से आसान तरीका यह है कि बिना पोलिश किया चावल ही खाना चाहिये। यह भीषण बीमारी बिना कुछ खर्च किये ही रोकी जा सकती है। बिना पोलिश किया हुआ चावल भी खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है जितना पोलिश किया हुआ चावल। यदि चावल पर से लाल तह साफ करने की प्रथा प्रचलित न हो गई होती, तो बेरीबेरी न तो वर्षों में जितनी प्राणघातक सिद्ध हुई, न होती।

जो बरीबरी का कारण जानते हैं उन्हें दूसरे लोगों को पालिश किए हुए चावल का प्रयोग करने का खतरा बताना आवश्यक है। बिना पालिश किया हुआ चावल सफेद चावल से अधिक गुणकारी होता है; अतः सब को बिना पालिश किया हुआ चावल खा कर दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। चावल और मछली पर इतना अधिक निर्भर न रह कर दाल या दूसरी तकारियों को भोजन का प्रमुख भाग बना लेने का महत्व भी सब को जान लेना चाहिये।

चिकित्सा

बरीबरी की चिकित्सा मुख्यतः भोजन पर निर्भर होती है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हीनान्न (भोजन में आवश्यक तत्वों की कमी) को दूर करना हमारा पहला काम है। बिना पालिश किये हुये चावलों का प्रयोग ही करना चाहिये और प्रमुख भोजन के साथ सब्जियाँ, फल, दाल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इन चीजों को या तो अलग-अलग बनाना चाहिये या मिला-जुला कर जैसा चाहें बनाएं।

पौष्टिक पदार्थों के उचित सेवन के साथ-साथ विटामिन 'बी' अधिक मात्रा में खानी चाहिये। वह ब्रवर्स ईस्ट गोलीयों (Brewer's Yeast Tablets) के रूप में दिया जा सकता है, चार गोलीयाँ दिन में तीन बार दोजिये या विटामिन बी कम्पलैक्स का कोई ब्रांड दोजिये।

विटामिन कहां मिलते हैं

भोजन की जानकारी रखने वाले एक योग्य मनुष्य ने जबले पृष्ठ वाली तालिका तैयार की है जिस में x साधारण भोजन में किसी विशेष विटामिन की उपस्थिति प्रगट करता है, xx उस से अच्छे और xxx सर्वोत्तम के लिये हैं। अस्थिरता (variability) v द्वारा प्रगट की गई है और जहां सन्देह है वहां ? चिन्ह लगा है। यह ध्यान रखिये कि विटामिन ए, बी, और सी सामान्य होते हैं और विटामिन डी कुछ घांटे से भोजनों में होता है।

खाद्यपदार्थ	विटामिन	ए	बी	सी	डी
संब	---	X	X से XXX तक	XX	---
एसपरैगस	---	V	XXX	---	---
केला	---	XXX	XX से XX तक	XX	---
सोम (सुखाई हुई, या हड्डों में बन्द)	---	X	XX	---	---
चुकन्दर	---	---	X	X	---
रोटी मँदे की	---	?	X	---	X
रोटी (मोटे आटे की)	---	X	XX	?	X
मक्कन	---	XXX	---	---	X
मटठा	---	X	XX	XV	---
गोभी (कच्ची)	---	XX	XXX	XXX	---
गाजर (कच्ची)	---	XXX	XX	XX	---
पनीर (दूध की)	---	XX से XXX तक	---	---	---
मछली का तेल	---	XXX	---	---	XXX
मक्का (पीली)	---	XX	XX	XV	---
मलाई	---	XXX	XX	---	X
अंडे	---	XXX	X	?	---
मछली	---	XX	X	XX	---
नीबू का रस	---	---	XX	XXX	X
सलाद	---	X से XX तक	XX	X	X
कलंजी	---	XX से XXX तक	XX	XXV	XX
दूध (कच्चा)	---	XXX	XX	XV	X
दूध (जमाया हुआ)	---	XXX	XX	---	---
बकरी का मांस	---	X	XX	---	---
जई का आटा	---	X	XX	XXX	---
संतरे का रस	---	XX	XX	XX	---
आड़ू (कच्चा)	---	X से XX तक	XX	XXX	X
मटर (ताजी)	---	XX	XX	XXX	---
अन्नानास (कच्चा या हड्डों का)	---	XX	XX	XX	---
आलू	---	X	XX	XX	---
शकरकण्डी	---	XX	XX	XXX	---
पालक	---	XXX	XX	XXX	---
स्ट्राबेरी	---	X	X	XXX	---
टमाटर	---	XX	XX	---	---
अखरोट	---	X	XX	---	---
खमीर	---	---	XXX	---	---

पशुओं द्वारा फैलने वाले रोग

अनेक प्रकार के परजीवी ऐसे होते हैं जो मनुष्य के शरीर के अन्दर रह सकते हैं कुछ तो बहुत हानि पहुँचाते हैं और कुछ बहुत कम । इस अध्याय में केवल सामान्य पर-जीवियों का वर्णन किया जाएगा ।

केंचुए (Round Worms)

केंचुओं के शरीर मोल होते हैं परन्तु किनारों पर नुकीले होते हैं । वे चार से छः इंच तक लम्बे होते हैं । यद्यपि वे प्रायः छोटी आंतों में ही रहते हैं परन्तु फिर भी वे पेट में घुस सकते हैं; कभी-कभी वे रेंग कर गले तक आ जाते हैं । वे श्वास नालिका तक पहुँच कर बच्चे का दम घोट सकते हैं । यदि बच्चे की आंतों में बहुत थोड़े केंचुए हों तो लक्षण प्रगट नहीं होते । बच्चे की आंतों में केंचुए होने के प्रायः साधारण लक्षण ये होते हैं कि उस की भूख मर जाती है और कभी-कभी जी मिचलाने लगता है । कभी-कभी बच्चा पेट में दर्द होने की शिकायत भी कर सकता है । नाक मसलना और दाँत पीसना भी बच्चे के अन्दर केंचुए होने की सम्भावना प्रकट करता है । बच्चे की टट्टी का सूक्ष्मदर्शक-यंत्र से परीक्षण कर के हाँकटर निश्चयपूर्वक कह सकता है कि उस की आंतों में केंचुए हैं या नहीं ।

चिकित्सा

हेट्राजन (Hetrazan) नामक औषधि मिल सके तो आंतों के परजीवियों को मारने के लिए इस का प्रयोग बख़ूब किया जा सकता है । दवा के साथ इस के प्रयोग के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं दी हुई होती हैं ।

छोटे बच्चे की इस रोगकी चिकित्सा करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि दोपहर में उसे एक खुराक एससम साल्ट दिया जाए और उसी शाम को आधा ग्रैन सैन्टोनिन (Santonin) । सैन्टोनिन में थोड़ी सी चीनी मिला दी जाए जिस से बच्चा उसे खाने को तैयार हो जाए । अगले दिन प्रातःकाल उसे आधा ग्रैन और दोपहर में फिर आधा ग्रैन सैन्टोनिन दीजिये । सैन्टोनिन की आखरी खुराक के दो घंटे बाद एक और खुराक एसस-साल्ट की दीजिये । इन दो दिनों में जब बच्चे को दवा दी जा रही हो, बच्चे को किसी प्रकार की सख्खी न खाने दीजिये, बालक उसे केवल चाबलों के माँड और अंडों पर ही रोखिये; इस आहार में भवखन, घी या किसी भी प्रकार का तेल न हो । जब तक उस के आहार को सीमित नहीं किया जाएगा तब तक सैन्टोनिन आंतों के सब केंचुओं को नहीं मार सकेगी ।

जिन क्षेत्रों में बच्चों की आंतों में केंचुए होने की बार-बार शिकायत रहती हो,

वह यह आवश्यक होता है कि प्रतिवर्ष प्रत्येक बच्चों की जांच करवाली जाए। यद्योप दूध न हो और जी न भी मतलाए फिर भी आंतों में दो या तीन केंचुए रहते हैं जो भोजन को पचाने और उस के अभिशोषण (absorption) में बाधक होते हैं, और इस प्रकार बच्चों के स्वास्थ्य और उम्र के विकास को रोकते हैं।

सन्टीनिन बिषैली दवा है, इसीलिए उस की बड़ी खुराकें नहीं देनी चाहियें। सन्टीनिन खाने से बच्चों का मूत्र पीले रंग का होना और उसे सब कुछ पीला ही दिखाई देगा, परन्तु यह पीला मूत्र और पीला दिखाई देना हानिकारक नहीं, क्योंकि ये दोनों बातें झीघ, ही जाती रहती हैं।

केंचुओं की रोक-थाम

जैसा कि कुछ लोगों का विचार है ये केंचुए बच्चों की आंतों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होते। इन केंचुओं के अंडे भोजन और पानी के साथ बच्चों के शरीर के अन्दर जाते हैं। आंतों के कृमि असंख्य अंडे देते हैं जो मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये अंडे अंत में मल के साथ भूमि में तालाबों और नदियों में और बगीचों की सब्जियों में बिखर जाते हैं।

इन कृमियों से बचने के लिए पानी उबाल कर पीना बहुत आवश्यक है। बाजार से खरीदी हुई सब सब्जियों को खाने से पूर्व पका लेना चाहिये। फलों को गरम पानी से धोकर और छील कर खाना चाहिये। बच्चों को उंगलियां मुंह में न डालने दीजिये क्योंकि उन के मूँद हाथों में केंचुओं के अंडे और कितने ही रोग-कृमि हो सकते हैं। प्रायः उन सब वस्तुओं में जिन को बच्चा मुंह में डालता है, केंचुओं के अंडे हो सकते हैं।

आंतों के कुछ कृमि कृतां और बिल्लियों की आंतों में भी पाए जाते हैं। जब बिल्ली या कृता बच्चों का हाथ चाटता है तो कृमियों के अंडे उस के हाथों में आ जाते हैं। यदि उस समय बच्चा अपनी उंगलियां मुंह में डाले या उन्हीं हाथों से खाना खाए, तो कृमियों के अंडे उस के मुंह में चले जाते हैं। कुत्ते-बिल्ली को घर में नहीं रखना चाहिये और उन्हें बच्चों के हाथ या मुंह को कभी चाटने नहीं देने चाहिये।

अंकुश-कृमि रोग (Hookworm Disease)


बहुत सी बीस्तियों में प्रत्येक दस व्यक्तियों में से नौ को यह रोग लग जाता है। यह बहुत आम और आसानी से रोक जा सकने वाला रोग है। एक समय था कि कुछ क्षेत्रों के लोगों को सुस्त और निकम्मा समझा जाता था, परन्तु बाद में यह पता चला कि वे अंकुश-कृमि के रोग के कारण ही दुर्बल हो गए थे और काम-काज नहीं कर सकते थे। जब इस रोग की चिकित्सा और इसे आगे फैलने से रोकने के उपचार किए गए, तो जिन को पहले सुस्त और उत्साह-हीन समझा जाता था, वे ही परिश्रमी और उद्योगी हो गए।

अंकुश-कृमि एक छोटा गोल सफेद कीड़ा होता है जिस की लम्बाई $1/3$ इंच से लेकर $1/2$ इंच तक होती है, और यह साधारणतया सीने के धागे जितना पतला होता है। यदि सफेद धागे के आधे इंच लम्बे टुकड़े काटे जाएं, तो प्रत्येक टुकड़े में अंकुश-कृमि सा लगेगा। ये छोटे-छोटे कीड़े बच्चों और बड़ों के शरीर में घुस जाते हैं। कभी-कभी

ये संख्या में बहुत कम होते हैं, केवल दस या बीस, परन्तु एक ही समय में ये आंतों में हजारों की संख्या में हो सकते हैं। ये आंतों की भीतरी परत में चिपक जाते हैं और रोगी का खून चूसते हैं। ये घाब भी कर देते हैं जिस से रक्त रिसता रहता है। निरन्तर रक्त के कम होने और इन कीड़ों के विष पैदा करने के कारण आदमी और पीला पड़ जाता है। उस की शारीरिक शक्ति इतनी कम हो जाती है कि दूसरे रोग विशेषतः क्षय-रोग आसानी से लग जाते हैं। इस रोग से पीड़ित बच्चे पीले पड़ जाते हैं और कद में छोटे रह जाते हैं। उन की शारीरिक और मानसिक वृद्धि कम हो जाती है। शारीरिक विकास इतना अधिक रुक जाता है कि १८ या २० वर्ष का युवक दस या बारह साल का बच्चा लगता है। यदि बच्चों में ये कीड़े अधिक संख्या में प्रवेश कर जाएं, तो वह अपनी पढ़ाई-लिखाई में बहुत पीछे रहेगा।

अंकुश-कृमि रोग के निश्चित लक्षण

त्वचा का पीला पड़ जाना, सुस्ती जाना, पेट के विभिन्न भागों में कभी-कभी पीड़ा होना और मानसिक आलस्य, भिट्टी या चूना खाने की आदत, कुछ ऐसे साधारण से



आंत्र-परजीवी

१. केंचुए २. अंकुश-कृमि ३. अंकुश-कृमि का तिर ४. सूत्र-कृमि ५. एक प्रकार के लम्बे पतले कृमि (Whipworms) ६. एक प्रकार के कीटाणु (Flukes)

लक्षण हैं जिन से यह पता चल जाता है कि बच्चे या वयस्क व्यक्ति को अंकुश-कृमि का रोग है या नहीं।

मल को सूक्ष्मदर्शक-यंत्र से देख कर डॉक्टर निश्चय रूप से कह सकता है कि किसी व्यक्ति को यह रोग है या नहीं ?

पैरों के तलुओं और उंगलियों के बीच में खूजली होना भी एक ऐसा लक्षण है जिस से पता चल जाता है कि ये कृमि पैरों की त्वचा में छेद कर शरीर में प्रवेश कर रहे हैं।

अंकुश-कृमि का रोग कैसे फैलता है और उसे कैसे रोका जा सकता है

अंकुश-कृमि आंतों में असंख्य अंडे देते हैं, ये मल के साथ बाहर निकल जाते हैं और जहाँ मल फेंका जाता है वहीं फैल जाते हैं। ये अंडे बिकसित होते हैं और दस दिन के भीतर-भीतर छंटे-छंटे कीड़े बन जाते हैं। जहाँ-जहाँ मल फेंका जाता है, वहीं-वहीं मिट्टी में ये कीड़े होते हैं। ये सींजियों और पानी में भी पाए जा सकते हैं; परन्तु बहुधा यह रोग उन्हीं लोगों को लगता है जो नंगे-पांव चलते-फिरते हैं। जमीन पर बिखरे हुए ये अंकुश-कृमि पैरों पर और सम्भवतः हाथों और नितम्बों की नंगी त्वचा पर भी चढ़ जाते हैं और त्वचा को छेद देते हैं। त्वचा से अन्दर पहुँच कर वे अन्त में आंतों तक पहुँच जाते हैं जहाँ वे आंतों की भीतरी परत को काटने और रक्त चूसने लगते हैं।

बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक बात यह है कि मल को मिट्टी पर न फेंका जाए। इस के लिए उचित टोट्टियाँ बनाने और उन के उचित प्रयोग की आवश्यकता है। जिन लोगों को यह रोग लगा हो, यदि वे मल-त्याग के लिए पृथ्वी पर न बैठ कर उचित टोट्टियों का प्रयोग करें, तो इस रोग को पूर्णतया मिटाया जा सकता है। परन्तु जब तक लोग पृथ्वी पर ही मल-त्याग करते रहेंगे या ऐसी टोट्टियों का प्रयोग करते रहेंगे जहाँ से वर्षा के पानी द्वारा मल चारों ओर फैल सकता है और जब तक उस सूअर, मुर्गियाँ या मक्खनियाँ घरों में ले जाते रहेंगे, तब तक यह रोग अपना परकोप जारी रखेगा।

टोट्टियों में टक्कनदार बाल्टियाँ होनी चाहिये। इन बाल्टियों को प्रतिदिन खाली करना चाहिये। इस मल को बगीचा में नहीं फैलाना चाहिये, बल्कि जमीन के अन्दर गाढ़ देना चाहिये। यदि ऐसी टोट्टी बनवाना असम्भव हो जिस में जाली लगी हो और मक्खियाँ अन्दर न घुस सकें, तो दूसरा उपाय है कि भूमि में एकगड़्ढा खोद लीजिये। लकड़ी का एक बड़ा सा बक्स लीजिये। (इस बक्स में कोई ऐसी द्रार न हो कि मक्खियाँ अन्दर घुस जाएँ)। इस बक्स के पोंदे में छेद कर लीजिये—छेद जरा अच्छा बड़ा हो—और बक्स का टक्कन अलग कर के इसे उल्टा भूमि में खुदे गड़्ढे पर रख दीजिये। बक्स के निचले किनारों पर, चारों ओर, मिट्टी थोप दीजिये। जब इस बक्स का प्रयोग न हो, तो उस के छेद पर तरत का एक टुकड़ा रख दिया जाए जो उसे पूरी-पूरी तरह ढाँक ले। कुछ समय के बाद बक्स को हटा कर भूमि वाले गड़्ढे में मिट्टी भर दी जाए। इस प्रकार के प्रबन्ध से मक्खियाँ मल तक न पहुँच सकेंगी और मल पृथ्वी पर इधर-उधर नहीं पड़ा रहेगा।

अंकुश-कृमि मिट्टी में छः महीने या इस से अधिक समय तक रह सकते हैं। अतः उस बगीचे या खेत में साल भर तक नंगे पांव जाना खतरनाक है जहाँ फैला हुआ मल हो।

अतः अंकुश-कृमि के रोग से दूर रहने के लिये नंगे पांव नहीं घुमना चाहिये, हाथों को बिना किसी चीज से ढके बगीचे या खेत में खुदाई का काम नहीं करना चाहिये और कभी बिना खांला हुआ पानी नहीं पीना चाहिये या कच्ची सब्जियों को खांलते पानी से धोए बिना कभी नहीं खाना चाहिये।

यह भी सम्भव है कि जो बच्चे नंगे फिरते हैं या जिन के चूतड़ नंगे रहते हैं, उन्हें भीम पर बैठने से ही अंकुश-कृमि का रोग लग जाए।

चिकित्सा

अंकुश-कृमि की चिकित्सा का निम्न नुसखा कलकत्ता के ट्रापिकल स्कूल ऑफ़ मीडीसिन के दो डॉक्टरों—डॉ. पी. ए. मेंपलस्टन और डॉ. ए. के. मुक्जी—द्वारा लिखित "हेल्थ बिलीटन" नं. १ से उद्धृत किया गया है।

टेट्राक्लोरोथिलीन (Tetrachlorethylene) नामक आंशिक द्रव व्यक्तिओं, छोटे बच्चों और उन स्थियों को भी बे खटके दी जा सकती है जिन का प्रसव निकट हो।

दवा देने का तरीका सरल है। वयस्क व्यक्ति के लिए ४ सीसी और बालकों को यथाअवस्था छोटी मात्रा में देनी चाहिए। इस की मात्रा एपसम-साल्ट की एक मात्रा (४-८ ग्राम चाय का चम्मच भर) में खूब हिलाकर मिला लेनी चाहिए। इसे चिनोपोडियम (chinopodium) के तेल की दस बूंद मिला कर एक ही घंटे में निगल लेना चाहिये। शायद रोगी सिर चक्करने की शिकायत करे। यदि साल्ट ने अपना गुण दिखाया तो दो तीन घंटे में पेट में गड़बड़ होगी, फिर यदि थोड़ी-बहुत बेचनी हुई, तो जाती रहेगी। कुछ रोगी जी मिचलाने की शिकायत अवश्य करने पर थोड़ी देर के लिए। दवा देने से एक दिन पहले भोजन पर कोई प्रतिबंध आवश्यक नहीं। सबरे-सबरे दवा खाली पेट पर देना अच्छा है और जब अच्छी तरह पेट साफ न हो जाए भोजन न दिया जाए। यदि आवश्यकता हो घंटे के बाद साल्ट की एक खुराक फिर दी जाए।

यह खुराक हृदय, गुर्दा या जिगर को कोई हानि नहीं पहुंचाती, और रोगी तीसरे पहर फिर अपना काम-काज करने योग्य हो जाता है।

यदि रोग की स्थिति अधिक गम्भीर न हो तो एक बार की दवा ही काफी होती है। तीनक गम्भीर स्थिति में दस-दस दिन के बाद दो-तीन बार दवा देना जरूरी हो जाता है। बहुत ही गम्भीर अवस्था हो जाए, तो चार बार और बहुत कम परीस्थितियों में पांच बार यह दवा देनी चाहिये।

क्रिस्टॉइड्स (Crystoids) नाम की कुछ टीकियां हैं, इन्हें सरलतापूर्वक खाया जा सकता है। एक पैकेट में पांच 'कप्सुल्स' या टीकियां होती हैं। इन के प्रयोग आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं भी इन के साथ पैकेट में रहती हैं।

जिन क्षेत्रों में अंकुश-कृमि-रोग का जोर हो, वहाँ हर छठे महीने यह इलाज किया जाए।

सूत्र-कृमि (Thread worms)

धाने जैसे छोटے कीड़े, खेत रंग के और $1/3$ इंच लम्बे होते हैं। प्रायः वे आंतों के निचले भाग में पाए जाते हैं जहाँ वे गुदा के मुँह और उस के चारों ओर खुजली और जलन पैदा करते हैं। ये कीड़े, मल के साथ-साथ बाहर निकल जाते हैं। आंत से निकल कर कपड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। छोटी-छोटी लड़कियों के अन्दर ये यौनि में घुस जाते हैं जहाँ खुजली होने लगती है और पानी भी निकलने लगता है। ये कीड़े, प्रायः कमजोर और गन्दे बच्चों में पाए जाते हैं।

थीकित्सा

इन कीड़ों से छुटकारा पाने के लिये यह इलाज किया जाए।

जेनीशियन वायलेट (Gentian Violet—enteric coated capsules)।

बालकों के लिए: $1/6$ ग्रेन भोजन के साथ, दिन में तीन बार, आठ दिन तक। एक हफ्ता रुक कर फिर यह आँधी आरम्भ की जाए।

वयस्क के लिए: आध-आध ग्राम, या ०.३ ग्राम की दो-दो टिकियाँ, खाने के साथ, आठ दिन तक। एक हफ्ता रुक कर फिर यह आँधी आरम्भ की जायें।

खुजली बन्द करने के लिये गुदा के मुँह पर दो चाय के चम्मच या बेसलीन में पाँच बूँदें कार्बोलीक एसिड मिला कर बनाया हुआ मरहम लगाइयें।


यदि बच्चा गुदा के भाग को खूजाता या मलता हो तो उस की उँगलियों के नाखूनों के भीतर इन कीड़ों के अंडे घुस जाएंगे। इस कारण इस रोग से पीड़ित बच्चों के हाथों को बार-बार साफ करना आवश्यक है नाखूनों को बार-बार काट कर छोटा रखना चाहिये। बच्चों के चूतड़ों को प्रतिदिन साफ करना चाहिये। इन उपायों का अवश्य प्रयोग करना चाहिये जिस से बच्चों को यह रोग बार-बार लगने का भय न रहे।

सूत्र-कृमियों के इलाज की नवीनतम आँधी पिपिजन (Pipizan) है।

फीता-कृमि (Tapeworms)

फीता-कृमि लम्बे और पतले कीड़े, होते हैं जो दस से बीस फुट तक लम्बे होते हैं। ये बहुधा कृते बिल्लियों के पास रखने से या सूअर और गाय का दागी मांस खाने से शरीर में पहुँच जाते हैं। गाय और सूअर का दागी मांस इस प्रकार का होता है कि उस में सफेद दाग होते हैं और ये सफेद दाग ही नन्हें फीता-कृमि होते हैं। यदि कोई इस मांस को अच्छी तरह उबाले या पकाए बिना खाए तो छोटे-छोटे कीड़े, आंतों में घुस जाते हैं और वहीं बहुत लम्बे बन जाते हैं।

कोई ऐसे निश्चित लक्षण इस रोग के नहीं हैं जिन से इस का पता चल सके, और यदि लक्षण हैं भी तो वे अजीर्णता और मरोड़ों की पीड़ाएँ हैं। रोगी पीला पड़ जाता है, उस का सिर दुखने लगता है और वह सिर चकराने की शिकायत करने लगता है। परन्तु एक निश्चय लक्षण यह है कि रोगी के मल में इस कृमि के छोटे-छोटे जोड़, दिखाई देने लगते हैं।




बाईं ओर: गाय के मांस वाले फीता-कृमि का सिर; बीच में: फीता-कृमि का थड़, दाहिनी ओर: सूअर के मांस वाले फीता-कृमि का सिर

चिकित्सा

चिकित्सा का एक उद्देश्य यह है कि कीड़े के सिर को निकाल दिया जाए, क्योंकि जब तक कीड़े का सिर नहीं निकाला जाएगा तब तक कीड़ा बढ़ता ही जाएगा। चिकित्सा इस ढंग से की जा सकती है:—

चिकित्सा करने के दो दिन पहले किसी प्रकार का ठोस भोजन नहीं करना चाहिये। केवल चावल की लपसी, अन्नक रूप से उबले हुए अंडे और औरवा देना चाहिये। रोगी को चारपाई पर लिटा दीजिये और उसे कुछ दिन तक इसी अवस्था में रहने दीजिये। पहले दिन प्रातःकाल ही उसे अरंडी के तेल (Castor Oil) की एक खुराक दीजिये और दिन भर उसे कोई भोजन न दीजिये। पांच साल के बच्चे को अगले दिन आधा ड्राम या ३० बूंद ओलिवोरीसिन आफ मेल फर्न (Oleoresin of male fern) दीजिये। इस का स्वाद बहुत बुरा होता है पीच के साथ मिला दिया जाए। दो या तीन घंटों के अन्तरात् उसे फर्न का आधा ड्राम और दीजिये। इस समय रोगी को चुपचाप चारपाई पर लिटा रहना चाहिये। मेल फर्न की दूसरी खुराक खाने के चार पांच घंटों पश्चात् उसे अरंडी के तेल की बड़ी सी खुराक देनी चाहिये। जब बच्चे को छट्टी आए तो गरम पानी के साफ मथुरे धरतन में उसे लेना चाहिये जिस से ध्यान से देखा जा सके कि कीड़े का सिर निकल चुके हैं या नहीं।

फीता-कृमि के रोग को फैलने से इस प्रकार से रोका जा सकता है कि रोगी के मल का निम्नक्रमण किया जाए या सारे मल को गाड़ दिया जाए और जिस मांस का प्रयोग भोजन के लिये हो उसे अच्छी तरह पकाया जाए। कुत्ते और बिल्लियों की आंतों में फीता-कृमि होते हैं अतः उन को घर में पालना नहीं चाहिये और उन को कदापि बच्चों के हाथों या मुख को चाटने नहीं देना चाहिये।



ट्रिचिना (Trichina) प्रायः सूअर के मांस में होते हैं, परन्तु जब आदमी दूषित मांस खाता है तो उस के शरीर के परजीवी बन जाते हैं ।

ट्रिचिना (The Trichina)

यह एक ऐसा कीड़ा होता है जो सूअर का मांस खाने से पैदा होता है । ये कीड़े आंतों में तो नहीं रहते परन्तु मांस पोषियों में घुस कर पीड़ा पहुँचाते हैं, जिस से थोड़ा ज्वर भी आ सकता है । शरीर के विभिन्न भागों की पोषियों में पीड़ा होने लगती है । अंगों को हिलाने-डुलाने से पीड़ा तीक्ष्ण हो जाती है, परन्तु जोड़ों में दर्द नहीं होता । पेड़ी दवाने से दूर करने लगती है और आँखों के नीचे सूजन भी आ जाती है, और रोगी का साँस फूलने लगता है ।


इस कीड़े की चिकित्सा ऐसी नहीं जो बहुत लाभकारी हो । अरंडी का तेल और अनिमा प्रतिदिन रोगी को दीजिये, जिस से वह अपनी आंतों के कीड़ों से छुटकारा पा जाए । सारे शरीर की पोषियों में जो कीड़े होते हैं उन को निकलने के लिये कुछ भी नहीं किया जा सकता । इस रोग से छुटकारा पाने का आवश्यक उपाय यही है कि सूअर का मांस न खाया जाए ।

नाक और गले के रोग

गलसूए (Tonsils) और गल-ग्रंथियां या गदूद (Adenoids)

नाक का बहना, नाक का सूज जाना, छींकना, मुंह और नाक का दुखना, आंखों का लाल होना, पढ़ने में चित्त न लगना, सोते समय खरोंटे लेना, मुंह खोल कर सोना, हाथों को कानों पर रखना मानों कान दुखते हों, मुंह खोल कर घूरना— ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मुंह से सांस लेने वालों में पाए जाते हैं। बढ़ा हुआ मुंह से सांस लेने का कारण गल-ग्रंथियों या गलसूओं का बढ जाना होता है। जिन बच्चों को पीछे भोजन नहीं मिलता और जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने स्थानों में रहते हैं, उन की गल-ग्रंथियां बढने की अधिक सम्भावना रहती है।

गल-ग्रंथियां गले के पिछले भाग से निकलती हैं जहाँ नाक और गला मिलते हैं। उन का आकार गोभी के छंदे से फूल के समान होता है और उस का रंग लाल होता है। वे बहुत कुछ हाथ के मस्सों के समान होते हैं। वे नाक के पिछले भाग से नीचे की तरफ होते हैं और नाक बन्द कर देते हैं जिस से बच्चा मुंह से सांस लेने लगता है जब




१. गलग्रंथियां २. गलसूए पर चकत्ता

मुँह से सांस लिया जाता है तो नाक से सांस लेने की अपेक्षा अधिक धूल और बहल से कीटाणु अन्दर चलते जाते हैं।

बच्चों का मुँह खुलवा कर चम्मच से उस की जीभ नीचे की ओर दबाइये और देखिये कि कहीं गलसूए गले की ओर बढे, हुए तो नहीं हैं। जब गलसूए रोग-युक्त नहीं होते तब वे गले की ओर बढे, हुए नहीं होते हैं और उन का रंग भी गले के दूसरे भागों की भाँति गुलाबी होता है। बढे, हुए गलसूए का रंग गहरा लाल होता है या उस पर सफेद चकले से रहते हैं या कभी-कभी उस में पीली पीप भरी रहती है। यदि गलसूए अचानक बढ, जाएँ तो बच्चों का गला दुखने लगता है और उसे ज्वर और सिर दर्द होने लगता है। खाना खाते या कुछ पीते समय गले का दर्द और भी बढ, जाता है।

बच्चों की परीक्षा कर के देखिये कि कहीं उस की नदरों में और कानों के पिछले भाग में त्वचा के नीचे कोई गिलटी तो नहीं है। ये बढी हुई ग्रंथियाँ होती हैं। इन का मतलब यह होता है कि नाक, गले, कानों या दाँतों में विष या कोई विकार है जिससे तत्क्षण निकाल देना आवश्यक है जिस से सारा शरीर स्वस्थ रहे।



खांसने से जकाम के कृमि फलते हैं।

बढे, हुए गलसूओं और गद्दों में विषल कोड़े, होते हैं और वे रक्त द्वारा हृदय में पहुँच कर हृदय-रोग उत्पन्न करते हैं या जोड़ों में पहुँच कर गीठया पैदा कर देते हैं। गलसूओं और गद्दों के कोड़े, शरीर के अन्य भागों में भी पहुँचते हैं और दूसरे रोग उत्पन्न करते हैं। ये शरीर का ठीक विकास होने में बाधा पहुँचाते हैं जिस के कारण इन से पीडित बच्चों नाटो कद के रह जाते हैं। गल-ग्रंथियों और बढे, हुए गलसूओं के कृमि धीरे-धीरे बच्चों के शरीर में विष पैदा कर देते हैं जिस से वह अपनी पढ,ई-लिखाई उचित रूप से नहीं कर सकता। ऐसे बच्चों को झिल्लीक-प्रदाह, लालज्वर और खसरा होने का

अधिक भय रहता है। यदि इन में से एक भी रोग बच्चों को लग जाए तो अवस्था गम्भीर हो जाती है और फिर वह बहुत धीरे-धीरे स्वस्थ होता है।

घीकत्सा

यदि किसी बच्चे के गद्गद निकल जाएं, तो उस का केवल एक ही इलाज है कि उसे अस्पताल या किसी योग्य डॉक्टर के पास ले जा कर गद्गद निकलवा दिए जाएं।

यदि गलसुए निरन्तर न बढ़ते रहें, बल्कि अचानक ही सूज जाएं और दर्द करने लगें तो अरंडी के तेल या एपसम सॉल्ट की एक खुराक दीजिये और जबड़ों के नीचे गर्दन के दोनों ओर गर्म पानी से सौंके। डॉक्टर की राय के अनुसार पेनिसिलिन या ट्रिपलसल्फा (triplesulpha) दिया जाए। रोगी को खूब पानी पीना चाहिये। यदि गलसुए बढ़ते हुए हों या वे इतने बढ़ते हुए भी न हों, परन्तु यदि उन पर सदा पीप के पीले चक्के से रहते हों, तो उन्हें निकलवा देना चाहिये।



दुखते और बँटे हुए गले का सब से अच्छा इलाज है गरम कर के पट्टी बांध देना

जुकाम

अन्य रोगों की अपेक्षा जुकाम बहुत अधिक लोगों को सताता है। जुकाम कृमियों द्वारा ही होता है। जुकाम खसरा और निमोनिया के समान ही संक्रामक है।

साधारण जुकाम इतना घातक नहीं होता परन्तु जाने चल कर इस से ऐसी खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं जैसे निमोनिया, श्वस रोग गीठया-ज्वर तथा बहरापन ।

रोक-थाम

जुकाम का रोकना कई बातों पर निर्भर करता है । सब से मुख्य बात यह है कि शरीर को उचित भोजन और व्यायाम द्वारा ठीक रखा जाए । प्रतीदिन ठंडे पानी से स्नान करना एक ऐसा उपाय है जिस से शरीर ऐसी दशा में रहता है कि जुकाम का निरोध कर सकता है । जिन लोगों को जुकाम हो उन से अलग रहना चाहिये ।

वह प्याला जिस का सब प्रयोग करते हैं, वह तौलिया जिसे से सब हाथ-मुंह पोछते हैं, तम्बाकू पीने का पाइप, खिलाने, उंगीलियां या जिस किसी वस्तु पर भी नाक का पानी और मुंह का थूक लग जाए—ये सभी वस्तुएं जुकाम के कीटाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचा देती हैं । कम हवा और कम रोखनी वाले कमरों में रहने से, धूल भरी हवा में सांस लेने से, ठंड लग जाने या भीम जाने से, जब कपड़े, पसीने से भीगे हुए हों तो हवा में बैठने से, कम नींद आने और अधिक काम करने से किसी भी व्यक्ति को जुकाम होने की सम्भावना रहती है । जो लोग मुंह से सांस लेते हैं और जिन के दांत सड़े हुए होते हैं और जिन के गलसुए बड़े हुए होते हैं, उन्हें जुकाम जल्दी-जल्दी आ दवाता है ।

चिकित्सा

यदि चिकित्सा जल्दी ही आरम्भ कर दी जाए तो जुकाम झीघू ही ठीक हो सकता है । छींक आना, आंखों से पानी निकलना, थोड़ा-थोड़ा सिर-दर्द, नाक का बन्द होना आदि लक्षण प्रकट होने ही रोगको बटोरे से रोकने का प्रयत्न करना चाहिये । इस का एक सब से उत्तम उपाय यह है कि आदमी घर से बाहर बगीचे में खोदे, तंजी से चलना या कोई दूसरा शारीरिक काम करे । जब तक पसीना न निकलने लगे तब तक व्यायाम करते रहिये और फिर गरम पानी से स्नान कर लीजिये । गरम पानी से निकल कर थोड़ा सा ठंडा पानी शरीर पर डाल लीजिये और फिर सूखे तौलियों से अच्छी तरह अपना शरीर पोछ डालिये ।

यदि जुकाम हुए दो दिन बीत चुके हों तो कुछ देर पर और ठंडे गर्म पानी में डाल कर सेकिये (देखिये अध्याय २१) । इस के बाद बिस्तर में लेट जाइये । आहार चावल की लपसी, आंशिक रूप से उबले हुए अंडों और फलों तक ही सीमित रखिये । इस प्रकार की चिकित्सा से जुकाम ठीक हो जाएगा । यदि जुकाम फिर से जारी हो जाए या निमोनिया में बदल जाने की आशंका हो तो डॉक्टर से पूछ कर तीन या चार दिन तक दिन में चार बार सल्फाथियाजोल या सल्फाडायजीन (Sulfathiazole or Sulfadiazine) की दो-दो गोलीयां खाई जाएं । इस से सख्त जुकाम के जल्दी-जल्दी उभर आने वाले जटिल उपसर्गों की आशंका कम हो जाती है । पानी अधिक मात्रा में पिलाइये । शायद डॉक्टर पीनीसीलिन दे ।

इन्फ्लूएंजा (La Grippe)

इन्फ्लूएंजा प्रतिवर्ष फैलता है। उस के लक्षण भी साधारण जुकाम जैसों ही होते हैं, परन्तु अधिक गम्भीर। आरम्भ में ही नाक बन्द हो जाती है छींकें आने लगती हैं, आंखों में पानी आने लगता है, सिर में दर्द होता है, पीठ दुखती है, सूखी खांसी होती है और कुछ ज्वर भी आ जाता है।

यह बहुत गम्भीर रोग है। इस से प्रतिवर्ष बहुत से बूढ़े, लोग मर जाते हैं। जब इन्फ्लूएंजा कमजोर लोगों पर आक्रमण करता है तो प्रायः उन की मृत्यु हो जाती।

चिकित्सा

इन्फ्लूएंजा बहुत शीघ्र लगने वाला रोग होता है। यदि परिवार के किसी सदस्य को यह रोग हो जाए तो उसे खांसते या छींकते समय अपने मुँह और नाक पर रुमाल रखना चाहिये। उसे कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों में घुक्ना चाहिये जिन्हें बाद में जला देना चाहिये। उस परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा प्रयोग किए हुए तौलिये, प्याले और खाने के बरतनों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

रोग के आरम्भ में ही रोगी को बिस्तर में लेट जाना चाहिये और जैसा कि इस अध्याय में पहले बताया जा चुका है उसे अपने पैर और टांगों कुछ देर गरम पानी में डालें रखने चाहिये। रोगी को घंटे भर में कम-से-कम डेढ़ पाव पानी या लेमनेड पी लेना चाहिये। पैरों को गरम रखिये। पैरों में गरम पानी की बोतलें रखना भी आवश्यक है। खाने में लपसी, शोरबा, आंशक रूप से पके हुए अंडे और फल होने चाहिये। खांसी के लिए वही चिकित्सा कीजिये जो इस अध्याय में छाती की सर्दी के लिए बताई गई है। नुसखे नम्बर ९ (देखिये परिशिष्ट) का प्रयोग दिन में तीन बार कुत्ली के रूप में कीजिये। इस से मुँह और नला साफ रहेगा और इस प्रकार रोग को कानों तक पहुँचने पर बहुरापन पैदा करने से रोकेंगे।



फेफड़े के रोग

निमोनिया

निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो निमोनिया के आनुवंशिक कीटाणु (Pneumococcus germ) से होती है। यह रोग अचानक कड़ी ठंड लगने से शुरू हो जाता है। तापमान झीघू ही बहुत बढ़ जाता है और छाती में दर्द होने लगता है। थोड़े समय तक सूखी खांसी आती है जिस से पीड़ा बहुत बढ़ जाती है और श्वास-गीत बहुत अधिक बढ़ जाती है। रंगी दाँड़ या बाँड़ करवट से लेंटाता है, पीठ के बल नहीं लेट सकता। चेहरा लाल हो जाता है, विशेष कर दोनों गाल; होठों पर ज्वर के छाल पड़ जाते हैं। रंगी के थूक में खून होता है। कुछ दिन तक बहुत तेज ज्वर रहने के पश्चात्, तापमान यकायक बहुत गिर जाता है और उस समय रंगी को बहुत पसीना आता है। इस के पश्चात् रंगी तीनक आति अनुभव करता है और यदि कोई दुर्घटना न घटे तो वह निरन्तर अच्छा होता जाएगा और दो या तीन सप्ताहों में ठीक हो जाएगा। कुछ लोग तापमान गिरने से पूर्व ही मर जाते हैं। पहले निमोनिया के प्रत्येक दस रोगियों में से तीन या चार मर जाते थे जो लोग मीदरा का सेवन अधिक करते हैं वे निमोनिया के आक्रमण से जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते।

प्रीतिबन्धक उपाय

निमोनिया के कीटाणु बहुत फैले हुए रहते हैं। हम उन से बच नहीं सकते, परन्तु यदि शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली रक्खा जाए तो निमोनिया के कीटाणु उस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। किसी प्रकार की शराब या तम्बाकू का प्रयोग करने से रोग के कीटाणुओं के प्रतिकार करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। पौष्टिक भोजन की कमी के कारण, या अधिक भोजन करने से, अंधेरे में रहने से, कम हवादार और कम रोखनी वाले मकानों में रहने से, दरवाजे और खिड़कियां बन्द कर के सोने से, झुक कर बैठने से या सदी लग जाने से भी शरीर उन कीटाणुओं का प्रतिकार करने में अपने आप बं निबल पाता है।

निमोनिया नाक के स्राव से, थूक से, खांसने और छींकने से फैलता है। जिस प्याले का प्रयोग दूसरे लोग करते हैं, उसी में कुछ पीने से निमोनिया हो जाने की

आश्चर्य रहती है। सड़कों पर धूल भरी हवा में सांस लेने से, या घर झाड़ते-बहारते समय उस की धूल मुँह में घुसने से हम निमोनिया के कौटान अपने अन्दर ले जा सकते हैं जिस के परिणाम स्वरूप हमें निमोनिया हो सकता है।

विशेष चिकित्सा

सल्फा ड्रग्स (Sulfa Drugs) और अभी हाल में पीनीसीलिन की खोज के पश्चात् निमोनिया से मरने वालों की संख्या बड़े-बड़े कम किया जा चुका है। सल्फा ड्रग्स, स्लफामिथोयोजाल और सल्फाडायजीन बहुत गुणकारी दवाएँ हैं जो छोटें-से-छोटी जगह के अस्पतालों में भी मिल सकती हैं। ये दवाएँ किसी योग्य डॉक्टर की राय ले कर ही देनी चाहिये। ज्वर २४ घंटे से लेकर ४८ घंटे में उतर सकता है। ज्वर उतरने के पश्चात् कम-से-कम तीन दिन तक इन दवाओं का सेवन करते रहना चाहिये। बहुधा ज्वर उतरते ही दवा का सेवन भी बन्द कर दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप रोग फिर उभर आता है और पहले से अधिक गम्भीर होता है। पीनीसीलिन अब सब प्रसिद्ध दुकानों में मिलती है और यह सल्फा ड्रग्स की अपेक्षा निमोनिया के उपचार में अधिक गुणकारी औषधि होती है।

उचित देख-भाल की बहुत आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके रोगी को खुली हवा में लिटाना चाहिये। रोगी के पाँव गरम रखिये। यदि आवश्यकता पड़े तो उस के पैरों के नीचे गरम पानी की बोतलें रखिये। रोग के आरम्भ में ही एक खुराक एससम सांल्ट की दीजिये और १०० डिग्रि फ. के तापमान के पानी का आनिमा दीजिये। नीबू का शरबत, नीबू का अर्क या सादा पानी रोगी को जल्दी-जल्दी पीने के लिये देना चाहिये। भोजन पतला होना चाहिये जैसे चावल की लपसी, करी या अंडे, कच्चे या आंशिक रूप से पके हुए।

रोगी को कागज के टुकड़ों या कपड़े की कतरनों में धूँकना चाहिये जिन को बाद में जला दिया जा सके।

बच्चों का निमोनिया

बच्चों के निमोनिया का इलाज भी इस अध्याय के पहले भाग में बताए गए वयस्क व्यक्ति के इलाज के समान ही होता है। बच्चों को उस स्थान में रहना चाहिये जहाँ हवा का आवागमन भली भाँति होता है। ऐसे बच्चों को भोजन मात्रा कम कर दीजिये। जैसा इस अध्याय में पहले बताया गया है, वैसे ही उस के पाँव गरम रखिये। यदि ऊपर लिखी औषधियाँ प्राप्त न हों तो छाती के दर्द वाले हिस्से में राई का पलस्तर लगाइये। छः या सात भाग आटे में केवल एक भाग राई का डालना चाहिये। इस में गरम पानी डालिये और उस की एक मोटी तह कपड़े पर जमाइये। फिर इस त्वचा पर लगा दीजिये। ज्योंही त्वचा काफी लाल हो जाए त्योंही राई के पलस्तर को उतार लेना चाहिये चार या पाँच घंटे पश्चात् इसे कुछ मिनट के लिये फिर लगाना चाहिये। बच्चा जितना पानी पी सके पिलाना चाहिये या उसे नीबू का अर्क या रस मिला हुआ पानी दीजिये। थोड़े से गरम पानी

का आनिमा उसे प्रतीदिन दीजिये । यदि बच्चा निरन्तर खांस परन्तु बलगम न निकलें और यदि खांसी से उसे नींद न आए, तो पीरीडिष्ट में लिखा हुआ नुसखे नम्बर १८ के अनुसार इलाज करना चाहिये । निमोनिया की प्रत्येक दृष्टा में यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि इस बीमारी की चिकित्सा करने का सब से उत्तम उपाय सल्फा ड्रूज या उस से भी अच्छी पेनीसिलिन है ।

निमोनिया के बाद क्षय-रोग की संकथा

बच्चे या बड़े को निमोनिया के बाद क्षय-रोग हो जाना बहुत ही साधारण सी बात है, अतः यह बहुत आवश्यक है कि जब तक निमोनिया का रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए और उस के झरीर में कुछ शक्ति न आ जाए, तब तक उसे चारपाई पर से उठ कर काम-काज करना या घूमना-फिरना नहीं चाहिये । इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, चाहिये कि रोगी के सोने के कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बन्द न रहें । छुटे अध्याय में बताई हुई विधि के अनुसार लम्बी-लम्बी सांसों का व्यायाम प्रतीदिन किया जाए ।

फ्यूसाय्वरक झिल्ली-प्रदाह (Pleurisy)


इस रोग में वह पतली सी झिल्ली जो फेफड़ों और छाती की दीवार की भीतरी ओर चढ़ी रहती है, सूज जाती है । छाती पर प्रहार होने से या सदी लग जाने से यह रोग हो जाता है । सब से पहले ठंड लगती है, उस के बाद छाती में एक ओर थोड़ा दर्द होता है, पीड़ा चूमती सी प्रतीत होती है और लम्बी सांस लेने या खांसने से पीड़ा बढ़ जाती है । थोड़ा ज्वर भी आने लगता है । एक ओर दर्द होना ही प्रमुख लक्षण है । रोगी पीड़ा वाली ओर लेट नहीं सकता । कुछ दिन बाद झिल्ली (Pleura) की दोनों तहों के बीच में कुछ तरल प्रायः जमा हो जाता है और उस के बाद पीड़ा कम हो जाती है ।

चिकित्सा

साधारणतया इस रोग में ज्वर एक सप्ताह या दस दिन तक रहता है । यदि रोगी निरन्तर गर्मी अनुभव करता रहे या दो सप्ताह तक हर दिन दोपहर और शाम को बेचैनी अनुभव करे; तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उसे क्षय रोग हो गया है और इस दृष्टा में अगले भाग में क्षय रोग की चिकित्सा के लिए जो उपाय लिखे गए हैं उनका प्रयोग करना चाहिए ।

इस रोग के रोगी को ऐसे कमरे में लिटाना चाहिए जहाँ दरवाजे और खिड़कियां खोलने पर ताजा हवा अन्दर आए । केवल तरल भोजन उसे देना चाहिए । एक पेट्टी या तीन इंच चौड़ा कपड़ा उसकी छाती के गिर्द लपेट दीजिए; फिर रोगी से कहिए कि सांस बाहर निकालें । इस प्रकार जब फेफड़े खाली हो जाएं और छाती सिकुड़ जाए, तो पेट्टी को कीसए और बांध दीजिए । इस से छाती की स्वतन्त्र गति नहीं होती और दर्द भी कम हो जाती है । दर्द कम करने के लिए प्रत्येक दो घंटे पश्चात्, बीस-बीस मिनट तक, गरम पानी की सेंक भी

दीजिए। गर्म पानी में भिगो कर और निचोड़ कर कपड़े के टुकड़े से सेंकने के बदले गर्म पानी की बोतल को गर्म पानी के निचोड़े हुए कपड़े में लपेट कर भी सेंकने का काम किया जा सकता है। पेट साफ रखा जाए।



फुफ्फुसावरक ट्यूबर्क्यूलोसिस-प्रदाह के रोगी की छाती पर पट्टी

फुफ्फुसावरक ट्यूबर्क्यूलोसिस-प्रदाह बिगड़ कर एक और रूप धारण कर सकता है; इसे एम्पियमा (Empyema) कहते हैं। इस अवस्था में फेफड़ों में इकट्ठा तरल अधिक सत्रमित हो जाता है और पीप पैदा हो जाती है। डॉक्टर की राय लेकर रोगी को सल्फाडायज या पेनीसिलिन देनी चाहिए। एम्पियमा निमोनिया की बिगड़ती हुई दशा है और इस की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

क्षय रोग या यक्ष्मा (Tuberculosis or Consumption)

भारतवर्ष में रात-दिन, प्रातः क्षण, कोई-न-कोई क्षय रोग से मरता रहता है। इस का आक्रमण विशेषकर १८ से ४० वर्ष के बीच के व्यक्तियों पर होता है। चूंकि रोग को रोका जा सकता है और इसकी चिकित्सा हो सकती है, इस लिए यह बात बहुत महत्व की है कि सब को इसके लक्षण जान लेने चाहिए और इसे रोकने के उपाय और चिकित्सा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

लक्षण

रोगी की चिकित्सा इस बात पर निर्भर करती है कि रोग का पता कितनी जल्दी लग जाए। इस कारण सब से क्षय रोग के प्रथम लक्षणों को जानना चाहिये।

जिन लोगों की छाती पतली और चपटी होती है और झुके हुए कंधे होते हैं उन्हें इस रोग के लगने की अधिक सम्भावना होती है। धीरे-धीरे वजन कम होना एक ऐसा लक्षण है जो इस रोग के रोगियों में प्रायः पाया जाता है। त्वचा का पीला होना और कभी-कभी बालों का लाल हो जाना भी इस रोग का साधारण लक्षण है। बार-बार जुकाम होना भी एक दूसरा प्रारम्भिक लक्षण है। कुछ लोगों को जिन्हें यह रोग होता है रोग का पता ही नहीं लगता, परन्तु वे जल्दी ही थक जाते हैं और कुछ ही हफ्तों में दोपहर को हल्का सा ज्वर चढ़ने की और प्रातःकाल और शाम को खांसी होने की शिकायत करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें रात को पसीना आने लगता है और उसका थूक लाल होता है, क्योंकि उस में खून मिला हुआ होता है। छाती में दर्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भूख का मर जाना भी एक साधारण सा लक्षण है। एक दूसरा लक्षण रोगी का स्वभाव बदल जाना है अर्थात् जो व्यक्ति सदा प्रफुल्लित और स्वभाव का अच्छा होता है, वह चिड़चिड़ा और खिन्न चित्त हो जाता है।

प्रायः थूक में इस रोग के कृमि (The Tuberculosis Bacillus) पाए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के प्रति क्षयरोग का सन्देह हो तो डॉक्टर को बुला कर रोगी के थूक की परीक्षा करवानी चाहिये कि उस में क्षय रोग के कीटाणु हैं या नहीं। पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि बहुत से लोगों में थूक में क्षय रोग के कीटाणु न होने पर भी उन्हें यह रोग होता है। अतः यदि इस रोग के दूसरे लक्षण मौजूद हों तो थूक में कीटाणु न होने पर भी क्षय रोग का इलाज शुरू कर देना चाहिए।

ऊपर दिए गए लक्षण फेफड़ों के क्षय रोग के साधारण लक्षण हैं। यह रोग केवल फेफड़ों का ही रोग नहीं है बल्कि यह शरीर के दूसरे भागों पर भी आक्रमण करता है। ऊपर दिए गए लक्षणों के अतिरिक्त यह रोग गले में भी हो सकता है और कोई चीज निगलते समय गले में दर्द हो सकता है और स्वर धीमा पड़ जाता है। हीड्डियों का क्षय रोग भी एक आम रोग है। क्षय रोग प्रायः कूल्हे पर आक्रमण करता है जिस से एक टांग छेटी हो जाती है। जब यह रोग रीढ़ की हड्डी में होता है तो कुबड़े निकल आता है या शरीर एक ओर को झुक जाता है। कण्ठमाला एक प्रकार का क्षय रोग होता है जो प्रायः बच्चों में पाया जाता है, गर्दन पर सामने और पीछे गिंल्टियां निकल आती हैं। बच्चा प्रायः पीला पड़ जाता है और दुर्बल दिखाई देने लगता है और उस की आंखें और कान जल्दी-जल्दी दुखने लगते हैं।

क्षय-रोग के कीटाणु इस प्रकार शरीर में घुसते हैं

(१) जो हवा हम सांस के साथ अन्दर ले जाते हैं उसके साथ ये हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। (२) जो भोजन हम करते हैं उसके साथ ये हमारे शरीर में घुस जाते

हैं। बहुत सी गायों और दूसरे जानवरों को क्षय रोग होता है। इन जानवरों का मांस खाकर या इन का दूध पीकर हमें यह रोग हो जाता है। क्षय रोग पीड़ित व्यक्ति यदि बाजार में या रसोई घर में खान-पीने की चीजों को हाथ लगाए तो उन के नाक, मुँह और हाथों द्वारा ये कृमि भोजन में प्रवेश कर जाते हैं और यह भोजन करके हमें क्षय रोग हो जाता है। (३) त्वचा पर कहीं घाव हों, तो उस में छेदकर ये कृमि अन्दर घुस जाते हैं।

क्षय रोग को फैलने से रोकने के उपाय

क्षय रोग के रोगी को यह जानना चाहिए कि यह रोग खांसने और थूकने से फैलाता है। जब वह खांसता या थूकता है तो उसके नाक और मुँह से कुछ छींटे बाहर निकलते हैं। इन छींटों में क्षय रोग के कीटाणु रहते हैं और जब ये छींटे हवा और धूल में मिल जाते हैं तो स्वस्थ लोगों के फेफड़ों में कीटाणु सांस के साथ अन्दर चले जाते हैं और उन्हें यह रोग हो जाता है। इस रोग के रोगी के थूक में अनगिनत कीटाणु रहते हैं। उसे कभी ऐसे स्थान पर नहीं थूकना चाहिए जहाँ उसके सूख कर धूल बन जाने की सम्भावना हो क्योंकि निःसन्देह रोग फैलाने का सब से आसान तरीका थूकना है।

इस रोग के रोगियों को कभी अपनी नाक या मुँह के सामने कपड़ा या कागज लगाए बिना छींकना या थूकना नहीं चाहिए। यदि कागज का प्रयोग किया जाए तो उसे जला देना चाहिए। यदि कपड़े का प्रयोग किया जा तो उसे इसी काम के लिए रख



रोग-कृमि इस प्रकार भी फैलते हैं

लेना चाहिए और एक साधारण रूमाल की भाँति उस से काम नहीं लेना चाहिए या तो उस का प्रयोग कर के उसे जला डालना चाहिए या इसे उबाल लेना चाहिए ।

क्षय रोग के रोगी को दूसरों का भोजन नहीं छूना चाहिए ।

इसके रोगी को कभी अपना थूक निगलना नहीं चाहिए । ऐसा करने से रोग के कीटाणु आंतों में बैठने शुरू हो जाते हैं और रोगी झीघू ही मर जाता है ।

क्षय रोग के लगने से कैसे बचें

नगर की धूल में क्षय रोग के कीटाणु होते हैं । इन से बचने का कोई उपाय नहीं और कभी-न-कभी मनुष्य के शरीर में ये अवश्य प्रवेश कर जायेंगे; परन्तु यह बात स्पष्ट है कि जब शरीर शक्तिशाली और स्वस्थ होता है और जुकाम आदि नहीं होता तो रक्त क्षय-रोग के कुछ कीटाणुओं को नष्ट कर सकता है । कम पौष्टिक या कम मात्रा में भोजन मिलने से, अधिक काम करने से, या दूराचरण से यदि शरीर कमजोर हो जाता है तो वह कीटाणुओं को नष्ट करने की अपनी शक्ति खो बैठता है । जो लोग नखों का किसी भी रूप में सेवन करते हैं वे दूसरे लोगों को अपेक्षा क्षय रोग के जल्दी शिकार बन जाते हैं और एक बार इस रोग के रोगी बन कर उस से छुटकारा पाने की बहुत कम सम्भावना होती है । तम्बाकू का प्रयोग करने से फेफड़ों और गले को आघात पहुँचता है और बहुत आसानी से क्षय रोग लग जाता है ।

जब कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ मकान बहुत सटे हुए होते हैं, जैसे कि झुग्गों की दशा होती है, वहाँ क्षय रोग फैलने का अधिक खतरा रहता है ।

प्रत्येक कमरे में कम-से-कम दीवारों में दो बड़ी खिड़कियाँ हनी चाहिए । रात को खिड़की अवश्य खुली होनी चाहिए ।

जिस प्याले, चम्मच, प्लेट, तौलियों या चिलमची का प्रयोग क्षय रोग के रोगी ने किया हो, उस का प्रयोग करना बहुत खतरनाक है जब तक कि उसे उबाल न लिया जाए । क्षय रोग मांस और दूध से भी फैलता है, अतः मांस खाने से पूर्व उसे अच्छी तरह से पका लेना चाहिए और दूध को उबाल लेना चाहिए ।

कुछ विशेष काम करने वालों को सदैव इस रोग के लग जाने की सम्भावना रहती है, क्योंकि काम करने वाले को धूल भरी या धुएँ से भरी वायु में ही सांस लेना पड़ता है, पर सिगार और सिगरेट बनाने वाले, पत्थर काटने वाले, और चाबल पर पॉलिश करने वाली मिलों में काम करने वाले । जो लोग बैठे रहते हैं और झुक कर अपना काम करते हैं जैसे दर्जी, टोपी बनाने वाले, टाँकरी बनाने वाले और टाइप ठीक करने वाले, उन्हें भी यह रोग होने की सम्भावना रहती है । स्कूलों और कॉलेजों में बहुत से छात्र क्षय रोग से पीड़ित हैं, क्योंकि वे अपने पढ़ने लिखने की मेजों पर झुक कर बैठे रहते हैं और घर से बाहर कोई प्रतीदिन व्यायाम नहीं करते ।

क्षय रोग की चिकित्सा

इस रोग के किसी भी रोगी को निराश नहीं होना चाहिए। इस का इलाज हो सकता है। जब किसी को या रोग हो जाए, तो उसकी जितनी जल्दी चिकित्सा आरम्भ हो जाती है उस के अच्छे होने की उतनी ही आशा बढ़ जाती है।

जो लोग क्षय रोग के रोगी हैं उनके लिए निम्न औषधीय उपचार हितकर हैं। स्ट्रेप्टोमायसीन (Streptomycin) का पेशी का इंजेक्शन (Intra-muscular injection) १ ग्राम प्रतिदिन अर्थात् आधा ग्राम प्रातः और आधा ग्राम सयंकाल में ४२ दिन तक दीजिए। इसके साथ पी. ए. एस. गोलीयां ४ से ६ तक प्रति दिन तीन बार दीजिए। यदि फिर भी लक्षण विद्यमान हों तो दो माह बाद कोर्स फिर दोहराओ।

हाल ही में एक नया इलाज निकला है और वह है Streptomycin की सूइयों के साथ-साथ Isoniazid की सूइयां लगाना।

क्षय रोग का केवल एक उपचार है और वह है शारीरिक श्रक्ति को बढ़ाना जिस से शरीर धीरे-धीरे उन रोग कृमियों से संघर्ष करे और फिर उन्हें नष्ट कर दे। यह बहुत लम्बी विधि है, अतः इस के रोगी को यह जानना चाहिये कि एक या दो सप्ताह में अच्छा नहीं हो सकता। शारीरिक श्रक्ति को बढ़ाने का और इस रोग का इलाज करने का सब से आसान तरीका यह है कि रोगी सदा ताजा हवा में रहे, अच्छा भोजन यथोक्त मात्रा में करे, घर से बाहर रहे, आराम करे और सब प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त रहे।

कुछ स्थानों पर क्षय रोग की चिकित्सा करने के लिए खास अस्पताल खोलें गए हैं और जहाँ तक सम्भव हो सके, रोगी को ऐसे अस्पताल में चला जाना चाहिये। बहुत से बड़े-बड़े इलाकों में क्षय रोग के रोगियों के लिए औषधालय होते हैं। इन में से कुछ औषधालयों में डॉक्टरी राय और दवा गरीब लोगों को बिना पैसे दी जाती है।

यदि क्षय रोग का रोगी अपना घर न छोड़ सके तो उसे निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे लिखी हुई बातों को ध्यान में रख कर इस रोग का इलाज घर में भी किया जा सकता है।

रोगी को एक ऐसे कमरे में लिटा देना चाहिए जहाँ कोई और दूसरा न आ सके। उस कमरे में बड़ी-बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए जिन को रात-दिन खुला रखना चाहिए। दिन के समय रोगी को कमरे के बाहर वृक्ष की छाया में झूलें (Hammock) में लटका रहना चाहिए। रोगी के कमरे की दीवारों और फर्श को गरम पानी से धो कर साफ रखना चाहिए।

रोगी का तकिया और बिस्तरा प्रत्येक धूप वाले दिन में कई घंटे तक डाल रखना चाहिए। धूप और ताजा हवा से क्षय रोग के कीटाणु मर जाते हैं।

भोजन (रोगी का आहार)

शायद क्षय रोग में चिकित्सा का एक आवश्यक अंग भोजन भी है। साधारणतया रोगी की भूख मर जाती है। भूख तेज करने के लिए रोगी को दूध के रूप में विटामिन

बी. कम्पलेक्स या गोली के रूप में दीजिए। बी. कम्पलेक्स के साथ विटामिन बी. की गोलीयां (५-१० mg) दिन में तीन बार देने से श्वेद पूर्ण हो जाती है। क्षय रोग के सब रोगियों को कांड लिवर जायल या हेलीबट लिवर जायल देना चाहिए। रोगी जितना भोजन कर सके उतना दीजिए। दूध, जंहे, मांस, फल, सब्जियां, दाल, मूँहूँ, बिना धुला चावल, मेवा या इस प्रकार का कोई दूसरा भोजन देना चाहिए। यदि रोगी प्रसन्न भोजन न कर सके तो उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कई बार भोजन देना या एक बार और दूसरी बार के भोजन के बीच में पौष्टिक दूध देना भी लाभदायक होता है।

चिकित्सा की अन्य बातें

जल्दी-जल्दी स्नान कर के शरीर को साफ रखना चाहिए। कपड़े भी साफ रहने चाहिए। दातों को सुबह ब्रश कर के साफ रखना चाहिए। रोगी को इतना अधिक चलना-फिरना नहीं चाहिए कि उसे थकान हो जाए या ज्वर आ जाए।

क्षय रोग के रोगी को बहुत सावधान रहना चाहिए कि परिवार के दूसरे सदस्यों को रोग न लग जाए। रोगी को अपने बरतन, प्लेटें, तौलिये और बिस्तर अलग रखना चाहिए, केवल अपने प्रयोग के लिए और किसी दूसरे को इनका प्रयोग नहीं करने देना चाहिए। उन्हें उन बर्तनों के साथ साफ नहीं करना चाहिए जिन का प्रयोग परिवार के अन्य सदस्य करते हैं।

क्षय रोग के किसी भी रोगी को किसी बच्चे को चुम्बना या प्यार करना नहीं चाहिए, और जो खाना दूसरे व्यक्तियों के लिए हो उसे कभी नहीं छूना चाहिए। रोगी के कमरे से मक्खियों को दूर रखिए। यदि सम्भव हो सके तो किसी भी दवा में उन्हें रोगियों के थूक पर न बैठने दीजिए। थूक को सदा ढक कर रखिए।

क्षय रोग में एक महत्वपूर्ण बात है प्रसन्न-चित्त रहना। क्षय रोग के रोगी को परमेश्वर पर भरोसा रखने से बहुत लाभ होगा क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के सब रोगों निवारण कर देता है। यदि कोई रोगी निराश हो बैठे और यह सोचे कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है तो उसके मरने में कोई सन्देह नहीं रहता।

रोगी को प्रतिदिन मल-त्याग बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन कई गिलास पानी के पीने चाहिए जिस से शरीर में से विषैले पदार्थ घुल कर बाहर निकल जाएँ।

यदि खांसी बहुत कष्टदायक हो तो बड़ी चिकित्सा करनी चाहिए जो इस अध्याय में ज़काम और खांसी की चिकित्सा के अंतर्गत बताई गई है।

कभी-कभी क्षय रोग के रोगियों को प्रातःकाल खांसी उठती है। प्रातःकाल नाश्ते से पूर्व प्रतिदिन बहुत गरम दूध एक गिलास या गरम पानी के एक गिलास—जिस में नींबू का रस मिला हो—पीने से खांसी रुक जाती है।

यदि रोगी को अधिक ज्वर हो तो उसे थोड़े ठण्डे पानी से अंगोछा जा सकता है। आध घंटे या इस से अधिक समय तक अंगोछते रहना चाहिये। (देखिये अध्याय २१)

जब रोगी के थूक में खून आए तो उसे बहुत हिलना-डलना नहीं चाहिए। थूक

में खून जाने का यह कारण यह होता है कि रोगी ने कोई भारी वस्तु उठाई है या बहुत परीश्रम किया है। यदि थूक में रक्त की मात्रा अधिक हो तो बर्फ के पानी में कपड़े, को भिगो कर उस की छाती पर रखना चाहिए। कपड़ों को बार-बार भिगो लेना चाहिए जिस से वह निरन्तर ठण्डा रहे। यदि बर्फ न मिल सके तो कपड़े, को ठण्डे पानी में भिगो कर और उसके दोनों कानों को पकड़ कर कुछ देर तक हवा में हिलाना चाहिए, इस से वह बहुत ठंडा हो जाएगा।

क्षय-रोग से छुटकारा पा लेने के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति को यह याद रखना चाहिये कि रोग के फिर उभर आने की सम्भावना रहती है इसीलिए स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये, और उन सब बातों को छोड़ देना चाहिये जो इस अध्याय में लिखी गई हैं और जिन से बीमारी लगती है।

दमा

दमा एक ऐसी बीमारी है जिस में सांस बड़ी कठिनाई से आता है और इसके साथ वायुमूलिका से सम्बन्ध रखने वाली पेशियों में ऐठन और वायुमूलिका की इलीप्सक-झिल्ली में रक्ताधिक्य और सूजन उत्पन्न हो जाती है। दमे के दूर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जुकाम, ग्रीष्म रितु का ज्वर (जिस में नाक, कंठ में रक्त बसा उत्तजना, छिंके तथा सिर दर्द होता है) धूल-मिट्टी भरी वायु में सांस लेना, या घोड़े, और बिल्ली जैसे किसी जानवर की दुर्गन्ध सुंघते रहना। डर या किसी आकस्मिक भावना या उद्वेग से भी दौड़ा उठ जाया करता है। कभी-कभी तो यह दौड़ा कई-कई घंटे रहता है या हर रात को लगातार कई रातों तक यह दौड़ा उठा करता है। रोगी को बैठा ही रहना पड़ता है ताकि वह सांस ले सके। छाती और श्वास-प्रश्वास की सब पेशियां जोर-जोर से हलक करती हैं। जब सांस बाहर निकलता है तो एक प्रकार की सीटी का-सा विचित्र शब्द होता है। मुंह पीला और चिन्ताजनक हो जाता है। हाथ और पैर ठण्डे पड़ जाते हैं। खोसी दबी हुई और सूखी होती है और बलगम बड़ी कठिनाई से बाहर निकलता है। जो बलगम इत्यादि मुंह से निकलता है वह भी बहुत थोड़ा निकलता है और बहुत लिबीलवा होता है। कई घंटों के कष्ट के पश्चात् रोगी थक कर बिस्तर पर गिर पड़ता है और उसे थोड़ी नींद आ जाती है, अथवा दौड़ा धीरे-धीरे कम हो जाता है। अधिक खा लेने से या किसी विशेष खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से भी कभी-कभी दौड़ा उठने की सम्भावना होती है।

चिकित्सा

दमे की चिकित्सा करना कठिन कार्य होता है। भोजन का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए और भोजन नियमित रूप से करना चाहिए, और मसाला, मांस तले हुए और पके हुए पक्वान, देर से पचने वाली वस्तुएं इत्यादि नहीं खानी चाहिये। भोजन में साधारण शक्तिवर्धक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में अवश्य लेनी चाहिए, उदाहरणार्थ—

भली-भाँति पका हुआ दहीलया आदि, रोटी, झाक-भाजी और फल । दूध अधिक पीना चाहिए परन्तु अन्धे बहुत कम खाने चाहिए । भोजन बहुत हों थोड़ा वस्तुओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए । कब्ज और पेट का फूलना दूर करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । (सर्दी और जुकाम की चिकित्सा के लिए अधिक सूचनाएं अध्याय २९ में दी गई हैं) । रोगी को यथासम्भव खुली वायु में घर से बाहर छान्तिपूर्वक रहना चाहिए, नियमित रूप से अपनी आदतें बनानी चाहिए और कभी किसी प्रकार से भी उत्तेजित न होना चाहिए ।

डॉक्टर को निम्नलिखित औषधियों का प्रयोग करना चाहिए :— बेंताडेन्ना को सुइयां, नाइट्रोग्लिसरीन; या एड्रेनलिन देना चाहिए यह अन्तिम औषधि विशेष रूप से गुणकारी है और इसे ५ से दस बूंद तक देना चाहिए । इन औषधियों से तुरन्त आराम होता है । एड्रेनलिन को नाक में सूघने के लिए भी प्रयोग में लाना चाहिये । यह दवा अकेली ही प्रयोग में ला सकते हैं या इस में मन्थल (menthol) या थाइमोल (Thymol) और एल्बोलीन (Albolene) में यूकीलप्टस तेल मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं ।

छाती को गरम पानी से सेंकने से पहले पैरों को गरम पानी में कुछ देर डालें रखना लाभदायक होता है । कुछ स्थितियों में छाती पर एक बड़ी, और बहुत ठण्डी कपड़ा की गद्दी रखने से भी आराम होता है । दाँतों के बीच में गमी और ठण्डक पहुँचाने से रोगी की प्रतिकार-शक्ति कायम रहती है, और इस प्रकार दमे की तीव्रता कम हो जाती है ।

पिछले कुछ वरसों में वायुनीतिका के दमे के रोग सम्बन्धी बहुत अनुसन्धान किया गया है, जिस से यह आशा होती है कि यदि रोगी को धीरे-धीरे, मात्रा बढ़ाते हुए ऐसे प्रोटीन-युक्त पदार्थ खिलाए जाएं जिन का उस की प्रकृति पर विशेष प्रभाव पड़ता हो, तो बहुत-से रोगियों को बड़ा लाभ होगा, और बहुत-से तो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और इस दुःखदायक रोग से मुक्त हो जाएंगे । ऐसा करने से यह प्रभाव होता है कि प्रोटीन रोगी को पहले दुर्बल किया करते थे और जो अपने जहरीले गुणों से दमे के लक्षण उत्पन्न किया करते थे । उन के बुरे प्रभाव का प्रतिकार करने की क्षमता या सुरक्षित रहने की शक्ति रोगी में आ जाती है । प्रत्येक रोगी पर प्रयोग कर के यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन-से पदार्थ किस रोगी के लिए विशेष रूप से हानिकारक हैं ।

गुप्त रोग (मैथुन जन्य व्याधियां)

पुंयमेह या सूजाक

जब किसी व्यक्ति को सूजाक हो जाता है तो मूत्र-नली सूज जाती है और श्वेत या पीले रंग का पानी-सा गिरने लगता है। यह रोग सूजाक के रोग-कृमि द्वारा होता है और यह उस व्यक्ति के साथ सहवास करने से होता जो पहले से ही सूजाक का रोगी हो। कभी-कभी पुंयमेह पीड़ित व्यक्ति के पीप लगने तौलए आदि से इन्द्रिय पर पीप लग जाने से या उसी स्थान पर मल त्याग करने से जहाँ पहले सूजाक का रोगी बैठ चुका हो, यह रोग लग जाता है।

लक्षण

यह रोग प्रायः सहवास के तीन से लेकर सात दिन के बाद आरम्भ होता है। इस के लक्षण मूत्र-नली में खूजली होना, जलन और चुभने वाली पीड़ा होती है, पेशाब करते समय पीड़ा होती है और नली में से पानी सा निकलता है। यह पानी शीघ्र ही गाढ़ा पीले या श्वेत रंग का बन जाता है। यदि इस रोग की चिकित्सा न कराई जाए तो यह सारे मूत्र-मार्ग में ऊपर की ओर फैल जाती है और मूत्र-नली संकुचित हो जाती है जिस के परिणाम स्वरूप पेशाब नहीं हो सकता। यह इस रोग का जीटिल उपसर्ग है और यदि इस की उपेक्षा की गई तो अन्त में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। सूजाक का कृमि रक्त-नली द्वारा जोड़ों में पहुँच जाता है जहाँ वह रोग की सब से कष्टदायक स्थितियों में से कोई-न-कोई स्थायी पैदा करता है। सूजाक अन्धेपन का एक सामान्य कारण होता है, क्योंकि बच्चे को यह रोग जन्म के समय अपनी माता से लग जाता है।

जहाँ परिवार के एक सदस्य को यह होता है वहाँ दूसरे सदस्यों में भी इस के फैलने की आशंका लगी रहती है और जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ इस के फैलने का और भी अधिक खतरा है।

चिकित्सा

इस रोग की सफल चिकित्सा तो कोई अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है। यदि सल्फा ड्रग्स द्वारा चिकित्सा की जाए तो सल्फाडायजीन का ही प्रयोग सब से अधिक लाभप्रद

होता है। इस की दो-दो गोलियाँ दिन में चार बार १५ दिन तक देनी चाहिये। इस समय रोगी को पानी या फलों का रस प्रचुर मात्रा में पीना चाहिये। रोगी को किसी डॉक्टर की निगरानी में रखना चाहिये जो दवा के संभावित हानिप्रद प्रभावों को रोक्ता रहे। प्रयोगशाला के निरीक्षण से ही पता चल सकता है कि यह रोग दूर हुआ है या नहीं।

पैनीसीलिन की चिकित्सा द्वारा परिणाम जल्दी निकलते हैं। पेशी के भीतर (Inter-muscular) एक ४००००० यूनिट्स का इंजेक्शन दिया जाता है। जिस के २४ घंटों के बाद एक और इंजेक्शन इसी शक्ति का देना चाहिये। ये इंजेक्शन सूजाक के रोग को गम्भीर अवस्था को पहुँचने से रोकने के लिए काफी होते हैं।

स्त्रियों में सूजाक

बहुत से पुरुषों को झाड़ी से पूर्व सूजाक का रोग लग जाता है और विवाह के उपरांत वे इस रोग को अपनी पत्नी को भी लगा देते हैं। इस रोग में पहले-पहल पेशाब करने समय जलन और पीड़ा होती है। जल्दी-जल्दी पेशाब करने की इच्छा होती है और उत्पीठ-स्थान से श्वेत या पीले रंग का पानी सा गिरने लगता है। यदि किसी स्त्री को सूजाक हो गया हो तो थोड़े ही समय में उसे गर्भशय का रोग भी हो जाता है। तब उसे श्वेत-प्रदर (Leucorrhœa) का रोग हो जाता है (देखिये अध्याय ३२) सूजाक स्त्रियों के बाँझ होने का एक सामान्य कारण होता है। यही नहीं, बल्कि यह रोग प्रायः कुछ वर्षों तक उन्हें कष्ट देता रहता है। इस की चिकित्सा वही है जो ऊपर पुरुषों के लिये लिखी गई है।

गर्मी (Syphilis)

गर्मी (फिरंग या आतंशक या उपदंश) एक कृमि-रोग है और प्रायः यह उस व्यक्ति के साथ मैथुन करने से होता है जिससे गर्मी होती है। यदि माँ को यह रोग हो तो गर्भशय में पड़े, बच्चे को जन्म से पूर्व ही यह रोग लग सकता है। गर्मी और क्षय-रोग संसार में दो तीव्र वहव्यापक रोग हैं परन्तु दोनों में गर्मी का रोग अधिक व्यापक है।

गर्मी साधारणतया मैथुन क्रिया द्वारा लगती है परन्तु अन्य रीतियों से भी इस के लगने का भय रहता है—जैसे चुम्बन लंने से या रोगी के घाव से संयोगवश सम्पर्क होने से या रोगी के पाइप, प्याले, चम्मच या प्लेट का प्रयोग करने से।

लक्षण

उपदंश का पहला लक्षण लिंग या जिस किसी भाग में संक्रमण हुआ हो वहाँ छोटी सी फुंसी निकल आती है। यह सहवास के बाद पाँच सप्ताह से पहले ही निकल आती है। इस के बाद यह फुंसी कच्चा सख्त फोँडा सा बन जाती है और उस फोँडे के साथ-साथ जाँघों में गिल्टियाँ सी दिखाई देने लगती हैं।

पहली फंसी या कच्चे फेड़े, के छः या सात सप्ताह पश्चात् खसरा जैसे तांबे के रंग के दाने शरीर पर निकलने लगते हैं। दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं जैसे सिर-दर्द, जी का मितलाना, भूख मर जाना, गला भी बँठ जाता है। चंप वाले घाव बगल, गुदा के आस-पास की त्वचा पर दिखाई देने लगते हैं। गुच्छे के गुच्छे बाल झड़ने लगते हैं। ये लक्षण उपदंश के प्रत्येक दशा में नहीं होते।

रोग की तीसरी अवस्था तब आती है जब यह रोग कुछ महीनों या कुछ वर्षों तक रहता है। गहरे घाव शरीर के विभिन्न भागों पर निकलने लगते हैं। बहुधा नाक सड़-सड़ कर गिर जाती है और उन के स्थान पर केवल एक छेद रह जाता है। उपदंश के परिणाम स्वरूप खाँपड़ी की हड्डी के टुकड़े, या शरीर के दूसरे भागों की हड्डियों के टुकड़े, सड़ सकते हैं। उपदंश से मस्तिष्क, चंताओं, हृदय और रक्त वाहिनियों की बहुत से गम्भीर रोग पैदा हो जाते हैं।

चिकित्सा

इस बात की जांच कर लेना बड़े महत्व की बात है कि रोगी को उपदंश ही है या नहीं क्योंकि फिर जितनी जल्दी ही उस की चिकित्सा आरम्भ हो उतना ही उस का ठीक होना अधिक निश्चित होता है। प्रत्येक दशा में किसी कुशल डॉक्टर द्वारा रोग का निदान करवा लेना महत्वपूर्ण है। खून की परीक्षा या सूक्ष्मदर्शक-यंत्र द्वारा परीक्षा करवा कर यह पता चल जाएगा कि यह रोग है या नहीं। उपदंश के लिये कोई घरेलू दवा नहीं है। घर पर जो दवाएं मुँह द्वारा ग्रहण की जाती हैं उन से अपने आप को धोखा देना है।

डॉक्टर इस रोग की चिकित्सा की दो विधियों में से एक चुनेगा। वह पुरानी विधि भी अपना सकता है जो पिछले कई वर्षों के सफल प्रयोग के बाद ठीक मानी जाती है परन्तु साथ ही बहुत लम्बी और कष्टदायक है। इस में एक या दो साल तक आर्सेनिकल कम्पाउन्ड (Arsenical Compound) की सूइयाँ और बिस्मथ की सूइयाँ (Bismuth Injections) अदल-बदल कर लगाई जाती हैं। दूसरी चिकित्सा में अधिक मात्रा में पेनिसिलिन की सूइयाँ लगाने से होती है। बयस्कों के दस या बारह दिन के भीतर चालीस या पचास लाख यूनिट पेनिसिलिन की सूइयाँ लगानी चाहिये। उपदंश की किसी भी चिकित्सा का निर्णय खून की परीक्षा करके किया जा सकता है। इसी से यह पता चलता है कि कौन-सी आँधी लाभ करेगी।

स्त्रियों के रोग



प्रथम मासिक धर्म की चर्चा अध्याय १२ में की जा चुकी है। बहुत से रोग जैसे मासिक धर्म का बन्द हो जाना, बहुत पीडा के साथ मासिक धर्म होना, अधिक मासिक धर्म होना, प्रदर (सफेद पानी-सा जो रजःस्राव के समाप्त होने और फिर आरम्भ होने के बीच महीने भर निकलता रहता है)।

अस्वाभाविक रजोरोध (Amenorrhœa)

साधारणतया लड़कियों को १२ वर्ष की आयु में मासिक धर्म आरम्भ हो जाता है परन्तु ९ वर्ष में भी शुरू हो सकता है और १५ वर्ष की आयु तक भी रजोदर्शन नहीं हो सकता। यदि लड़की का शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो चुका हो और उस का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, तो यदि रजोदर्शन सत्तरह वर्ष की आयु तक भी न हो, तो भी चिन्ता की कोई बात नहीं।

क्षय-रोग वाली लड़की का रजःस्राव तब तक आरम्भ नहीं होता जब तक वह क्षय-रोग से मुक्त नहीं हो जाती।

गर्भाशय तथा डिम्ब-कोषों के अपूर्ण विकास से या योनि-मार्ग के बन्द होने के कारण से भी मासिक धर्म नहीं होता। डॉक्टर आसानी से बता सकता है कि इन में से इस का कारण कौन सा है।

जलवायु-परिवर्तन के कारण या आंत्र-ज्वर, लाल-ज्वर या जुकाम जैसी बीमारियों में भी रजःस्राव आरम्भ होने के बाद फिर बन्द हो जाता है; यदि ऐसा हो तो चिन्ता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस प्रकार शरीर अपनी शक्ति को सुरक्षित रखता है और रजःस्राव उचित समय पर फिर होने लगता है।

चिकित्सा

मासिक धर्म के न होने के इतने विभिन्न कारण होते हैं कि प्रत्येक दशा में चिकित्सा करने का उद्देश्य उस के कारण को मिटा देना चाहिये। विवाहित स्त्री को यह याद रखना चाहिये कि रजःस्राव का बन्द होना उस का गर्भवती होना भी हो सकता है।

मासिक धर्म को जारी करने के निम्नीलिखित चिकित्सा आदि उपयोगी हैं: यदि लड़की को पीछे का भोजन न मिलता है तो उसे अधिक मात्रा में अच्छा भोजन देना चाहिये। उसे कड़ा काम करने पर बाध्या नहीं करना चाहिये। उसे सके तो घर से बाहर प्रतिदिन व्यायाम, और रात को ८ या ९ घंटे की नींद उपयोगी उपाय हैं। यह भी बहुत संभव है कि उसे कब्ज है और इस की चिकित्सा २५वें अध्याय में वर्णित विधि के अनुसार करनी चाहिये। जिस लड़की को कभी रजःस्राव न हुआ है उस के पेट को साफ करने के लिए उसे गर्म पानी का अभिमा दीजिये। इस के उपरान्त ११० डिग्री फ. तापमान के पानी में उसे दस मिनट तक बैठाना चाहिये जिस से उस के बीस्त-गह्वर के अंगों को सेंक पड़े, चूंकि पर दूसरे बरतन में गर्म पानी में रहे और ठंडे पानी में भीगा कपड़ा सिर पर रख दिया जाए (देखिये अध्याय २१)। एस्ट्रोजेनिक मटेरियल (Estrogenic Material) की सुइयां भी लाभकारी होती हैं। गर्म पानी का अभिमा और बीस्त-गह्वर के अंगों को सेंकने के लिए गर्म पानी में बैठना (Sitz bath) ड्र या सदी लगने से रजःस्राव बन्द होने की चिकित्सा के लिए भी उपयोगी होता है।

अधिक रजःस्राव

अत्यधिक रजःस्राव होने के अनेक कारण हैं। गर्भाशय के रोग से भी प्रायः अधिक रजःस्राव हो सकता है। यह बहुधा प्रसव या गर्भभार के पश्चात् होता है जब कि बच्चा पैदा होने के पश्चात् झिल्लियों के टूटने से रजःस्राव होता है, या जब गर्भाशय का मुंह फट जाता है। कभी-कभी असावधानी करने पर या प्रसव काल में मंले और गन्दे प्रबन्ध द्वारा, या रजःस्राव के समय गन्दे कागज और कपड़ों का प्रयोग करने से रोग कृमि गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं। इन दशाओं में रजःस्राव प्रायः अधिक कष्ट के साथ और अधिक मात्रा में होता है।

इन दशाओं में घरेलू इलाज करना अत्यंत कठिन हो जाता है। किसी अस्पताल में जाना या किसी डॉक्टर का इलाज करना अधिक लाभप्रद होता है जब यह सम्भव हो तो यौन में गर्म पानी की पिचकारी दी जाए (देखिये अध्याय २१)। इस पिचकारी के लिए पानी उतना गरम हो जितना सहन किया जा सकता है और इस के पश्चात् बाह्य जननेन्द्रियां और जांघों को ठंडे पानी से अंगोष्ठना चाहिये। रजःस्राव के समय चारपाई पर लेट कर आराम करना आवश्यक है।

इस विकार का एक साधारण कारण युवतियों में दीर्घकाल 'हारमोन' की गड़बड़ है। डॉक्टर ही जरूरी हारमोन दे कर रजःस्राव को प्रसम अवस्था में ला सकता है।

कष्ट रजता

प्रसवतः, रजःस्राव के समय कष्ट हो सकता है, परन्तु यदि कष्ट हो तो उस का कारण रोग की दशा होती है। अधिक मात्रा में रजःस्राव होने में भी कष्ट होता है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। दर्द वाले रजःस्राव में दर्द पीठ में या एक हिस्से में हो सकता है।

कभी-कभी उदर के निचले भाग में भार सा लगता है या गर्भाशय के भाग में तीक्ष्ण पीड़ा होने लगती है। ये पीड़ाएं लगातार नहीं होतीं, बल्कि समय-समय पर होती हैं।

चिकित्सा

पीड़ा से होने वाले रजःस्राव की बहुत सी दशाओं में जाना या डॉक्टर की सहायता लेना आवश्यक है। गर्भाशय प्रायः रोगग्रस्त हो जाता है और इस का इलाज केवल डॉक्टर ही कर सकता है।

घर में की जाने वाली चिकित्सा इस प्रकार की है। रजःस्राव के कुछ दिन पूर्व रोगिणी को कुछ देर गर्म पानी में पैर डाले रखने चाहिए और यौन में गर्म पानी की पिचकारी देनी चाहिए। अगले दिन रोगिणी गर्म पानी में बैठ कर कुछ देर बीस्त्र-गह्वर के अंगों को संकोच सकती है। यदि उसे कब्ज है तो उसे गर्म पानी का आनिमा भी दिया जा सकता है। (यौन में गर्म पानी की पिचकारी और आनिमा आदि के लिए देखिये अध्याय २१)। ये चिकित्साएं यदि सोने से कुछ देर पहले की जाएं तो अच्छा रहता है। रजःस्राव के समय उदर के निचले भाग पर कपड़े से गर्म पानी की संकोच या गर्म पानी की बोतलों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रचुर मात्रा में गर्म पानी पीना भी उपयोगी है।

श्वेत प्रदर (Leucorrhœa)

श्वेत प्रदर रोग में यौन से स्राव होता है। इस के साथ-साथ कमजोरी, सिर-दर्द, गर्भाशय में पीड़ा और यौन के मुह पर कुछ खजली होने लगती है। श्वेत-प्रदर की चिकित्सा करते समय डॉक्टर की राय ले लेना या अस्पताल जाना लाभप्रद होता है।

इस का कारण ठंड लगना, अधिक काम करना, पौष्टिक भोजन न करना अधिक सहवान व हस्तमथन या गर्भाशय का कंठ रोग होता है। सृजाक श्वेत-प्रदर का एक सामान्य कारण है।

इसकी चिकित्सा रोग के कारण पर ही निर्भर करती है। घर में की जाने वाली सब से उपयोगी चिकित्सा यौन में गर्म पिचकारी देना है। १२० डिग्री फ. तापमान का तीन से चार सेर तक पानी लीजिए, उस में आठ चमच बोरिक ऐसिड या एक चम्मच परमैंगनेट ऑफ पोटाश (Permanganate of Potash) मिलाइये। यदि परमैंगनेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना है, तो उसे डेढ़ पाव पानी में मिला कर अच्छी तरह हिला लेना चाहिए जिस से वह अच्छी तरह घुल जाए और फिर शेष पानी को मिला लीजिए। यह उपचार प्रतिदिन कीजिए। गर्म आनिमा एक सप्ताह में तीन बार लेना चाहिए। यौन में पिचकारी देने का तरीका अध्याय २१ में देखिए।

बाह्य जननोद्गियों के रोग

यौन के मुख के पास खजली, जलन और फूसियां गन्दी से होती हैं। यौन के बाहरी अवयवों को धोना चाहिए। भगोष्ठ भीतरी परतों की सलबटों को धोना चाहिए।

यौनि के मुख पर खजली, लाली और सूजन हस्तमथन, सूजाक, ह्वेतप्रदर, अप्रसव पेन्हाब या रजसाव के समय कड़े, कागज या गन्दे कपड़ों का प्रयोग करने से होती है।

चिकित्सा

इसके कारण को अवश्य दूर करना चाहिए। यदि यौनि से साव के कारण दर्द और सूजन होती है, तो चिकित्सा उस साव को रोकने की ही होनी चाहिए। यदि उस का कारण हस्तमथन है तो उस को छोड़ देना चाहिए।

यह जूओं के कारण से भी हो सकता है, यदि ऐसी बात है तो परीक्षित में दिये हुए नुसखे नं. २१ का प्रयोग कीजिए। यदि गुदा के मुँह और आंतों के सिरों पर खजली होती है, तो उसका कारण सूत्र-कृमि (Thread worms) हो सकते हैं और २२ वें अध्याय में दिए उपचार प्रयोग किया जाए।

नुसखे नं. २२ के अनुसार खजली होने वाले भाग को धोना उपयोगी सिद्ध होगा। इस दवा से धोकर, नुसखे नं. २३ या ११ की दवा मालिश। यदि छाले हों तो थियो-जोल मलहम लगाइए।

गर्भाशय और डिम्ब-ग्रान्थियों (Ovaries) के रोग

पीठ में पीडा, उदर के निचले भाग में प्रसव की सी पीडा, पेट का फूलना, उबड़, यौनि साव में दुर्गन्ध एवं बहुत से अन्य लक्षण गर्भाशय और डिम्ब ग्रान्थियों के किसी रोग के कारण ही प्रकट होते हैं। यदि ये लक्षण कुछ समय तक जारी रहें और ऊपर लिखी चिकित्सा से इनका इलाज न हो सके, तो रोगिणी को किसी अस्पताल या किसी योग्य डॉक्टर के पास जाना चाहिये और अपनी परीक्षा और इलाज करवाना चाहिये। इन लक्षणों को प्रकट करने वाले बहुत से रोग तो बहुत गम्भीर होते हैं और यदि उन पर ध्यान न दिया जाए तो खीघ्र ही रोगिणी की मृत्यु हो जाती है।

बांझपन

बच्चों जनने की अयोग्यता स्त्रियों में जननोन्मूलकों के अपूर्ण विकास के कारण या सूजाक से या गर्मी जैसी बीमारियों से या अन्य गम्भीर कारणों से हो सकती है। जांच द्वारा डॉक्टर बतला सकता है कि स्रव्यक्रिया या आषीध द्वारा इस की चिकित्सा सम्भव है। चूंकि कारण सदा स्त्री में ही नहीं होता, डॉक्टर पुरुष की इस लिए परीक्षा करे। प्रयोग द्वारा डॉक्टर बता सकेगा कि 'बांझपन' पुरुष में है या नहीं।

बांझपन की कुछ स्थितियों का कारण कोई भयंकर रोग नहीं होता और इनका घर पर ही इस प्रकार उपचार किया जा सकता है—

गर्भवती न होने का कारण अधिक सहवास भी हो सकता। अधिक-से-अधिक

सहवास महीने में एक-दो बार होना चाहिए और वह भी रजसाव से पहले या बाद (देखिए अध्याय १९) ।

कभी-कभी गर्भाशय या योनि 'सावों' के कारण स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती क्योंकि ये शुक्र-कोशिकाओं को नष्ट करते हैं । यह दशा प्रतीतिदिन योनि में बोरिक एसिड की पिचकारी देने से दूर हो सकती है । ३ सेर पानी में आधा आंस बोरिक एसिड मिलाकर घोल तैयार करना चाहिए । पानी उतना गरम हो जितना सहन किया जा सके । सहवास के समय और उसके बाद कुछ दिनों तक यह पिचकारी बन्द कर देनी चाहिए । सहवास के बाद स्त्री को कई घंटे चुपचाप बिस्तर पर लेट कर आराम करना चाहिए ।

यदि स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा न हो, तो उसे अपना शरीर बनाने के लिए चिकित्सा करानी चाहिये, उसे अच्छा पोष्टक भोजन करना चाहिये । उसे इतना काम करने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिए कि वह निरन्तर थकान अनुभव करती रहे ।

अध्याय ३३

चर्म रोग

जुलीपली (जाम-वात)—Hives (Urticaria)

कभी-कभी शरीर-चर्म, भोजन, डंक-विष, गमीं सदी, पराग (Pollen) अथवा चेतनाओं में गड़बड़ाई इत्यादि द्वारा अत्यन्त झीझू प्रभावित हो जाने वाली दशा को प्राप्त हो जाता है । जब त्वचा इतनी कमल और अ-सहिष्णु (Sensitive) हो जाती है तो प्रतिक्रिया के रूप में चर्म-कोशों में हिस्टामाइन (Histamine) नामक विष उत्पन्न होने लगता है । इस विष से छोटी रक्त-वाहिनियों फैल जाती हैं और उन में से रिस कर द्रव (Fluid) स्थान-स्थान पर त्वचा में पहुँच जाता है; जिस से उन स्थानों में सूजन और भयंकर खुजली होने लगती है ।

जुलीपली के अन्य प्रकार हैं जिन की चिकित्सा में डॉक्टर लोग एंटी-हिस्टामाइन (Anti-histamine) की सुइयाँ (इन्जेक्शन) लगाते हैं । इस के रोगी को मछली, पनीर, चाँकलेंट, प्याज, लहसून, छत्रक (Mushrooms), अचार-चटोनियाँ, अण्डे, नींबू के समान फल (Citrus fruits), तरबूज और सुअर का मांस इत्यादि पदार्थों से परहेज रखना चाहिए; इन्हीं से यह रोग अवस्था उत्पन्न होती है ।

खजली

एक सूक्ष्म कृमि के त्वचा के अन्दर घुस जाने से खजली होती है। प्रायः यह खजली उंगलियों के बीच में कलाई की त्वचा, नाभि या छातियों (स्तनों) में होती है।

लक्षण

खजली होने लगती है और खजाने के परिणाम स्वरूप, फीसियां, लाल दाने निकल आते हैं और चकले पड़ जाते हैं। यह रोग झीघू ही परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्यों को लग जाता है।

रोक-थाम

खजली से बचने के लिए आदमी को खजली वाले रोगी की चारपाई पर नहीं बैठना चाहिए। खजली के रोगी के बिस्तरे या शरीर के दूसरे कपड़े या उसके तालियों का प्रयोग करने से भी दूसरे को खजली हो जाती है।

चिकित्सा

सब से पहले रोगी को अपना शरीर गरम पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। फिर तीन भाग गन्धक और सात भाग बैसलीन या नारियल का तेल लीजिए दोनों को अच्छी तरह मिला कर यह मरहम लगाइए। गन्धक और तेल को ठीक तरह से मिला लेना चाहिये। झीघे के एक टुकड़े पर गन्धक को तेल में लम्बी छुरी से अच्छी तरह मिलाना चाहिए। प्रतिदिन सबरे और रात को, तीन दिन तक शरीर के खजली वाले भागों में इसे मालिये। इन तीन दिनों में बिस्तर या शरीर के कपड़े न बदलिये। तीन दिन के बाद गरम पानी और साबुन से स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिये और बिस्तर में साफ चादर आदि लगाइये। पुराने कपड़ों और बिछाने की चादर आदि को फिर इस्तेमाल करने से पहले कुछ मिनट तक उबाल लीजिए। खजली के कीड़े को नष्ट करने के लिए यह आवश्यक है।

खजली को अनेक औषधियां हैं जो औषधि विक्रेताओं की दुकानों पर मिलती हैं और जो न केवल अत्यन्त गुणकारी होती हैं, बल्कि उन के प्रयोग की विधि भी सरल होती है। Ascaboil M & B या कोई Benzyl-Benzate Emulsion भी इस के लिए लाभदायक है। लगाने की विधि का छपा हुआ कागज दवा के साथ मिलता है।

जूएं (Lice)

जो लोग अपना शरीर और कपड़े साफ नहीं रखते उनके शरीर और सिर में प्रायः जूएं पड़ जाती हैं। साफ कपड़े पहनने वाले और शरीर को साफ रखने वाले के जूएं नहीं पड़तीं।

शरीर की जूएं खुजली पैदा करती हैं और खुजाने से शरीर के विभिन्न भागों पर घाव हो जाते हैं। जूएं कपड़ों में, विशेष कर उन की सिलाई में पाई जाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए कपड़ों को कुछ मिनट तक उबालना चाहिए।

एक प्रकार की ऐसी जूएं होती हैं जो जननीन्द्रियों के बालों वाले भाग में रहती हैं और कभी-कभी यहाँ से शरीर के दूसरे भागों में भी पहुँच जाती हैं। जूओं को नष्ट करने के लिए शरीर के जूओं वाले भागों को एक आउंस पानी में दो ग्रैन क्रोसिव सबलीमेट (Corrosive Sublimate) मिला कर सप्ताह में एक बार कई सप्ताह तक धोना चाहिए। क्रोसिव सबलीमेट एक घातक विष होता है और इस के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। पोरिश्चट में दिया हुआ नुसखा नम्बर २१ भी जूओं को नष्ट कर देगा।

सिर की जूएं (Head Lice)

जब किसी व्यक्ति के सिर में जूएं पड़ जाती हैं तो मिट्टी का तेल और नारियल का तेल मिला कर हर दिन शाम को, दो-तीन दिन तक बालों में रगड़ने से जूएं मर जाती हैं। बालों में यह तेल मलकर टोपी पहन लेनी या कपड़ा सिर पर बांध लेना चाहिए। गरम पानी और साबुन से प्रतिदिन सबेरे सिर को साफ कर लेना चाहिए। जब मिट्टी का तेल और नारियल का तेल सिर में पड़ा हुआ हो तो रोगी को स्टोव या लैंप के पास नहीं जाना चाहिये। यदि सिर में घाव हों तो थोड़ा-सी वैसलीन या नारियल का तेल लगा कर उसे दबा देना चाहिये।

लीखाँ को दूर करने के लिए आधा सेंर पानी एक चम्मच खाने का सोडा या इतने ही पानी में दो चम्मच सिरका मिला कर हफ्ते में तीन बार सिर धोइये। इस के बाद महीन कंघी से झाड़िये।

दस दिन तक इस तरह का उपचार करते रहिये ताकि कोई लीख न रह जाए।

खटमल

खटमल काट कर केवल दुःख ही नहीं देते, बरन् वे बहुत सी गम्भीर बीमारियाँ फैलाते हैं। कपड़ों या चारपाई से उन्हें दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हें उबलते पानी में कुछ देर तक रक्खा जाए। यदि चारपाई के अंने में खटमल छिपे हों तो एक भाग कार्बोविलक एसिड (या क्रिसोल, या इजाल, या सैनिटास, या फिनाइल) को दस भाग पानी में मिला कर चारपाई के सब जोड़ों और सूरखों में डालिये। तारपीन का तेल भी उपयोगी होता है। डी. डी. टी. छिड़कने से और दस प्रतिशत डी. डी. टी. पाउडर से भी खटमल मर जाते हैं।

मुँहासे (Pimples) या काले मुँह वाली फुँसियाँ (Black Heads)

फुँसियाँ चोहरे, कंधों या पीठ पर निकलती हैं। काले मुँह वाली फुँसियाँ भी इसी प्रकार की होती हैं, केवल उन के मुँह पर एक काला चिन्ह सा होता है।

चिकित्सा

मुँहासे पेट ठीक तरह से साफ न होने तथा किड़ारों में त्वचा में अत्यधिक तेल की मात्रा से पैदा होते हैं। जबकि वे जहाँ तक वे सके मुँहासे रोकने की कोशिश करनी चाहिये क्योंकि इस की रोक-थाम करना चिकित्सा से आसान है। उस वं घर से बाहर व्यायाम करना तथा पर्याप्त मात्रा में विश्राम करना, अधिक पानी पीना, ताज़े फल तथा सब्जियाँ, विशेष कर पत्तीदार तरकारियाँ खाना चाहिये। उस वं तली हुई चीज़ों, मिठाइयों और चिकनी मीठी चीज़ों से परहेज करना चाहिये। रोज नहाना चाहिये और साधारण साबुन के खूब झाग उठा कर दिन में तीन बार मुँह धोना चाहिये। यदि मुँहासे निकल ही जाएँ और उन के मुँह वं खोलने की जरूरत पड़े, तो साफ सूई से खोल कर अहिस्ते से दबाइये, परन्तु मीचिये नहीं। जब तक दाग सूख न जाए, कपूर का सत लगाते रहिये। छायों वं मुँह से दूर रखिये ताकि संक्रमण न हो।

घमोरी

बहुत गर्म मौसम में बच्चों के और कभी-कभी बड़ों के लाल दूदोड़े, या बहुत छोटो-छोटो दाग त्वचा पर निकल आते हैं। ये पसीना निकलने से उत्पन्न हो जाते हैं।

चिकित्सा

त्वचा वं ठंडे पानी से अंगोछिये और फिर उस पर निम्नीलीखत आँधी लगाइये: ५ ग्राम सल्फाथियोजोल पाउडर को एक आँस गेहूँ के आटे या इबेतसार (Starch) में मिलाइये। यदि इबेतसार न मिल सके तो टेलकम पाउडर में ही मिलाइये।

एक्जिमा

छरीर की त्वचा पर इस के चकत्ते पड़े जाते हैं। छरीर पर लाली, खुजली होती है और खुजली बाले स्थान रिसने लगते हैं। बाद में एक पपडो सी बन जाती है। एक्जिमा चेहरे, खाँपडो के पास त्वचा की तहों में होता है।

चिकित्सा

एक्जिमा प्रायः त्वचा की अत्यन्त शीघ्र प्रभावित हो जाने वाली दवा से होता है। हो सकता है कि यह रोग किसी विशेष भोजन के कारण हो। साबुन और पाउडर आदि के दूषप्रभाव से भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि त्वचा किसी पाँधे, पशु या किसी घरेलू जानवर के स्पर्श से प्रभावित हुई हो। मांस, दूध, अंडे या अन्य पशु-पक्षियों से प्राप्य खाद्य पदार्थों, गेहूँ के पदार्थों, टमाटर, समुद्रीय खाद्य पदार्थों या दूसरे कम महत्व

बाले भोजनों से भी यह रोग होता है। इस की चिकित्सा इस प्रकार हो सकती है कि पहले तो उस वस्तु का पता लगाया जाए जिस से यह रोग बढ़ता है, और फिर यदि वह वस्तु खाने की है, तो उस से परहेज किया जाए और यदि और कोई चीज है, तो उस से अलग रखा जाए। खाने की चीज एक-के-बाद-एक छोड़ कर या जानवरों आदि को दूर कर के रोग उत्पादक वस्तु या जानवर का पता लगाना सम्भव है। उदाहरण के लिये हम एक ऐसे बच्चे को जिस को छः महीने की आयु में ही यह रोग लग जाता है और तीन साल तक बढ़ता जाता है। कोई दवा फायदा नहीं पहुँचाती। जांच-पड़ताल करने पर पता चलता है जब बच्चा ६ महीने का था तो उस की माँ बीमार पड़ गई थी। बच्चे को माँ का दूध दिया जाने लगा जो अनुकूल जान पड़ा और फिर उस दूध की मात्रा बढ़ती गई। माँ के दूध के बदले बकरी का दूध आरम्भ करने पर चमत्कारी रूप से रोग दूर हो जाता है और उस के कारण के विषय में भी कोई सन्देह नहीं रहता।

कभी-कभी एक्जीमा के दानों में विष फैल जाता और इस दशा में सल्फायियाजोल मरहम लगाना अच्छा होता है। पुराना रोग लगातार विटामिन बी, कम्प्लेक्स अधिक मात्रा में प्रयोग करने से जाता रहता है।

दाद (Ring Worm)

दाद त्वचा का ऐसा रोग है जो शरीर के किसी भी भाग पर फैल सकता है। यह एक रोग-कृमि द्वारा उत्पन्न होता है। यह कृमि उस भाग के ऊपर की फफुन्दी जैसा होता है जो भाग गत भर धाली में रक्खा रहता है।

यह रोग इस के रोगी के शरीर या उस के कपड़े, तौलिये, बिस्तर आदि के सम्पर्क से दूसरों को लग जाता है। यह आसानी से फैल जाता है इसीलिये जिन बच्चों के शरीर या सिर पर दाद हो, उन्हें तब तक स्कूल नहीं भेजना चाहिये जब तक उन का रोग ठीक न हो जाए।

दाद का आरम्भ में एक छोटा सा लाल या भूरे रंग का धब्बा बनता है और फिर चारों ओर फैल जाता है। कुछ समय पश्चात् इस धब्बे के बीच का बिन्दु त्वचा के रंग का हो जाता है। ऐसा होने पर यह रोग दायरा सा दिखाई देने लगता है। खजली यह कहती है।

चिकित्सा

विटफील्ड (Whitfield's) का मरहम रूग्ण स्थान पर धीरे-धीरे रगड़ कर लगाइये। यदि दाद किसी कंठल स्थान पर या बच्चों के हो तो आधी ही शक्ति के मरहम का प्रयोग किया जाए।

दाद और छत्रक की जाति के पाँधों के स्पष्ट से उत्पन्न अन्य चर्म-रोगों (other fungus infections of the skin) की चिकित्सा के लिए सब से बौढ़ या वह मरहम

हैं जो “Desenex” के नाम से (यह इस की व्यापार संज्ञा है) बिकता है और जिस में प्रमुख तत्व अम्ल होता है।

सिर का दाद

सिर का दाद प्रायः बच्चों में होता है। बाल सफेद हो जाते हैं या झाड़ने लगते हैं। पपड़ों वाले बड़े-बड़े घाव सिर में हो जाते हैं। कभी-कभी सिर के सब बाल झाड़ जाते हैं।

चिकित्सा

सिर का दाद सिर के बालों को छेटा कराए बिना दूर नहीं हो सकता। दाद वाले स्थानों पर उस्तरा फिरा देना सब से अच्छा उपाय है। बाल साफ कर के वही चिकित्सा की जा सकती है जो ऊपर दूसरे दादों के लिये बताई गई है। एक प्रकार का सिर का ऐसा दाद होता है जिस की चिकित्सा कीठन होती है और यदि ऊपर लिखे उपायों से वह ठीक न हो तो किसी योग्य डॉक्टर की राय लेनी चाहिये नहीं तो रांग बढेगा और सिर गंजा हो जाएगा।

फोड़े और त्वचा के घाव

जिन बालकों को साफ रक्खा जाता है उन के शायद ही कभी घाव हों। घावों को साबुन और पानी से साफ करना चाहिये या किसी कीटाणु नाशक घोल से धोना चाहिये।

जो घाव अच्छे होने में न आते हों, उन को साबुन मिले गर्म पानी से धोते रहिये यहाँ तक कि खुरंद उतर जाए। ५ प्रतिशत सल्फाथियाजोल (Sulphathiazole) या २ प्रतिशत अमोनिया मिश्रित मरकरी (Ammoniated Mercury) मरहम लगाना चाहिये। यदि घावों को रूई से ढक कर पट्टी बांध दी जाए, तो जल्दी अच्छे होते हैं। इस से दवा घावों के ऊपर रहती है और खुरंद नहीं बन पाते, क्योंकि खुरंदों के नीचे यदि किसी पुराने घाव का मुंह बन्द हो जाए, तो घाव अच्छे नहीं होते।

फोड़े का मुंह खोलने से पहले अच्छा होगा कि उसे नरम करने के लिए गर्म पानी में भिगो कर निचोड़ा हुआ कपड़ा लगाया जाए। साफ और तेज चाकू से घाव के मुंह को खोल देने के बाद बीच में से उस को दबाइये। फोड़े के इर्द-गिर्द न दबाइये, इस से घाव बढेगा। इस के बाद सल्फाथियाजोल मरहम लगाकर पट्टी बांध दीजिये।

बड़े खूले हुए कच्चे घाव की अच्छी चिकित्सा यह है कि साफ कपड़े को एक चम्मच नमक और एक प्याले पानी के घोल में भिगो कर और उस की दो-तीन तहें कर के घाव पर लगाइये। इस नीले कपड़े पर तेल-चूपड़ा कागज रख कर ऊपर से पट्टी बांध दीजिये। घंटे-घंटे भर बाद कपड़े को नमक के पानी में भिगोते रहिये। यह चिकित्सा अत्यन्त उपयोगी है।

Yaws—याँज

(एक प्रकार का चर्म रोग जिस में फफ़ेले पड़ जाते हैं)

यह रोग एक विशेष प्रकार के कीटाणु द्वारा उत्पन्न होता है और अत्यन्त संक्रामक होता है। प्रारम्भिक लक्षणों में सब से पहले साधारणतया टांगों या पैरों में किसी स्थान पर फफ़ेला सा दिखाई देने लगता है। इस रुग्ण स्थान में दर्द तभी होता है जब उसे जोर से दबाया जाए। रोग की दूसरी अवस्था ६ सप्ताह से लेकर तीन महीने के बाद उत्पन्न होती है। छेटी-छेटी चपटी-सी फुंसियां पैदा हो जाती हैं और फिर ये फुंसियां अनेक आकार के पीले परत वाले घावों या ब्रणों का रूप धारण कर लेती हैं। कुछ सप्ताह के अन्दर घाव सूख जाते हैं और परत या खुरदरा गिर जाते हैं। उन के स्थान में पीले धब्बे रह जाते हैं जो कालान्तर में गहरे रंग के हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में एक चिरस्थायी प्रकार का ब्रण उत्पन्न हो जाता है जो अन्य स्थानों की अपेक्षा नाक के आस-पास अधिक दिखाई देता है। ऐसे घाव बहुधा चेहरे को विकृत कर देते हैं।

इस रोग के इलाज में मैफार्सिन (Mapharsin) नियोअर्स्फेनेमिन (Neoarsphenamine) और पेनिसिलिन (Penicillin) प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। किसी सुयोग्य चिकित्सक से ही इस का इलाज करवाना चाहिये।

आँख और कान

आँख में चिंगारी या बाहर से किसी और अन्य वस्तु का पड़ जाना

जब आँख में चिंगारी या धूल का कण आदि पड़ जाए, तो आँख को उंगली से कभी नहीं मलना चाहिये और न ही रुमाल से उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करना चाहिये। रोंगी को लिटा दिया जाए। अंगूठे और उस के पास वाली उँगली (तर्जनी) से आँख खोल कर थोड़ा सा बोरिक एसिड (boric acid) डाल दीजिये। इस से जो कुछ आँख में पड़ा होगा, निकल आएगा।

यदि इस विधि से चिंगारी आदि न निकले, तो पलक को उलट देना चाहिये। रोंगी से कहिये कि नीचे की ओर देखे। अब बरोनी और पलक के सिरों को दाहिने हाथ की उंगली और अंगूठे से पकड़ लीजिये; ध्यान रहे कि हाथ अच्छी तरह धो कर साफ कर लिए गए हों। एक छोटी सी पेंसिल या बांस की चपती से ऊपर की पलक को दबाइये और उसी समय नीचे की पलक को, ऊपर को और बाहर को, उठाइये, जिस से पलक का भीतरी भाग उलट कर बाहर निकल आए (देखिये चित्र पृष्ठ २६६)। जो कुछ आँख में पड़ा हो, उसे साफ कपड़े से निकालते समय पलक को इसी दशा में रक्खा जाए। आँख में जो कुछ पड़ गया हो उसे निकालने के बाद पीछा को कम करने के लिए बोरिक एसिड को दो-चार बूंदें आँख में डाल दीजिये।

यदि आँख में चुने का छँटा सा टुकड़ा पड़ गया हो, तो आँख को सिरके और पानी के घोल से धो डालिये (एक छोटा चम्मच भर सिरका और आधा गिलास पानी)।

पलक के सिरों का सूज जाना—चौकत्सा

पहले पलकों को गरम पानी से धो कर सूखी पपीड़याँ निकाल डालिये। पलक के ढीले बालों को खींच कर निकाल दीजिये। फिर रोज रात को थोड़ा सा सल्फाथायोजोल मरहम लगा दीजिये।

गुँथीयाँ (Styes)

पलक पर एक छोटी गाँठ सी निकल आती है—इसे गुँथी कहते हैं। यदि यह बार-बार निकले तो किसी आँख के डॉक्टर को आँखें दिखानी चाहिये क्योंकि कभी-कभी रोंगी को चक्ष्मा लगाने की आवश्यकता हो सकती है।

चिकित्सा

पलक को बहुत गरम पानी से धो डालिये। गुहरी में के बाल निकाल दीजिये और फिर लकड़ी की दांत खोदनी या छोट्टी पतली लकड़ी की सलाई के सिर के टिक्कर



दवा डालते समय पलक ऊपर को कर लिया गया है।

आइयोडीन में भिगो कर उसे उस छेद में डालिये जो बाल निकालने से हो गया था। जब गुहरी में से पीप निकल आए तो जो मरहम पलक के किनारे की आंख के लिए ऊपर बताया जा चुका है वही इस छेद पर लगा दीजिये।

आंख का उठना (Conjunctivitis)*

आंख के उठने के साधारण कारण ये हैं—आंखों में धूल या मल पड़ जाना, उंगलियों से आंखों को बन्दे कपड़े, या रुमाल से मलना, तालाब के पानी से मुँह साफ करना, जिन चिलमीचियों और तौलियों का इस रोग के रोगियों ने प्रयोग किया हो, उन्हें काम में लाना और मक्खियों को आंखों पर बैठने देना। सब प्रकार के गम्भीर नेत्र-रोग बहुत संक्रामक होते हैं और तौलिये, रुमाल, साबुन और चिलमची द्वारा एक दूसरे को

*इस रोग में आंख के परदे की भीतरी झिल्ली फूल जाती है।



छोटी सी लकड़ी या पोंसल पलक के ऊपरी भाग पर रख दीजिये और उंगली से पलक को आंख के डले (eye-ball) पर से हटाइयें। इस प्रकार आंख में जो कुछ पड़ गया है वह भी आसानी से देखा जा सकता है और पलकों का कोई रोग भी।

लग जाते हैं। अतः यदि परिवार के एक सदस्य की आंखें उठ जाएं, तो घर के किसी भी व्यक्ति को उस का प्रयोग किया हुआ तौलिया, चिलमची या साबुन नहीं छूना चाहिये। रोगी की चिकित्सा करने वाले को दवा आदि लगाने के बाद हर बार अपने हाथ गरम पानी और साबुन से धो लेने चाहिये। मक्खियां भी रोग फैलाने का एक साधारण साधन हैं, इसीलिए उन्हें बच्चों की आंखों से दूर ही रखना चाहिये।

यदि बच्चे की आंखों में से बहुत गाढ़ी सफेद या पीली पीप निकले तो उस का कारण प्रमह-कृमि होता है। यह आंख के रोगों में बहुत भयंकर होता है और प्रायः अंधापन का कारण होता है। चिकित्सा के लिये रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिये। यदि डॉक्टर की चिकित्सा न हो तो रोगी अवश्य अंधा हो जाएगा। इस प्रकार का रोग नवजात शिशुओं को होता है। इस रोग से बच्चों को बचाने के लिए आर्जीरोल (Argyrol) के घोल की कुछ बूंदें बच्चों के पैदा होते ही उस की आंखों में डाल देनी चाहिये। (देखिये परिशिष्ट, नुसखा नम्बर ३)

चिकित्सा

आंख उठने के रोग को प्रत्येक दशा में खतरनाक समझना चाहिये। इस का परिणाम अंधापन भी हो सकता है। आंख की बहुत सी बीमारियों में जब आंखों में से पीप निकलती है तो उस का कारण कॉक्सी (Cocci) नामक रोग-कृमि होता है। शायद उस से भी अधिक खतरनाक गोनोकोक्सी (Gonococci) रोग-कृमि होता है जिस से सृजाक होता है। किसी-न-किसी रूप में सल्फा के प्रयोग द्वारा कॉक्सी नामक कृमियों पर नियंत्रण रक्खा जा सकता है। अतः सल्फाथियोजोल मरहम आंख में लगाना चाहिये और यदि हो सके तो मुंह द्वारा सल्फाथियोजोल शरीर में पहुंचाया जाए। इस मरहम को आंख में दिन में तीन-तीन या चार-चार बार धीरे-धीरे डालना चाहिये और आंख पर पट्टी बांध देनी चाहिये, परन्तु कस कर नहीं।

विशेष रूप से आंखों के लिए बना हुआ सल्फायोमाइसिन, पीनीसिलिन, टेरा-माइसिन (Terramycin) और औरियोमाइसिन (Aureomycin) के मरहम का प्रयोग करना चाहिये।

रोहें (Trachoma)

यह बहुत गम्भीर प्रकार का नेत्र-रोग है। यदि इस के रोगी की पलकों को उलट कर देखा जाए, तो पलकों में अनियमित छोटे-छोटे दाने दिखाई देंगे। इस की चिकित्सा वही है जो ऊपर आंख उठने के रोग के लिये बतलाई गई है और उस के साथ-साथ तृतीय (Copper Sulphate) का घोल और अन्य औषधियां भी रोग को दूर करने के लिये इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। यह संक्रामक रोग है और इस के विषय में डॉक्टर से अवश्य परामर्श करना चाहिये।

दूर की चीजें दिखाई देना, पास की चीजें दिखाई देना—आंखों में दर्द

प्रसंगतः यदि यह पुस्तक आंखों से एक फुट की दूरी पर रखी जाए, तो इस का छापा पड़ा जाना चाहिये। यदि इस पुस्तक को पास रखने की आवश्यकता पड़े, तो समझ लीजिये कि चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। पढ़ते समय अक्षरों का धुंधला हो जाना, आंख के ढेलों में दर्द होने लगना, ठीक आंख के ऊपर दर्द होना, सिर-दर्द होना— ये सब इस बात के लक्षण हैं कि आंखों की रोखनी कम है। इस का इलाज करने के लिये आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिये जो आंखों की परीक्षा कर के चश्मा दे सकता है। जो लोग स्थान-स्थान पर चश्मे बचते फिरते हैं उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये।

कान के रोग

बहरापन

कान का छेद एक इंच गहरा होता है। कान के छेद के भीतरी छोर पर एक झिल्ली होती है जो कान का परदा कहलाती है। (देखिये अध्याय ११ का चित्र)। इस छेद पर मल जमा होने से आदमी बहरा हो सकता है। रोगी के अचानक बहरा हो जाने का कारण कान में मल जमा हो जाना है।

इस मल को निकालने के लिए एक छोटा चम्मच भर खाने का मोड़ा, तीन या चार चम्मच गरम पानी में मिला कर घोल तैयार कीजिये। बाएं कान का मल निकालने के लिये रोगी को दाईं तरफ लिटाइये और थोड़ा सा कुछ गरम घोल उस के कान में डालिये। इस पानी को कान में कुछ मिनट तक पड़ा रहने दीजिये जिस से मल पिघल जाए, और फिर एक छोटी पिचकारी द्वारा थोड़ा सा गरम घोल कान का मल निकालने के लिये डालिये। यदि पिचकारी न मिल सके तो लकड़ी की सलाई के छोर पर थोड़ी सी रई

लपेटिये। यह ध्यान रहे कि सलाह के छोर पर ही रुई लगी रहे। कई बार बड़ौ सावधानी से इसे कान के छेद के भीतर डालिये और बाहर निकालिये। ऐसा करने से मूल बाहर निकल आया। यह ध्यान रहे कि सलाह के छेद में इतना अन्दर न डाला जाए कि यह कान के परदे का स्पर्श करने लगे, क्योंकि कान के परदे पर आसानी से चोट आ सकती है।

धीरे-धीरे अनुभव होने वाले बहरेपन और बहुत दिनों से चला जाने वाले बहरेपन का कारण नाक, गले या कान के बीच के भाग (मध्यकण) का रोम होता है। ११वें अध्याय का चित्र देखने से पता चलेंगा कि गले और कान के बीच में एक छेद होता है। जब किसी को जुकाम होता है या उस का गला बंद जाता है, तो नाक के जोर से छिनकने से कृमि उस के कानों तक पहुंच सकते हैं और वह बहता हो सकता है। बड़े, हए गलसए और गद्द भी बहरेपन का कारण होते हैं। (चिकित्सा के लिये देखिये अध्याय २९)

जब कोई कीड़ा या दूसरी वस्तु कान में घुस जाए तो क्या करना चाहिये

जब कोई कीड़ा कान में घुस जाए तो नारियल या मूंगफली का तेल डाल कर उसे नष्ट कर डालना चाहिये और पिचकारी से उसे बाहर निकाल देना चाहिये। यदि दिखाई दे तो चिमटी से निकाल लेना चाहिये। कभी-कभी कान के पास रोशनी करने से कीड़ा निकल आता है।

कंकड़, या मटर के दाने जैसे ठोस पदार्थ को निकालने के लिये कान को नीचे कीजिये, कान को पकड़ कर आगे और पीछे की ओर खींचिये और कान के छेद के सामने की त्वचा को मलिये। ऐसा करने से कभी-कभी कंकड़ या दाना बाहर निकल आता है। यदि कान में सेम का दाना या और कोई बीज पड़ा हो तो उस में थोड़ी सी शराब डाल दीजिये जिस से वह फूल न जाए। यदि ऊपर लिखे उपाय सफल न हों, तो डॉक्टर की सम्मति लेनी चाहिये, क्योंकि कान में से कोई वस्तु बाहर निकालने के प्रयास में कान को बहुत हानि भी पहुंच सकती है।

कान की पीड़ा

कान की पीड़ा बहुधा नाक और गले में सर्दी लग जाने के कारण या मध्यकण में सूजन हो जाने से होती है। बड़े, हए गलसजों और गद्दों द्वारा कान में बहुत पीड़ा होती है, जोर से नाक छिनकने पर भी कान में पीड़ा होती है। रातें लगाने या लहानों में स्नान करने से भी यह दर्द होता है।

चिकित्सा

रंगी को लेंट जामा चाहिये और कान को गरम पानी की रबड़ की थली या बांतल पर रखे रहना चाहिये। जितना सहन हो सके उतना गरम पानी दो-दो घंटे बाद कान में डालिये और फिर रुई से सूखा दीजिये। ग्लिसरीन में १ प्रतिशत फिनाइल मिलाइये,

और शीशी को गरम पानी में डाल कर गरम कर लीजिये, और कान में डालिये। साधारण पीड़ा जाती रहेगी। फिर कान में रुई लगा दीजिये।

यदि यह पीड़ा १२ घंटे तक या उस से अधिक समय तक होती रहे तो डॉक्टर की राय लेनी चाहिये।

कान का बहना

कान के दर्द के पश्चात् जब कान बहने लगे तो यह स्पष्ट होता है कि कान में पड़ो पीप ने कान के पर्दे को फाड़ दिया है। कानों के बहने की सब से अच्छी चिकित्सा यह है कि रुई का परेहा बना कर और उसे अच्छी तरह पेनीसिलिन में भिगा कर कान में डाला जाए, इससे तुरन्त आराम होता है। पेन्सिलीन के भीतर पेनीसिलिन की सुइयां लगाने (intramuscular penicillin injections) से या ट्रिपलसल्फा (Triplesulpha) के सेवन से भी लाभ होता है।

अध्याय ३५

नासूर (कैंसर)

कैंसर किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं, क्योंकि सभी जाति के लोगों में यहां तक कि पशुओं, पक्षियों, मछलियों, पांथों इत्यादि में भी कैंसर का प्रभाव देखा गया है। सभी जातियों के कम-से-कम कुछ लोगों में यह बीमारी अधिकता से पाई जाती है, क्योंकि सभी जाति में जीवन-काल लम्बा होता है और कैंसर विशेषतः बूढ़ापे की बीमारी है। कैंसर की बीमारी स्त्रियों में अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस का प्रभाव स्तनों और गर्भाशय पर अधिक पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को कैंसर के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य रखनी चाहिये, और आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिये जिससे से किसी भी रूप में उन्हें कैंसर की बीमारी न होने पाए। हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को कैंसर की बीमारी होना जरूरी है, परन्तु इस की सम्भावना होती ही है। अतएव हर किसी को इस का मुकाबला करना चाहिये। कैंसर के रक्तरोध की जानकारी आवश्यक है और बौद्धिमत्ता पूर्वक तथा हिम्मत से इस का मुकाबला करना भी सीखना चाहिये। यह जन्मना आवश्यक है

कि अधिक-से-अधिक सिद्ध शल्य चिकित्सक भी उस हालत में कैंसर के बीमार को अच्छा करने में सहायता नहीं पहुँचा सकती जब कि कैंसर का पता लगाने में देर हो जाए और वह बहुत आगे बढ़ चुका हो।

आयद कैंसर की सब से अच्छी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है: कैंसर जीव-विन्दुओं या कोशों (Cell) की वह अनियंत्रित तथा विस्तृत उपज है जो शरीर के दूर-दूर के भागों में फैल कर अन्य ऐसी गौण बाढ़ों, पैदा कर देती है, इन में से विष उत्पन्न हो जाने पर अन्त में रोगी की मृत्यु हो जाती है। नासूर की वृद्धि की गति और उस के द्वारा हुआ विनाश—ये दोनों बातें कैंसर की उत्पत्ति और प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। इस की वृद्धि की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं होती। इस से कोई भी हित साधन नहीं होता। यह अपने रोगी के लिये अन्त में घातक सिद्ध होता है। इस बीमारी में या तो एक ही पंढ बढ़ कर प्राण ले लेता है या प्रसम तन्तुओं के विनाश द्वारा अथवा शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में फैल जाने से उसी प्रकार की परजीविक बाढ़ों (parasitic growths) के कारणा रोगी का प्राणान्त हो जाता है।

किसी स्थान विशेष में जीव-विन्दु, या कोश बढ़ कर सृजन उत्पन्न कर देते हैं जिसे ट्यूमर (Tumour) या ग्रन्थ कहते हैं। सभी ग्रन्थों या गिर्लियों को कैंसर समझना भूल होनी। इन में से कुछ तो क्षति-रहित होते हैं जो फैलने नहीं और प्राण-हीन नहीं करते। ऐसी उपजों को शांत ग्रन्थ और नासूर को दोही या विनाशकारी कहा जा सकता है। शांत गिर्लियों—गर्भाशय की गिर्लियों जैसी गिर्लियों—कभी-कभी बेचैनी उत्पन्न कर देती हैं और उन में से रक्त भी प्रभावित होने लगता है, अतएव उन को निकलवा देना चाहिये। परन्तु ऐसी गिर्लियों से कोई खतरा नहीं होता।

यद्यपि इस प्रकार के रोगों की वृद्धि पर नियंत्रण रखने वाले नियमों का हमें ज्ञान बहुत कम है, तथापि कैंसर के कारण और उस के नियंत्रण के विषय में बहुत कुछ सीखा जा चुका है।

कैंसर उत्पन्न करने वाले अनेक कारणों का पता चल चुका है। इन में से कुछ भाग कालतार का है। कालतार से उत्पन्न होने वाले दूसरे रासायनिक पदार्थ नासूर उत्पन्न करने वाले सिद्ध हुए हैं। इन रासायनिक पदार्थों के अतिरिक्त अब यह ज्ञात हो चुका है कि एक्स-किरणों (X-rays), गामा रीश्मियों (Gamma rays) और नील रीश्मियों (ultra-violet rays) के अधिक प्रभाव द्वारा भी कुछ व्यक्तियों अथवा पशुओं में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। फीता-कृमि (Tapeworm), पट्टे-कृमि (Flatworm) जैसे परजीवी (Parasites) भी शरीर के किसी-किसी भाग में स्थाई-प्रदाह द्वारा कैंसर उत्पन्न कर देते हैं। कोई भी प्रदाह, होते-होते, कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। सह.। हुआ दांत यदि बार-बार जीभ में प्रदाह उत्पन्न करता हो, तो हो सकता है कि जीभ में नासूर पैदा कर दे।

आज-कल यह विचार प्रचलित है कि नासूर पैदा करने वाली ये सब चीजें तुरन्त ही नासूर पैदा नहीं करती, बल्कि उसे कुछ समय तक रोकती हैं। इस नियन्त्रणकारी प्रभाव को रोकने के लिये इर्द-गिर्द के कोशों का आवरण अनियंत्रित बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार नासूर उन जीव-विन्दुओं द्वारा निर्मित होता है जिन्हें कोश कहते हैं। ये कोश

कभी-कभी प्रसम क्लेश जैसे दिखाई पड़ते हैं, परन्तु वास्तव में ये शरीर के लिए चोर-डकैत और विश्वासघाती सिद्ध होते हैं। वे प्रसम शरीर पर आक्रमण करते हैं और शरीर रक्षा के सभी साधनों को तोड़-फेंक देते हैं। शरीर के प्रसम तन्तुओं को नष्ट-भष्ट कर के उन के ऊपर अपनी ही रचना का प्रभाव डालते हैं।

इस बात का पता नहीं कि कैंसर की क्रिया ऐसी क्यों है। प्रसम क्लेश और कैंसर के क्लेश दोनों में असीमित बाढ़ के ऐसे गुण उपस्थित रहते हैं कि यदि उन्हें शरीर के बाहर उगने दिया जाए तो उन की बाढ़ जारी रहेगी। जिस शरीर से इन का जन्म हुआ है यदि उसी में इन क्लेशों को फिर से आरोपित कर दिया जाए, तो प्रसम क्लेश तुरन्त ही शरीर के नियमों का पालन करने लगते हैं। परन्तु नासूर के क्लेश फिर भी डकैतों की तरह नियम तोड़ते रहते हैं।

अभी तक इस बात का ठीक-ठीक पता नहीं चला कि कैंसर कैसे उत्पन्न होता है। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि नासूर एक ऐसी रूग्ण अवस्था है जिस का उदय एक विशेष प्रकार के रोग-विष से होता है। परन्तु यह भी मंथना सम्भव है कि कैंसर किसी एक ही कारण से उत्पन्न न होता हो और जिन कारणों से शरीर के किसी एक अवयव या तन्तु-जाल पर नासूर उत्पन्न होता है, उन का शरीर के किसी दूसरे भाग पर नासूर उत्पन्न करने के कारणों के साथ कोई सम्बन्ध न हो। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर कर देने पर भी जीव-बिन्दु, या क्लेश अपनी अनियमित उत्पीत बने जारी रखते हैं।

कैंसर के अनेक कारण समझे जाते हैं। अनेक लोग समझते हैं कि ये कारण बीमारी को उभारने वाली अवस्थाएँ हैं। यदि इन का बिलकुल अनुकूल परिस्थितियों में आरोपण किया जाए, तो ये जीव-बिन्दुओं या क्लेशों के अन्दर उथल-पुथल पैदा कर सकती हैं और इस प्रकार अनेक स्वाभाविक अभिवृद्धि और आस-पास के क्लेशों तथा समस्त क्लेश-समूह के साथ उस का सम्बन्ध बदल सकती हैं। यह विघटन नए पैदा होने वाले क्लेशों में संक्रमित हो जाता है। जीव-बिन्दुओं में कोई ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिस का उस क्लेश के रासायनिक तत्वों, उस की प्रक्रिया तथा उस के परम्परागत गुणों पर प्रभाव पड़ने लगता है।

किसी व्यक्ति विशेष की परम्परागत प्रवृत्ति उस में नासूर उत्पन्न का प्रमुख कारण हो सकती है। परन्तु नासूर स्वयं बंशगत रोग नहीं। जिन लोगों के पूर्वजों में से किसी को नासूर का रोग हुआ हो, उन्हें उचित है कि सदा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। विशेषतः ४० वर्ष की अवस्था के उपरान्त शरीर की सामायिक जांच करवाते रहना बहुत आवश्यक है।

कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जो प्रारम्भ में लुप्त अवस्था में होने के कारण मामूली समझे जाते हैं, और मनुष्य धोखे से उन की ओर ध्यान नहीं देता, और तब तक नहीं चेतता जब तक अच्छी तरह बने जड़ नहीं जमा लेंगे। इसी कारण वे इतने भयंकर हो जाते हैं। यदि प्रारम्भिक अवस्था में ही उसे समझ लिया जाए, तो कैंसर असाध्य सिद्ध नहीं होता। पीडा तो शायद ही कभी इस का प्रारम्भिक लक्षण होती है, बल्कि कुछ लक्षण ऐसे अवश्य हैं जिन की ओर चौकस्तक को तुरन्त ध्यान देना चाहिये:-

स्तन में पिंड। स्त्रियों को चाहिये कि अपनी छातियों को कभी-कभी ठीक प्रकार

से टॉल कर देख लिया करें और यदि कहीं पर पिंड या सूजन मालूम पड़े, तो तुरन्त डॉक्टर का परामर्श लें।

यौन से सूख, विशेषतः रजःस्तम्भन (Menopause) की अवधि के बीच में या उस के उपरांत रक्तस्राव।

अन्य कोई असाधारण पाचन सम्बन्धी दृढ़ लक्षण, विशेषतः वजन की कमी से सम्बन्धित।

हठों, जीभ या त्वचा पर का कोई घाव जो जल्दी न भरता हो। गुदा में पीड़ा; रक्त बहना या पुराना कब्ज। ये केवल अर्ध (खूनी बवासीर) के लक्षण भी हो सकते हैं, परन्तु फिर भी इन का पता लगाना आवश्यक है।

तिल, मस्से या जन्म के किसी चिन्ह में परिवर्तन हो।

बार-बार तन करने वाली खांसी।

असाधारण और अकारण ही वजन में कमी या खून की कमी।

पेटघाव में रक्त की उपस्थिति।

इस सूची से यह स्पष्ट हो जाएगा कि नासूर के कई लक्षण हो सकते हैं; जिन में में से कई मामूली और साधारणतया नासूर के अतिरिक्त दूसरे कारणों से भी सम्बन्ध रख सकते हैं, परन्तु इस बात पर जोर देना अनावश्यक न होगा कि कैंसर से बचने के लिए आप को प्रत्येक अवस्था में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये। सदा अस्वस्थ रहना और छोटे-मोटे लक्षणों की चिन्ता तथा दूसरे लक्षणों की कल्पना करते रहना ठीक नहीं। असाधारण लक्षणों की बुद्धिमानी से खोज कीजिये, और बिना किसी प्रकार के लक्षणों के भी समय-समय पर स्वास्थ्य-परीक्षण कराते रहिये।

सदा असहाय अवस्था की भावना और भाग्यवाद के विचार छोड़ दीजिये, क्योंकि यदि समय रहते कैंसर का पता चल जाए तो उस का पूरा इलाज हो सकता है। आप कभी ऐसे विचार न रखिये कि "यदि नासूर को होना ही है तो होगा ही; उसे कोई रोक नहीं सकता," इस के विपरीत सदा सचेत रहिये ताकि शरीर में कोई असाधारण बात आप की नजर से न बच सके। यदि कोई शारीरिक दोष हो, चाहे कैंसर हो या कुछ और, तुरन्त उस की ओर ध्यान दीजिये, उसे ऐसे ही न छोड़िये। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि यदि वर्ष में सावधानी से एक बार पूरी तरह स्वास्थ्य-परीक्षण करवा लिया जाए, तो कैंसर के इलाज से बाहर पहुँचने की अवस्था से पहले ही सुरक्षा हो जाएगी। इस प्रकार की जांच के दौरान में स्त्री को चाहिये कि अपने स्तनों और छाती की परीक्षा करवा ले। गर्भाशय के कैंसर के लिये "आंतरिक परीक्षा" आवश्यक है, और ४० वर्ष के उपरांत प्रति ६ मास में यह कार्य जरूरी है। गुदा की परीक्षा भी नहीं छोड़नी चाहिये। यदि पाचन क्रिया सम्बन्धी लक्षण हों, तो पेट और आंतों का एक्सरे करवा लेना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति के लिए छाती की सामयिक परीक्षा करवाना नितान्त आवश्यक है। इस में थोड़ा-बहुत खर्च अधिक तो होगा, परन्तु स्वास्थ्य के आगे थोड़ा-बहुत खर्च कोई वस्तु नहीं।

इस प्रकार बनाई हुई सामान्य कार्यवाही के अतिरिक्त कभी-कभी तन्तुजाल (Tissue) का एक टुकड़ा निकाल कर अणुविक्षण-यंत्र द्वारा जांच कर के ठीक-ठीक निदान करना भी

आवश्यक हो जाता है। इस में कोई हानि नहीं और जब कभी डॉक्टर की सलाह हो, तो पीडित रीहल छेटा सा आप्रेशन करवाने में कोई हर्ज नहीं।

त्वचा का कैंसर सब से कम भयंकर होता है, क्योंकि इस प्रकार के नासूर तक इल्यु-चिकित्सक के चाकू और रीडियम (Radium) चिकित्सा का प्रभाव सुगमता से हो सकता है। इस के अतिरिक्त त्वचा का कैंसर शरीर के किसी और भाग के नासूर की अपेक्षा बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है। जब तक कोई घाव जल्दी ही न भर जाए और कोई रोग ही सिद्ध न हो जाए, तब तक कैंसर ही समझना चाहिये।

प्रारम्भिक अवस्था में कैंसर का ध्यान न रहने या निदान न हो सकने के कारण कैंसर के ठीक इलाज में बाधा पड़ जाती है। वर्तमान काल में इस पर नियन्त्रण रखने के लिये दो लक्ष्य हैं। पहला, जीर्ण व्यथा को दूर करना और कैंसर उत्पादक ज्ञात पदार्थों से सम्पर्क बिच्छेद। दूसरा, यथाशीघ्र लक्षणों द्वारा कैंसर का निदान कर लेना, जिस से इल्यु-चिकित्सा एवं अन्य उपायों द्वारा इस रोग का आमूल विनाश करने की अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठाया जा सके। इस में से पहले लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त शिक्षा ने लोगों को थोड़ा-बहुत लाभ पहुँचाया है क्योंकि उद्योग व्यवसायों के कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि वे कोलेतार या अन्य कैंसर उत्पादक पदार्थों के सम्पर्क में न आएँ। दुर्घातों की सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञान की शिक्षा का भी यही उद्देश्य है।

जनसाधारण को कैंसर के संबंध में शिक्षित करने और शीघ्रगतिशील इस के निदान करने के बावजूद अब भी बहुत कुछ करने को बाकी है। स्त्रियों को यह सिखा दिया गया है कि छाती के किसी भी पड़ को शंका की दृष्टि से देखना चाहिये, परन्तु फिर भी लार्ज जांतीरक नासूर के लक्षणों की अपेक्षा कर बैठते हैं।

४० वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की सामयिक शारीरिक परीक्षा और फ्लोरस्कोपी (flourescopy) एवं एक्स-किरण परीक्षा के द्वारा सब प्रकार के कैंसरों में से दो तिहाई का और व्यथा उत्पादक गिल्टियों का प्रारम्भिक अवस्था में ही पता चल सकता है। यदि जनता को सामयिक स्वास्थ्य-परीक्षा के लिये राजी कर लिया जाए, तो कैंसर के द्वारा मृत्यु संख्या को कम करने की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है।

यदि शीघ्र निदान हो जाए तो इलाज भी शीघ्र हो जाएगा। कैंसर के विषय में ध्यान रखिये कि जितनी जल्दी की जाएगी, उतनी जल्दी आराम होगा। विलम्ब इन विषय में घातक होता है। वर्तमान समय में कैंसर के इलाज की केवल तीन प्रभावशाली विधियाँ हैं: इल्यु-चिकित्सा, रीडियम (Radium) और एक्स-रेथियाँ। इन तीन प्रणालियों से नासूर का पूरा इलाज किया जा चुकने के हजारों उदाहरण हैं।

पूरे इलाज के पांच वर्ष के भीतर यदि नासूर फिर प्रकट न हो, तो उस का पक्का इलाज हो गया समझना चाहिये। पांच वर्ष के उपरान्त इस की पुनरावृत्ति बहुत कम होती है, परन्तु हो, इस में संदेह नहीं कि "समय ही सब से महत्वपूर्ण तत्व" है।

रोगियों द्वारा घरेलू इलाज करने और तुरंत आवश्यक कदम उठाने के बदले नीम-हकीम की सहायता लेने में बहुत समय व्यर्थ चला जाता है।

दुर्भाग्यवश नीम हकीमों (सड़कों के किनारे दवा बेचने वालों) में अंधविश्वास

के कारण प्रतिवर्ष अनेक जाने चली जाती हैं। इन अनाड़ी हकीमों के द्वारा प्रचारित शक्तिया इलाज की प्रतिश्रुति लोगों को इतना प्रभावित कर देती हैं कि वे नागरिक डॉक्टर की सीधी और सच्ची बातें न सुन कर इन कच्चे चिकित्सकों के हाथों में अपनी जान साँपने के बहकावे में आ जाते हैं। यह "ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को नीधा दिखाई पड़ता है, पर इस के अन्त में मृत्यु ही मिलती है।" यही बात नाना प्रकार के वचाय, चूर्ण इत्यादि का प्रदर्शन करने वाले नीम हकीमों पर भी पूरी तरह चरितार्थ होती है। ऐसे धाँकेबाज बैटों को छेड़ कर किसी नामी डॉक्टर या अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज करवाना ही सर्वथा उचित है। यदि आप को कैंसर का संदेह हो तो निम्नलिखित अवस्थाओं में से कोई भी इस का संकेत दे सकती है और आप को तुरन्त डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिये।

१. कोई घाव जो भरता न हो।
२. छाती में अथवा किसी अन्य स्थान पर पिंड या सूजन।
३. कोई असाधारण रक्त या अन्य स्राव।
४. किसी तिल या मस्से में परिवर्तन।
५. जीर्ण प्रकार की अपच।
६. निबलने में बार-बार होने वाली कठिनाई।
७. बार-बार तंद करने वाली खांसी या गला बँठना।
८. मल-त्याग की नियमित आदतों में परिवर्तन।

अध्याय ३६

विविध प्रकार के सामान्य रोग

मूंह आना

बच्चे के सामान्य प्रकार के मूंह आने का वर्णन २२वें अध्याय में हो चुका है।

बड़े लोगों में मूंह आने का कारण दांतों, जीभ और मूंह को साफ न रखना होता है। तबूँ और मालों के भीतरी ओर छाले पड़ जाते हैं। ये छाले हवत दांतों के समान दिखाई देते हैं और इन में बहुत दर्द होता है।

चिकित्सा

परीश्रष्ट में दिये हुए नुसखे नं. ९ और १० के प्रयोग द्वारा मूंह को साफ रखिये। सफेद दाग किसी प्रकार के क्यो न हों, सिल्वर नाइट्रेट स्टिक (Silver Nitrate Stick)

से छलाने से ठीक हो जाते हैं। यह सिलवर नाइट्रेट स्टिक आर्षांध विक्रेता की दुकान से मिल सकती है।

हिचकीयां

सांस रोक लेने से प्रायः हिचकीयां भी बन्द हो जाती हैं। दूसरा उपाय यह है कि जीभ को पकड़ कर बाहर खींचिये और एक दो मिनट तक उसी अवस्था में रीहिये। एक और उपाय है बहुत गरम पानी पीना।

नकसीर छटना

कभी-कभी अंगूठे और उंगली से नाक पकड़ कर दबाने से खून निकलना बन्द हो जाता है।

एक और उपाय है बर्फ का टुकड़ा नथनों के पास और दूसरा टुकड़ा मुंह में रखना है। गर्दन के पीछे बर्फ का एक टुकड़ा लगाने से खून उसी क्षण बन्द हो जाता है।

कभी-कभी नाक में बहुत नमक मिला हुआ पानी डालने से खून बन्द हो जाता है।

यदि ये सब उपाय असफल रहें तो छोटी उंगली के अन्तिम छोर के बराबर-बराबर सोखने वाली रुई के छोटो-छोटो टुकड़े लीजिये। ६ या ८ इंच लम्बी एक छोरी में रुई के इन टुकड़ों को बांध-बांध कर एक माला सी बना लीजिये। फिर रुई के इन टुकड़ों को एक-एक कर के नाक में ऊपर को तीन इंच तक चढ़ाइये यहाँ तक कि नाक के छेद बन्द हो जाएं। ध्यान रहे कि छोरी का सिरा नाक के बाहर लटकता रहे। इन टुकड़ों को नाक के अन्दर ३० मिनट या इस से कुछ अधिक समय तक इसी दशा में रहने दीजिये। इस के बाद छोरी को लटकते हुए सिरों को पकड़ कर रुई के टुकड़ों को बाहर खींच लिया जाए।

रोंगी को आगे की ओर नहीं झुकना चाहिये क्योंकि इस से नाक की रक्त-वाहिनीयां को दबाव पड़ता है। उस को पीछे की ओर झुकना चाहिये ताकि रक्त नाक के पिछले सिरों से अन्दर जाए। फिर रक्त को बाहर धुका जा सकता है।

आंत उतरना (Hernia or Rupture)

आंत का एक भाग उदर-गह्वर के प्राचीर के एक छेद में से हो कर बाहर निकल जाता है। त्वचा के भीतर सूजन हो जाती है। यह बहुधा जांघ और उदर के बीच के स्थान या पेट-स्थान पर होता है।

इस रोग की चिकित्सा के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है। यदि सूजन वाले स्थान को दबाने से आंत पेट के भीतर लौटें तो रोंगी को लेटा रहना चाहिये और डॉक्टर को जल्दी ही बुला भेजना चाहिये।

आंत उतर जाने की किसी-किसी दशा में ट्रस (Truss) नाम की एक पट्टी का प्रयोग किया जाता है। यह एक पट्टी होती है जो अरीर के चारों ओर लपेटी जाती है और इस

में एक कड़ि बोल गयी होती है उस स्थान पर जमा दी जाती है जहां आंत उदर से निकल कर पहुँच जाती है। सब से सन्तोषजनक चिकित्सा है आपरेशन। जब एक बार सर्जन ठीक तरह से उस का आपरेशन कर दे, तो फिर यह रोग कहीं कष्ट नहीं देता।

पथरी

बार-बार कष्ट के साथ पेशाब जाना, 'पेशाब में खून होना और कभी-कभी मूत्र के साथ पत्थर के छोटो-छोटे टुकड़े निकलना' ये सब पथरी रोग के लक्षण होते हैं।

चिकित्सा

रोगी को चारपाई पर लेट कर आराम करना चाहिये और कागजी नीबू का अर्क पानी में मिला कर बहुत अधिक मात्रा में पीना चाहिये। एक ग्याल पानी में १५ ग्रैन पोटेशियम सिट्रेट (Potassium Citrate) मिला कर दिन में तीन बार पीना चाहिये। गरम पानी से स्नान करना उपयोगी सिद्ध होता है। दिन में तीन बार दस ग्रैन यूरोट्रोपिन (Urotropin) का सेवन करना चाहिये। यदि पीडा अधिक है तो अस्पताल जा कर पथरी निकलवा देनी चाहिये।

पांडू, रोग या कमल बाढ़ (Jaundice)

आंखों के श्वेत भाग और त्वचा का पीला पड़ जाना पित्ताशय या यकृत (Liver) का रोग होता है।

यदि ज्वर हो तो रोगी को चारपाई पर आराम करना चाहिये। भोजन में नरम या द्रव्य पदार्थ ही होना चाहिये। पानी में नीबू का अर्क मिला कर पिया जाए। प्रतिदिन एपसम साल्ट की एक खुराक खाइये। दिन में दो बार बीस मिनिट तक कपडा गरम पानी में भिगो कर यकृत (कलेज) के ऊपर सेकिये।

जोडों और पीठ में दर्द-गठिया

इस प्रकार के दर्द की चिकित्सा में यमी पढ़ाना अत्यन्त लाभकारी है। गरम पानी की बातल या आदू संको के प्रयोग किया जा सकता है। जोडों के ऊपर शीश-हीरा (Winter Green) के तेल की मालिश उपयोगी होती है। कपडे के एक टुकड़े को तेल में भिगो कर दर्द-वाले स्थान पर रक्खा जा सकता है। इस कपडे के ऊपर तेल के कागज का एक टुकडा रख कर पट्टी बांध दीजिये। शराब या मांस का प्रयोग न कीजिये। प्रतिदिन बहुत अधिक मात्रा में पानी पीजिये।

यदि गठिया के कारण जोडों में दर्द होता हो, तो १५ ग्रैन सोडियम सेलीसिलेट और २० ग्रैन सोड बाईकार्बोनेट अर्थात् खाने का सोडा (15 Grains Sodium Salicy-

late and 20 Grains Soda Bicarbonate) आधे गिलास पानी में मिला कर तीन-तीन घंटे बाद पिया जाए।

मिर्गी (Epilepsy)

मिर्गी के दूरि ऐसे गम्भीर हो सकते हैं कि रोगी अचेत हो कर पृथ्वी पर गिर पड़ता है और उस के मुँह से झाब निकलने लगता है। कुछ दशाओं में दूरि बहुत साधारण से होते हैं, बातें करते समय या खाते समय रोगी अचानक आधे मिनट या अधिक समय के लिये अचेत हो जाता है। ये साधारण दूरि बेंबेंझी या मूर्च्छा जैसे होते हैं।

चिकित्सा करते समय यह देखना आवश्यक है कि रोगी को टट्टी प्रतीदिन आ जाती है या नहीं। शराब, तम्बाकू या मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिये। डॉक्टर को दिखाने से पूर्व रोगी को एक दिन में ६० ग्रेन सोडियम ब्रोमाइड (Sodium Bromide) दिया जा सकता है। नींबू के अर्क (सत) में पानी मिला कर और उसे मीठा करने के लिये थोड़ा चीनी मिला कर पीने को देना चाहिये।

यह कहा जाता है कि मिर्गी-रोग पित्रागत होता है। मीदरा-संबन, झरिर में स्वयं उत्पन्न मादकता (Auto-intoxication), सिर की चोटें, आँखों पर अधिक जार, आंत में परजीवियों की उपस्थिति—ये सब ऐसी बातें हैं जो उस व्यक्ति को मिर्गी के दूरों का शिकार बना सकती हैं जिस की चेताव्यवस्था (Nervous Organization) में कुछ गड़बड़ है।

मिर्गी के दूरों के समय रोगी को प्रत्येक प्रकार की चोट से भी बचना चाहिये। उस के कपड़े, ढीलें कर दीजिये और उस के दांतों के बीच लकड़ी या डट (काग) का टुकड़ा दबा देना चाहिये ताकि दांतों के बीच आकर जीभ न चिर जाए। दूरों का कारण बहुत सावधानी से मालूम करना चाहिये।

चिकित्सा

रोगी का अहार बड़े महत्व की चीज है। खाना ठीक समय पर देना चाहिये और मात्रा में भी थोड़ा होना चाहिये। मांस, चाय, कॉफी, कैल्शियम आदि नहीं देना चाहिये। खाने में नमक बहुत कम कर देना चाहिये। खाने में केवल फल, दाल, अच्छी तरह सिके हुए टोमेट, दूध और सब्जियां होनी चाहिये। अंडे मटर, सेम आदि, मंत्रों की गिरियां, और पनीर कभी-कभी खानी चाहिये।

ठीक तरह के भोजन, साधारण जुलाब या जीनमे की सहायता से रोगी का पेट साफ रखना चाहिये। नैत्रायास (Eye-strain), नाकड़ा (Nasal Polypi) बड़े हुए गलसए, शिश्नच्छा का पूरी तरह खुला न होना (Adherent Prepuce), और अंत्र-कृमि—ये सब ऐसी बातें हैं जिन से स्वभाव में परावर्तित झुंझलाहट (reflex irritation) पैदा हो जाती है। इसीलए इन की चिकित्सा आवश्यक होती है।

बार-बार गरम पानी से स्नान कर के त्वचा को सक्रिय रखना चाहिये। रोगी को बहुत सा समय बाहर बिताना चाहिये और शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिये।

पाइरिया (Pyorrhœa)

पाइरिया उस अवस्था को कहते हैं जिस में दांतों को धारण करनी वाली हीड्रिया किसी संक्रमण के कारण नष्ट हो गई हैं। रोग बढ़ जाने पर दांत हिलने लगते हैं। देखने में मसूड़े स्वस्थ मालूम पड़ते हैं, परन्तु दांत के इर्द-गिर्द पीप की छोटी-छोटी धीलियाँ पंदा हो जाती हैं।

अनेक रोगी समझते हैं कि पाइरिया के इलाज की एक मात्र विधि यही है कि दांत निकलवा दिये जाएं। बीमारी बढ़ जाने पर यह उपाय ठीक हो सकता है। बिना दांत निकाले ही सफल चिकित्सा तभी हो सकती है जब खींच ही रोग का निदान हो जाए। पाइरिया की प्रारम्भिक अवस्था के चिन्ह छिद्रपूर्ण, सूजे हुए और रक्तवाही मसूड़ों को देखते ही किसी दन्त-चिकित्सक (dentist) से परामर्श करना चाहिये। मसूड़ों को मलते रहने से भी उन्हें स्वस्थ रक्खा जा सकता है। मुँह और दांतों की सफाई आवश्यक है।

हृदय-रोग (Heart Disease)

अधिक महत्व वाले हृदय-रोगों में से एक हाइपर्टेंशन (Hypertension) है जो उच्च रक्तचाप से उत्पन्न होता है। रक्तचाप की अधिकता से हृदय की पेशियों को दीर्घता द्वारा शिथिलता और अवरोध उत्पन्न हो जाता है।

इस बीमारी का दूसरा प्रकार कोरोनरी (Coronary) है, दिल की बीमारी को चाँधाई संज्ञा इसी प्रकार के रोगियों में पाई जाती है। कोरोनरी धमनियों के तंग हो जाने से छोटी धमनियों में रुकावट और रक्त जम जाने की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इस से हृदय की पेशियों में क्षति-चिन्ह पड़ जाते हैं और उन्हें हानि पहुँचती है। बहुधा यह उच्च-रक्तचाप वाले और बहुमूत्र-रोग पीडित व्यक्तियों को प्रभावित करता है। इस के अनेक भेद हैं परन्तु अक्सर यह हृदीपंड के स्थान पर दर्द और दबाव (angina pectoris) के संक्षिप्त आक्रमण से प्रारम्भ होता है जो बाईं भुजा से नीचे की ओर प्रसारित होने लगता है। समाचार-पत्रों में छपने वाला दिल का दौरा यही है और इस से अचानक ही प्राणान्त हो सकता है। इस के कुछ सामान्य रूप भी हैं जिन की अक्सर पहचान नहीं हो पाती। यदि ऐसे रोगियों में रोग का अधिक प्रभाव न हुआ हो और उन की उचित चिकित्सा की जाए, तो वे अनेक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं।

गठिया सम्बन्धी हृदय के व्यथाओं में अर्थात् दिल की उन बीमारियों में जो वात-ज्वर (Rheumatic fever) अथवा इसी प्रकार की संक्रामक अवस्थाओं से उत्पन्न हैं। रक्त के कपाटों (Valve) को ही आम तौर पर हानि होती है। इस से दो स्थायी हानियाँ हो सकती हैं: पहली इन कपाटों का संकींचित हो जाना और दूसरी इन का अधूरे ढंग से बन्द होना। हृदय की धड़कन के समय रक्त प्रवाह (Valve Orifice) सम्बन्धी द्वारों के तंग हो जाने के

कारण रक्त के ठीक दिशा में स्वच्छन्दता से प्रवाहित होने में बाधा पड़ती है और थड.कनों के बीच-बीच में विपरीत दिशा में पीछे की ओर भी बहने लगता है। इस से हृदय का काम बढ. जाता है और यदि उचित सावधानी न करती गई तो हृदय निष्क्रिय हो जाता है।

उपदंष्ट्र विषयक हृद-रोग, जैसा कि इस शब्द से स्पष्ट है, उपदंष्ट्र की बीमारी से पंदा होता है और अवयव सम्बन्धी दिल की बीमारियों में इस का अनुपात दस प्रतिशत होता है। इस में महाधमनी का चाप, तत्सम्बन्धी द्वार का घेरा और चापीझरर क्षीतग्रस्त हो जाते हैं और बायां हृद-कोष्ठ (Ventricle) अधिक बढ. जाता है। उपदंष्ट्र जीनत हृदय-रोग सामान्यतया अर्धेष्ट अवस्था में उत्पन्न होता है और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिकता से पाया जाता है।

उपरोक्त हृद-रोग के प्रकारों के अतिरिक्त, झररी के अवयवों में बिना किसी विकार के भी हृदय के कार्य में गड़.बड़. हो जाने की भी कुछ अवस्थाएँ हैं। इन में से दिल थड.कने की शिकायत सब से अधिक आम है। इस के मुख्य कारण, डर, क्रोध, खुशी, रंज, चिन्ता इत्यादि भाव एवं अन्तर्बैग होते हैं अथवा चाय, कॉफी, तम्बाकू या अन्य मादक पदार्थों में पाए जाने वाले विष से भी दिल थड.कने की तकलीफ हो जाती है।

ज्योंही हृदय की गति बन्द होने के निकट पहुँचती है, दिल की बीमारी के वास्तविक लक्षण प्रगट होने लगते हैं। थोड़े से परिश्रम से भी सांस फूल जाना सब से पहला लक्षण है। भोजन के बाद तकलीफ और भारीपन एक आम शिकायत हो जाती है, दूसरे लक्षणों में कमजोरी, सहन-शक्ति का हास, विशेषतः ठाँगों में शिथिलता का अनुभूति, छाती में भारीपन (fullness) और सूखी खांसी इत्यादि होते हैं। इस के अतिरिक्त जिनर में तथा दिल में मीठा-मीठा दर्द होता है या व्यथा मालूम पड़ती है। टखनों की सूजन प्राथमिक लक्षणों में से एक है। यह खाम को बढ. जाता और निद्रावस्था में गायब हो जाता है। कमजोरी इस हद तक बढ. जाती है कि रोगी थोड़े से भी परिश्रम से अत्यन्त शिथिल हो जाता है। उसे बेचैनी और निद्रा-हीनता हो जाती है।

चाहे किसी भी प्रकार का हृद-रोग हो, रोगी को प्रतिदिन चिकित्सक की देख-रेख में रहना चाहिये और दिल की बीमारी के पुराने अथवा स्थायी हो जाने पर उसे बार-बार डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। हृदय के बारे में एक नलत धारणा यह है कि एक बार प्रभावित हो जाने पर हृद-रोग स्थायी रूप धारण कर लेता है जिस से स्थायी स्वास्थ्य-हीनता और अकाल मृत्यु हो जाती है; परन्तु ऐसी बात नहीं है, विषम हृदय भी समयोपरित सुचारु रूप से स्वस्थ हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का आराम सब से बढ.या इलाज है। रोगी को चाहिये कि वह इस प्रकार का भोजन चुन ले जिस से वायु पंदा न हो और खाना ठीक प्रकार हजम हो जाए। साथ ही उसे मानसिक उद्वेग, विशेषतः झंझावैश से बचना चाहिये।

उच्च-रक्तचाप (High Blood Pressure)

प्राँट. व्यक्ति के लिये सामान्यतया रक्त-चाप १२०/८०, बताया जाता है जिस का अर्थ केवल यह है कि हृदय के संकुचित होने पर दबाव इतना होता है जितना पारे के

१२० मिलीमीटर ऊँचे-स्तम्भ (Column) से प्रकट होता है और इसी प्रकार उस के ढीले होने पर ८० मिलीमीटर ऊँचे स्तम्भ के दबाव के बराबर होता है। वृद्धावस्था के साथ-साथ रक्तचाप बढ़ता जाता है, चाहे जबस्था कुछ भी क्यों न हो, १४० से ऊपर अविरत रक्तचाप अप्रसन्न समझा जाता है।

अवस्था अधिक होने के अतिरिक्त कुछ और भी कारण ऐसे हैं जिन से रक्तचाप बढ़ जाता है परन्तु उन में से सभी कारण ज्ञात नहीं हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन करना, चाहे वह पीष्टकारक ही क्यों न हो, रक्तचाप को बढ़ाने का एक कारण है। अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों, चाय, कॉफी, तम्बाकू और मादक पदार्थों में प्राप्त होने वाले उत्तेजक द्रव्यों का भी रक्तचाप पर प्रभाव पड़ता है। बहुमूत्र-रोग, गठिया, दमा, वात और गुर्दे की बीमारियाँ भी रक्तचाप पैदा करती हैं। आधुनिक जीवन के अधिक परिहरम-जन्य भार एवं क्लान्ति से भी रक्तचाप बढ़ जाता है। दांतों और मसूड़ों में बीमारी या इसी प्रकार की अन्य स्थानीय रूग्णावस्थाएँ भी रक्त के दबाव में वृद्धि करती हैं।

जीवन के प्रत्येक कार्य-क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों में यह रोग पाया जाता है। सादे भोजन पर निर्बाह करने वाले गरीब श्रेणी के लोगों की अपेक्षा धनी वर्ग में यह रोग अधिक प्रचलित है।

रक्तचाप-वृद्धि के लक्षणों में बड़ा भेद पाया जाता है। शरीर का असाधारणतया अधिक भार, रीक्तम वर्ण, स्वास्थ्य में लयहीनता ही केवल बाह्य लक्षण हो सकते हैं। इन के अतिरिक्त सिर चकराना, कानों में घंटी सी बजना, सिर में दर्द अथवा थड़कन सी महसूस होना इत्यादि कष्टदायक अनुभूतियाँ भी इस रोग का संकेत देती हैं।

अब डॉक्टर लोग स्वीकार करने लग हैं कि रक्तचाप को घटाने के लिये दी हुई आशुधियाँ अधिक लाभकारी नहीं होतीं। भोजन में फल व सब्जियों की अधिक मात्रा के साथ थोड़ा-बहुत दाल अनाज, मीनों की मीरिया या अंडे सम्मिलित होने चाहियें। हर प्रकार के मांस को त्याग कर चाय और कॉफी का भी बहिष्कार कर देना चाहिये। नमक, मिर्च-मसालों की मात्रा को भी यथासाध्य सीमित कर देना उचित होगा। तम्बाकू का तो सर्वथा परित्याग ही इत्येवम् होगा। पर्याप्त रूप में आराम और नियमित जीवन अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। इस के रोगी को चाहिये कि सब प्रकार के मानसिक आवेशों में 'आन' से बचे और चिन्ता को यथासंभव मन में अधिक स्थान न दे।

वस्तुओं को निगल जाना

बच्चों के सिक्के, पिन, बटन आदि निगल जाने से माता-पिता प्रायः चिन्तित हो जाते हैं। ये वस्तुएँ बिना कोई हानि पहुँचाए शरीर के बाहर निकल जाती हैं। ऐसे दृश्यों में बच्चों को जलाशय आदि नहीं देना चाहिये। रोटी, दालिया, झककंदी या कोई दूसरी सख्त सब्जियाँ जैसे भारी भोजन देने चाहिये जिस से ये भोजन आंतों पर जोर डाल कर दूसरी वस्तुओं के साथ निगली हुई वस्तुओं को भी बाहर निकाल दे।

रसाली (Tumours)

नरम गिल्टियां जो कभी-कभी सिर, गर्दन या पीठ पर निकल आती हैं वे कोई हानि नहीं पहुंचाती। जो गिल्टी छोट, जबड़े या छाती पर निकलती है वह खतरनाक होती है। ऐसी दशा में डॉक्टर को तुरन्त ही बुला लेना चाहिये। यह गिल्टी कोई नासूर या कोई गहरा फोड़ा भी हो सकता है और उस की सफल चिकित्सा यह है कि आपरेजन करके उसे निकाल दिया जाए। (देखिये अध्याय ३५)

अध्याय ३७

विकिरण और विस्फोट

(Radiation And Blast)

य हाँप इस अध्याय में प्रतीपादित अनेक सिद्धांत कल कारखानों वाले विस्फोटों या अत्यन्त ज्वलनशील बम के धमाकों पर लागू होते हैं, परन्तु इन पृष्ठों में चर्चा का विशिष्ट लक्ष्य अणु परमाणु विस्फोट से सम्बन्ध रखता है। मानव जाति पर इन विस्फोटों के प्रभाव का वर्णन करने से पूर्व उन आवश्यक तथ्यों में से कुछ पर विचार करना उचित होगा जिन्हें अणु आयुधों के आक्रमण के समय प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिये।

अणुबम के विस्फोट से चकाचाँध करने वाली चमक उत्पन्न होती है और समस्त आकाश प्रदीप्त हो उठता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि विस्फोट के समय यदि उस प्रचंड प्रकाश को ५.७ मील की दूरी से देखा जाए तो ऐसा लगता है मानों पृथ्वी के धरातल पर दोपहर के समय के सूर्य के प्रकाश की साँ गुनी चमक केन्द्रीभूत हो कर प्रकट हो गई हो। जब अचानक यह प्रकाश-पंज उदय हो तो उस ज्वाला के केन्द्र की ओर न देखिये क्योंकि विस्फोट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ "अग्नीबम्ब" धमाके के बाद भी दस या इस से अधिक सेकन्ड तक प्रदीप्त रहता है। विस्फोट के उपरान्त एक मिनट से भी अधिक देर तक 'गामा किरणों' नाम की, भयंकर छोटी-छोटी तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। पहले सेकंड के अन्दर 'गामा किरणों' की यौगिक शक्ति का आधा भाग उड़ित हो जाता है, दस सेकन्ड के अन्दर ८० प्रतिशत और साँ सेकन्ड के भीतर समस्त महत्वपूर्ण अंश प्रगट हो जाता है। इस प्रकार आक्रमण के समय किसी व्यक्ति को दीवार या खाई का सहारा लेकर 'गामा किरणों' की प्रचंडता से बचने का समय ही नहीं मिलता। ऐसा करने में हो

सकता है कि उस की जान बच जाए; विस्फोट जनित आग्न की लहरें प्रज्वलन का मुख्य कारण होती हैं और वे लगभग सारी-की-सारी धमाका शुरू होने के बाद तीन सेकंड के अन्दर ही अन्दर उत्पन्न हो जाती हैं। ये तरंगें "गामा किरणों" की भाँति तीक्ष्ण नहीं होतीं। यद्यपि ऐसे अवसर पर समय बहुत ही थोड़ा मिल पाता है, परन्तु फिर भी कोई व्यक्ति तुरन्त ही सिर, हाथ या शरीर के अन्य नरम भागों को बचाता हुआ बम की विपरीत दिशा में धराशायी हो जाए तो वह उष्णता की तरंग के एक भाग से बच सकता है। नील रश्मियाँ (Ultra-Violet rays) भी उत्पन्न होती हैं, परन्तु ज्वलनशीलता में उन का प्रमुख भाग नहीं गालूम पड़ता। अमेरिकन रेडक्रॉस के मतानुसार यदि प्रकाश पूंज के प्रकट होते ही दो सेकंड तक किसी व्यक्ति को शरणा मिल सके तो वह उष्णता की प्रचंडता के एक तिहाई भाग से बच सकता है।

जब बम फटता है, तो उस के चारों ओर की हवा गरम हो जाती है, वह उष्ण वायु तीव्र गति से फैलती है, और ऊपर की ओर उठती हुई कुचलने वाले दाब की तरंग उत्पन्न करती है। वायुदाब की यह वृद्धि बम के निकट उत्पन्न अधिक होती है, और दूसरी के साथ-साथ घटती जाती है। फटते हुए बम के ठीक नीचे घरती पर से पाँच हजार फुट की दूरी पर दाब ८.४ वायुमण्डल तक बढ़ सकता है। हिरॉशिमा पर गिराए गए बम के समान बम में इस दाब का यह अर्थ होगा कि १ बर्ग इंच में १५ पाँड के साधारण दाब के स्थान पर प्रतिबर्ग इंच १२६ पाँड दाब हो जाएगा। यह बहुत सी इमारतों को गिराने के लिये पर्याप्त है। यह दाब पहले अपनी चरमसीमा तक पहुँच जाता है फिर प्रसम से नीचे गिर जाता, और बाद में प्रसम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यह सब कुछ बहुत ही जल्दी हो जाता है। दाब का यह परिवर्तन उस वायु के द्वारा प्रकट होता है जिससे यह ऊपर की ओर धकेल देता है। जोर की हवा पहले विस्फोट के केन्द्र से विपरीत दिशा में चलती है; और फिर मन्द गति से धमाके वाली भूमि के केन्द्र की ओर चलती है। पाँच हजार फुट पर बाहर की ओर चलने वाली हवा दो सौ मील प्रति घंटे की रफतार से चलती है। स्वभावतः वायुवेग बम की दूरी के साथ-साथ बदलता रहता है और बम के परिणाम के अनुसार भी परिवर्तित होता है। इस अध्याय में प्रयोग किए गए आंकड़ों में से सभी उस परिमाण के बमों पर आधारित हैं जो हिरॉशिमा और नागा साकी में प्रयोग किए गए थे।

अणुविस्फोट से उत्पन्न होने वाले झटके की तरंगों की विशेषता यह है कि इस में पहले तापमान अचानक बढ़ जाता है फिर धीरे-धीरे दबाव कम होता है; इस में एक सेकंड लग जाता है। तब चूषण (चूसाव) की एक अवस्था आती है जब कुछ सेकंडों तक वायुमण्डल का दाब प्रसम से भी कम हो जाता है। विस्फोट की तरंग की पहली अवस्था के साथ दाब में अचानक वृद्धि हो जाती है और दाब की सगस्त अवस्था की ओर क्रमशः घटते हुए वेग के साथ बढ़ी आँधी चलती है। चूषण (चूसाव) की अवस्था में प्रारम्भ में आँधी अपनी दिशा बदल देती है, परन्तु उस का वेग धीमा हो कर कुछ देर तक चालू रहता है।

याद रहे कि किसी इमारत को नष्ट करने में दो बातें मिल कर कार्य करती हैं। पहले तो दाब का कुचलने वाला प्रभाव और दूसरे दाब के परिवर्तन की तीव्र गति।

यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि 'नामा किरणों,' नीले प्रकाश तथा ताप-विकिरण की सी तीव्र गति से दाबग्र (Pressure Point) यात्रा नहीं करता। विस्फोट के ५ सेकण्ड के बाद दाबग्र एक मील दूर पहुँचता है।

अणुबम के विस्फोट से आग लग सकती है। उष्णता की तरंगें जो झूलसा कर लोगों को घायल कर सकती हैं, वे जलनशील पदार्थों के जलने की सीमा से परे तापमान बढ़ा कर आग लगा सकती हैं। परन्तु विस्फोट की तरंगें जो थोड़ी देर बाद चलती हैं ऐसी आग को आम तौर पर बहुत हद तक बुझा देती हैं। इस का कारण यह है कि उष्णता की तरंगें तापमान को केवल थोड़े ही समय के लिये बढ़ाती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि अणुविस्फोट के सम्बन्ध में अधिकतम आग लगने की घटनाएँ चल्ते, अंगीठियों के उल्टे जाने और बिजली की टूटी हुई धारा-मण्डल (Electric Circuits) से घटित होती हैं। यदि यह छोटे-छोटे अग्निकाण्ड नियंत्रित न किए जाएँ तो इन के द्वारा भयंकर अग्नि-काण्ड का रूप उपस्थित हो सकता है। अनुभव से ज्ञात होता है, कि विस्फोट के बाद आधे घंटे से लेकर एक घंटे या इस से अधिक समय तक कोई भयंकर अग्निकाण्ड नहीं होता।

जो कुछ अभी तक कहा जा चुका है उस में अवशिष्ट विकिरण (Residual Radiation) की कोई चर्चा नहीं की गई है। छिन्न-भिन्न पदार्थ और बम की सामग्री उपयुक्त विकिरणों से भिन्न विकिरण उत्पन्न करते हैं, इन में से कुछ भग्नावशेष किरणोत्सर्ग (Radio active) होते हैं, या कुछ कण निकलने पर किसी अन्य पदार्थ के कणों के साथ रगड़, खा कर किरणोत्सर्गीता (Radio activities) उत्पन्न कर सकते हैं। जब अणुविस्फोट वायुमण्डल में ऊँचाई पर होता है, जैसा कि हिरोशिमा में हुआ था, वहाँ अवशिष्ट विकिरण बहुत सामान्य होता है। पृथ्वी पर या जल के अन्दर के विस्फोटों से कुछ क्षेत्रों में खतरा उत्पन्न हो सकता है, इस खतरे की गम्भीरता का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर होता है कि आदमी इस खतरे की लपेट में कितनी देर रह चुका है और इस क्षेत्र में कितनी किरणोत्सर्गीता प्रवाहित है।

यदि जल के अन्दर बम का विस्फोट हुआ हो तो धमाका कम होगा और ज्वलनशीलता लगभग अदृश्यमान रहेगी। परन्तु पानी की बाँछार से वायुमण्डल में उछाले जाने पर जहाँ बूँदें गिरेगी, वहीं तुरन्त ही नाना परिमाणों में अवशिष्ट विकिरण उत्पन्न हो जाएगा और पानी की लहरें तथा विस्फोट जनित कोहरों के आच्छादित आवरणों द्वारा आसपास की भूमि एवं समस्त जल प्रवाह किरणोत्सर्गी पदार्थों के कारण दूषित हो जाएगा। उस क्षेत्र के निवासियों के लिये इस कोहरे का आच्छादन भयंकर सिद्ध हो सकता है।

इस अध्याय के आरम्भ में वर्णित, ऊँचाई पर किए गए, विस्फोटों की अपेक्षा उन विस्फोटों में कम धमाका और कम ज्वलनशीलता होती, जो धरती पर या पृथ्वी के धरातल के निकट किए जाते हैं। पृथ्वी पर के विस्फोट तात्कालिक विकिरण का विस्तार-क्षेत्र छोटा होता है, और अवशिष्ट विकिरण अधिक मात्रा में होगा। हर हालत में बहुत बड़ी मात्रा में धूल के कण उठ कर किरणोत्सर्गी पदार्थों के साथ मिल जाते हैं और वायु की दिशा में हो कर धरातल पर गिर जाते हैं। ये धूलिकण खतरनाक समझे जाने चाहिये।

सन् १९४५ में हिरोशिमा और नागासाकी में अणु विस्फोटों द्वारा हजारों की मृत्यु

का समाचार सुन कर सारा संसार स्तब्ध रह गया था। यदि जापानी लोगों को पता होता कि क्या होने वाला है और ऐसी अवस्था में सर्वनाश से बचने के लिये क्या करना चाहिये, तो मृत और घायलों की संख्या बहुत कम होती।

आज संसार उस युग में प्रवेश कर चुका है जिससे परमाणु युग कहा गया है। आधुनिक युद्ध के अस्त्र-शस्त्र अणु संचालित हैं और न केवल सामरिक साज-सज्जा तथा सीनकों के लिये विनाशकारी हैं, बल्कि साधारण जनता के लिये भी उतना ही घातक हैं। हमारी प्रार्थना तो यही है कि इस पुस्तक के पाठकों में से किसी को भी इस अध्याय में दी हुई अधि-सूचनाओं का प्रयोग करने की आवश्यकता न पड़े, परन्तु आज के संसार की अवस्था को दृष्टि में रखते हुए ऐसा लगता है कि सभी लोगों को इस विषय में जागरूक रहना समझदारी का काम होगा।

अणुआक्रमण के समय आत्मरक्षा सब से पहली बात है। इस का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी और अपने पड़ोसियों की सहायता करने के लिये इच्छुक और समर्थ होना चाहिये। हर व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिये कि बड़ी दुर्घटना के समय केवल उन लोगों के जीवित रहने की सम्भावना अधिक रहेगी, जिन्होंने इस विषय की शिक्षा पाई है।

अणु बम के आक्रमण के उपरान्त, हमें यह ज्ञात रहना चाहिये कि शायद हमें अपने घर में अजनबी लोगों को शरण देनी पड़े, या हो सकता है कि हम स्वयं दूसरों के यहाँ शरण लें और थोड़ी सी उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं द्वारा ही काम चलाना पड़े। यदि उस समय आप ने इस अध्याय में पढ़ी हुई बातों का प्रयोग किया तो आप अपने साथियों की भलाई करने में सहायक हो सकेंगे और सम्भव है कि अनेकों की जानें भी बचा सकें।

आकीस्मृत दुर्घटनाओं में कोई नहीं कह सकता कि कौन व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। ऐसी अवस्था में कुछ लोग तुरन्त ही अपने आप को आरों के सहायक बना देते हैं, और साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करने को तत्पर हो जाते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग ऐसे हैं जो ऐसे अवसरों पर घबरा उठते हैं, आतंकित हो जाते हैं और अपने को असहाय बल्कि इस से भी गए गुजरे समझने लगते हैं। आधुनिक युद्ध और बड़ी-बड़ी आपत्तियाँ न केवल बड़े पैमाने पर चोट-चपेट का कारण होती हैं, बल्कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बीमारी इत्यादि अनेक दूसरे प्रकार के खतरों का शिकार भी बना देती हैं। इस प्रकार की आधि-व्याधियाँ घावों के पक जानें, शरीर की अ-रक्षित दृष्टि और धकावट के कारणा उत्पन्न होती और फैलती हैं। संक्रामक रोग भीड़-भाड़, या स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों के प्रतिबल अवस्थाओं के कारण तीव्र गति से फैलते हैं। परिवार के सदस्यों विशेषतः बच्चों तथा पड़ोसियों को झिल्लीक-प्रदाह, कुकर खांसी, चंचक, हैजा और हनुस्तम्भ या जम्बू (Tetanus) इत्यादि बीमारियों की रोक-थाम के लिये टीका लगा कर सुरक्षा प्राप्त कर लेने के लिये प्रोत्साहन देने का पूरा प्रयत्न होना चाहिये। विस्फोटों के द्वारा चोट आ जाने पर रोगों से सुरक्षित रहने के निमित्त हनुस्तम्भ के अवरोध विज्ञेय बल देना चाहिये।

दुर्घटना के समय उपलब्ध होने वाली भोजन सामग्री बहुत ही सीमित हो सकती है, परन्तु चूँकि बीमार और घायलों के लिये पोषक पदार्थ बहुत आवश्यक हैं, इसीलिये

ऐसी दशा में उन का पूरा ध्यान रखना चाहिये। भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ और क्रिणोत्सर्गीता द्वारा भोज्य पदार्थों के दूषित होने की सम्भावना भी याद रखने वाली बात है।

किसी भी आपत्ति के समय हिम्मत न छोड़िये, और उपलब्ध साधनों का अच्छे से अच्छा प्रयोग कीजिये। ऐसे अवसर पर थोड़ी बहुत गड़बड़ होना स्वाभाविक है। परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये भरसक प्रयत्न कीजिये, और अपनी सूझ-बूझ व विवेक-शक्ति का अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कीजिये। इस बात का अच्छी प्रकार प्रदर्शन हो चुका है, कि हिम्मत से काम लेने वाले थोड़े से लोगों का उदाहरण सब लोगों में साहस और दृढ़ता पैदा करने में समर्थ होता है।

बहुत बड़े, और भयंकर संकट के समय अनेक लोगों में आतंक छा जाता है, और कुछ लोगों में उत्साह-हीनता दृष्टिगोचर होने लगती है। संकट का सामना करने की योग्यता और साधन सम्पन्नता का उदाहरण प्रस्तुत कर के आप अपने चारों ओर के लोगों को अनेक प्रकार की सहायता पहुँचा सकते हैं। लोगों को बताइये कि संकट का जोर निक्ल गया है। भगने से कुछ काम नहीं बनना। उन्हें विश्वास दिलाइये कि देश और राष्ट्र के साधनों का प्रयोग किया जाएगा, खरब, खरब सामग्री और दवा-दारू का प्रबन्ध होगा, यातायात के साधन स्थापित किए जाएंगे। धर्मार्थ कार्य-कर्ताओं के मण्डल कार्यशील हो जाएंगे और यह भी बताइये कि घर के अन्दर ही शांत रहना सब से अच्छा है। इस प्रकार से आप उन लोगों को कुछ ऐसा कार्य करने को दे सकेंगे जो उन की तात्कालिक समस्याओं में सहायक सिद्ध होगा। यह तो सभी भली भाँति जानते हैं कि लोगों के नैतिक स्तर को बनाये रखने के लिये उन्हें किसी योग्य कार्य में लगा देना सब से अच्छा उपाय है।

साधारणतया भयंकर विस्फोटक बमों के आक्रमण के उपरान्त कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिन्हें “ध्वंस के टापू” कहा जा सकता है, अर्थात् कुछ ऐसे स्थान होंगे जहाँ भयंकर विस्फोट हुआ होगा और जहाँ सब कुछ तहस-नहस हो चुका होगा। अणु बमों के विस्फोट की अवस्था में एक केन्द्रीय और उस के बाहर ध्वस्त क्षेत्र क्रमशः कम होता जाता है और फिर ऐसी सीमा आ जाती है जिस के उपरान्त बम का विनाशकारी बल नहीं पहुँच पाता।

बारूद बनाने के कारखानों, तेल-शोधक कारखानों या इसी प्रकार के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले विस्फोटों में भी धमाके का प्रभाव ऐसा ही होता है जैसा बड़े, जोर से फटने वाले बमों का।

ध्वंस के केन्द्रीय क्षेत्र में तो शायद कोई जीवित बच पाता हो, परन्तु जो वहाँ जीवित रह गए हों उन के पास तक पहुँचना बहुत कठिन होता है। सड़कों में बाधाएँ आ जाती हैं और पीड़ित लोग जीवित रहते हुए भी फंसे-के-फंसे रह जाते हैं या मलबे में दब सकते हैं। विस्फोट से दूर बाहर की ओर सहायता पहुँचाने वाली टीलियाँ प्रभावशाली कार्य कर सकती हैं। सहायता पहुँचाने वाली टीलियों को संगठित कर के ऐसे क्षेत्रों में भेजना चाहिये ताकि वे ठीक-ठीक प्रकार से दृष्टिगोचर लोगों का पता लगा कर उन की सहायता करें और उन्हें प्राथमिक सहायता दें। इन दलों के लिये स्वभावतः यह बड़ा

कीठन कार्य होगा परन्तु यह अवसर ऐसा है कि कष्ट से मुक्ति और प्राथमिक सहायता के रूप में पीड़ितों की सब से अधिक भलाई की जा सकती है।

उदाहरण के लिये कल्पना कीजिये कि आप के मकान से चार मील के अन्तर पर अणु बम का विस्फोट होता है, धमाके से उत्पन्न हुई लहर से आप के घर की खिड़कियां टूट जाती हैं, दीवारों से पलस्तर उखड़ कर गिर पड़ता है और छत से खपरूतें उड़ कर दूर जा गिरती हैं। आप के बच्चे की बांह में चोट आ जाती है। आप रक्त-प्रवाह को काबू में ले आते हैं और घाव पर पट्टी बांध देते हैं। बच्चे को लेकर भीड़-भाड़, बाले दूरदर्शी दयारखाने को तुरन्त चल पड़ना भी उचित नहीं। दूसरे दिन तक ठहरना ठीक होगा ताकि तब तक अस्पताल में भीड़ कम हो जाए, अतएव अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और अधिक ध्यान से इलाज हो सकेगा। ऐसे विस्फोट के बाद चुने हुए स्थानों में प्राथमिक सहायता-केन्द्र कहीं दिनों तक कार्य करते रहेंगे और ऐसे पीड़ितों का उपचार करते रहेंगे जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं। इस बीच, जैसा कि ध्वंस की बड़ी-बड़ी घटनाओं में होता है, दूर से डॉक्टर और नर्स सहायता के लिये बुलाई जाएंगी।

ऐसी घटनाओं में याद रखिये कि आप को अधिक-से-अधिक पीड़ितों की भरसक सहायता करनी चाहिये। असावधानी या गफलत में न पीड़ितों को यह अवसर तुरन्त कार्य करने का है। प्रस्तुत अवस्था में बीड़-या-से-बीड़-या प्राथमिक सहायता जो संभव हो सके दीजिये। यह सदा याद रखिये कि रक्त-प्रवाह को रोकने की ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है, सदमे पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और संक्रामक रोगों की संभावना पर ध्यान देना आवश्यक है। जिस क्रम से हम ने इन्हें लिखा है उसी क्रम से इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान भली भाँति कर सकता है। यदि आप के सामने ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हों जिन का समाधान आप भली भाँति न कर सकते हों, तो आप को अधिक जानकारी और अधिक अनुभवी लोगों की सहायता लेनी चाहिये। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप को प्राथमिक सहायता-केन्द्र के चिकित्सक की सहायता और सलाह लेनी पड़े, या निकट पड़ोस के घायल और पीड़ितों को देखने के लिये डॉक्टर को ले जाना आवश्यक हो।

अनुमान किया गया है कि हिरोशिमा के प्रकार के बम विस्फोट से निम्न प्रकार की क्षतियाँ हो सकती हैं। ५०% व्यक्ति घायल होंगे, ६०% जल जायेंगे और २०% किरणान्वित से प्रभावित हो जाएंगे। इस प्रकार संभव है कि अनेक लोग एक से अधिक प्रकार से पीड़ित हों। पहले हफ्ते में घावों और तले हुए भागों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। तदनन्तर इन पीड़ितों से ध्यान हटा कर विकिरण जनित कष्टों की ओर ध्यान देने के लिये अधिक समय देने की जरूरत होती है।

अणु विस्फोटों से उत्पन्न होने वाले अधिकांश कष्ट बहुत कुछ उसी प्रकार के होते हैं जैसे अधिक विस्फोटक बम से उत्पन्न होते हैं। उन का इस प्रकार वर्गीकरण हो सकता है। (१) धमाके के बम से उत्पन्न होने वाली क्षतियाँ। ये धमाके से परोक्ष-कण में होने

वाले कट हैं या कहे जा सकते हैं। तरंग के बग से हमारे तें गिर पड़ेंगी, झींझे चक्काचूर हो जाएंगे और इसी प्रकार की अन्य हानियां होंगी जिन से शारीरिक व्यथाएं होती हैं। दाब के परिवर्तन के कारण धमाके से प्रत्यक्ष रूप में नुकसान हो सकते हैं। वैसे जीवित रहने वाले लोगों में ऐसा देखने में नहीं आता या बहुत ही कम होता है। (२) जलें हुए के धाव—ये धाव बम की चकाचांध करने वाली गरम तरंगों की चमक से उत्पन्न होते हैं या लपटों अथवा अन्य गरम वस्तुओं के संपर्क में आने से हो जाते हैं। (३) विकिरण से उत्पन्न व्यथा:—ऐसा अनुमान किया जाता है कि हिरोंशिमा और नागासाकी की मृत्यु संख्या में से ८५% यांत्रिक बम जनित घावों, हीड्रड्यां टूटने और इसी प्रकार की दूसरी क्षतियां अथवा जलने की वारदातों के कारण ही घटित हुई थीं जब कि ५ से ले कर १५ प्रतिशत मृत्युओं का कारण केवल विकिरण से उत्पन्न व्यथा सिद्ध हुई। इस पुस्तक में अन्यत्र 'आकीस्मिक दूधटनाओं' में प्राथमिक सहायता या 'चाकित्सा' में काम जाने वाली जो बातें बताई गई हैं वे दाह, विस्फोट एवं धमाके की घटनाओं में भी समान रूप से काम आती हैं, इस कारण यहां पर उस की चर्चा नहीं की जाएगी। अस्तु, इस बात का ज्ञान मूल्यवान होगा कि कोई भी अपारदर्शी पदार्थ, चमक से दाह उत्पन्न करने वाली ताप की तरंग से थोड़ी बहुत रक्षा अवश्य करता है। वस्त्रों से भी शरीर की बड़ी रक्षा होती है। बम के निकट कपड़ों से पर्याप्त रूप में रक्षा नहीं हो पाती। हल्के रंग के ढीले वस्त्र सब से अच्छे होते हैं। गहरे रंग के कपड़े, रक्षा अवश्य करते हैं परन्तु ये परावर्तित करने की अपेक्षा ताप की तरंगों को शोषित करते हैं, अतएव संभव है कि गहरे रंग के कपड़े, लपट पकड़ जाएं और शरीर को जला कर गंभीर रूप से घाव उत्पन्न कर दें।

यह भी जानना आवश्यक है कि उष्ण विकिरण सीधी रेखाओं के रूप में फैलता है। इस प्रकार जलने में अशिक्षित रहने पर अथवा मकानों की छिड़कियों को विस्फोट के स्थाण के समान धरातल की सीध में होने से ही हानिकर प्रभाव हो सकता है। 'गामा किरणों' की अपेक्षा, बम से बहुत दूरी पर भी खूली और अशरक्षित अवस्था में रहने पर, लोगों के अंग चमक से ही जल सकते हैं। जापानियों को पता लगा कि चोहरे, हाथ या शरीर के नंगे भागों पर ही सब से अधिक व्यथाएं पहुंचीं। दूसरे प्रकार से दाहव्रणों से वे लोग सन्तुष्ट हुए जो मलबे में घिर गए थे अथवा जो चोट के कारण इनने पंग हो गए थे कि विस्फोट स्थल से दूर न सके।

विस्फोट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली चोट-चपेट का जहां तक संबंध है, दाब के अधिक बम के कारण अनेक लोग घायल हो जाएंगे। उड़ते हुए झींझे के टुकड़ों से कट जाना केवल बाहरी आघात होंगे, परन्तु कभी-कभी वे गहरे भी हो सकते हैं। ऐसे घाव शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं उन के द्वारा बहुत राधिर-साव और सदमा भी हो सकता है। इन से गहरे छिद्र युक्त घाव हो सकते हैं, और झींझे के टुकड़े, गारे के कण लकड़ी के टुकड़े, इत्यादि शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। बहुधा शरीर पर अनेक घाव हो जाएंगे। प्रायः देखा गया है कि विस्फोटक घटनाओं में पीड़ितों के शरीर में अनेकों छोट-छोटे झींझे के टुकड़े, प्रवेश कर गए। बहुधा वे खंड इतने छोटे होते हैं कि कपड़ों से शरीर की रक्षा नहीं हो सकती। उड़ते हुए पदार्थों से हीड्रड्यां में चोट पहुंच जाती है और उपरोक्त प्रकार के घाव हो जाते हैं। घाव का आकार भ्रांतकारक भी हो सकता है

एक छंटा सा घाव उदर की दीवारों से होता हुआ बड़ा हो सकता है अथवा छाती में घुसता हुआ कोई टुकड़ा भयंकर चोट पहुँचा सकता है।

धमाके से पेट के अवयव, पेशाब के मार्ग या छाती इत्यादि की अन्दरूनी चोट का बैसे पता न चले तो प्रवेश करते हुए घाव, कुचले घाव, फफूले या पीँडित वीं आप बीती सुन कर अंदाजा लग सकता है। यदि पीँडित आंतरिक वेदना की शिक्षायत्त करे या शक्तिहीनता प्रकट करे, तो प्रकट लक्षण न होने पर भी अन्दरूनी चोट की आशंका करनी चाहिये। बैसे तो डॉक्टरों जांच से ही ऐसी व्यथाओं की गंभीरता का पता चल सकता है।

हवा के बहुत बड़े हुए दाब में अ-सुरक्षित रहने पर धमाके द्वारा शरीर के क्षीत पदार्थ चली है। ऐसी अवस्थाएँ युद्ध में, साधारण प्रकार के अधिक विस्फोटक बमों के कारणा अथवा कारखानों में आकीस्मक विस्फोटों में भी हो जाती हैं। ऐसे आघातों में अन्दरूनी चोटें पहुँचती हैं। दाब के कारण शरीर का शीघ्रतया संपीड़न और फैलाव आंतरिक अवयवों में रक्त स्राव युक्त कर देते हैं। अणु विस्फोटों से तात्कालिक जीवित व्यक्तियों में ऐसी क्षीतयां नहीं पाई जातीं। अणु विस्फोटों के धमाक़ों से मकानों के गिर जाने या मलबा बिखर जाने से लोगों के परोक्ष रूप से चोटें पहुँचती हैं। इस प्रकार की व्यथाएँ ऐसी नहीं होतीं, जैसी व्यथाओं का यहाँ वर्णन किया जा रहा है।

विस्फोट जनित चोटों के लक्षण चोट की गंभीरता की मात्रा के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। पीँडित की छाती में दर्द हो सकता है। उसे उबकाई आ सकती है उसे उल्टी हो सकती है। उस के पेट में दर्द और उस की सांस उखड़ी हुई हो सकती है। कभी-कभी वह खाँसी के साथ रक्त भी आ सकता है। कभी-कभी पीँडित बेहोश हो जाता है। उस के कान के पर्दे फट सकते या क्षीतग्रस्त हो सकते हैं। कान के पर्दे के छिद्र जाने के कारण दर्द होता है और सुनने में रुकावट पड़ती है। ऐसे कर्ण छिद्र शीघ्र ठीक हो जाते हैं यद्यपि कभी-कभी कई-कई दिन तक अथवा सदैव के लिये बहरापन बना रह सकता है।

विस्फोट से बहुधा उत्पन्न होने वाली दूसरी प्रकार की व्यथा कुचले जाने के कारण होती है। इन में हीड़हियों की चोटें और अनेक आंतरिक क्षीतयां हो सकती हैं। जो लोग मलबे में घिर जाते हैं और जिनके शरीर के किसी भाग पर भारी वजन पड़ जाता है उन के पट्टे क्षीतग्रस्त हो सकते हैं। जब कई घंटों तक यह दबाव पड़ता रहता है तो पट्टे से निकल कर हानिकर पदार्थ गुदों के नुकसान पहुँचाते हैं चाहे मलबे में घिरे होने की अवस्था से तुरंत निकाले जाने पर कोई व्यक्ति अच्छी हालत में क्यों न दिखाई दे। ऐसी अवस्था में व्यापित भाग में गमी नहीं पहुँचानी चाहिये।

मूर्छा और दूसरे प्रकार के हवास-कष्ट ऐसे स्थान में घिर जाने वाले लोगों को पीँडा पहुँचाते हैं जहाँ अधिक विस्फोट बम अथवा किसी अन्य प्रकार के धमाके हुए हों। अनेक अवस्थाओं में डूब जाने की भी संभावना होती है। बिजली की एकड़ से मृत्यु भी हो सकती है और यदि कोई भग्न इमारतों के आस-पास पीँडितों की सहायता का कार्य कर रहा हो तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कहीं अब भी तारों में बिजली की धारा प्रवाहित न हो रही हो। कुछ औद्योगिक केंद्रों में हानिकर रासायनिक पदार्थ भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं।

गैस धाराओं के टूट जाने के फलस्वरूप गैस का जहरीला हो जाना अधिक संभव नहीं है परन्तु फिर भी जहाँ एकत्र स्थल पर तहखाने में विशेष कर उस स्थान पर जहाँ हवा, दम घोटने लगे, वहाँ इस बात की संभावना पर विचार कर लेना चाहिये। अस्तु विस्पेटों के बाद दम घुट जाने और मृच्छ मुख्य कारण छाती पर दबाव डालने वाले मलबे जहरील इत्यादि के भार ऐसे घाव हो सकते हैं जो सांस लेने में रुकावट उत्पन्न करें। अतएव छाती की ऐसी जकड़न आदि मिन्टों के अन्दर संभाल ली जानी चाहिये क्योंकि छाती का कार्य पूरी तरह रुक जाने के कारण मृत्यु होना अनिवार्य है। ऐसा बचाव कार्य वही लोग क्षीघ्रतया कर सकते हैं जो पीडितों के अत्यंत निकट हों। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि चोहरे, गर्दन, और छाती के घावों से स्वांस-प्रश्वास में कौटनाई उत्पन्न होने से पीडितों का दम घुट सकता है। यह भी याद रखना ठीक होगा कि यदि गले या छाती में सूजन हो गई हो तो सांस लेने में अधिक समय लगने पर अधिकधिक कौटनाई हो सकती है।

आंख की चोट पर सब से पहले ध्यान देना चाहिये, आंख के गोलक (ढेले) को सर्व प्रथम संभालना चाहिये उस के चारों ओर के तन्तु जाल को बाद में संभाला जा सकता है, यदि पीडित एक आंख में बड़े धुंधलेपन या एक आंख से केवल सीमित दूरी तक दिखाई देने की शिकायत करे जो उसका तुरन्त इलाज होना चाहिये। जापान के अणु बम आक्रमण से अनेक पीडितों की नेत्र ज्योति लगभग पांच मिनट तक मन्द पड़ गई थी और कुछ हालतों में दो-दो दिन तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। आंख के गोलक (ढेले) की चोट में पीडितों की आंखें हल्के कपड़े से ढक दीं जाएं, उन्हें पीठ के बल चित्त लिटाकर सुरक्षित स्थान में ले जाइये और क्षीघ्र उन्हें योग्य चिकित्सक को दिखा कर इलाज करवाइये।

वीक्रेण जनित व्यथा (Radiation Sickness) की अभी तक चर्चा नहीं हुई इसलिए अब हम इस विषय में विस्पेट और वीक्रेण के दूसरे रूपों की जो कुछ चर्चा की गई है उस की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तार करेंगे। वीक्रेण से संबंध वाले खतरों के विषय में बड़ा प्रचार किया गया है। हमारे पाठकों को ध्यान रखना चाहिये कि यद्यपि वीक्रेण से व्यथा अवश्य होती है तथापि प्राथमिक सहायता पहुँचाने वाले या आकास्मिक दुर्घटना के समय यथासाध्य सहायक कार्य करने वाले जानकार व्यक्ति के समक्ष इस से कोई विशेष समस्या उपस्थित नहीं होती। स्वभावतः वीक्रेण से उत्पन्न होने वाली व्यथा साधारण विस्पेट या ज्वलनशील प्रकार के अग्नेय बम से अथवा कारखानों से होने वाले विस्पेटों से भी उत्पन्न नहीं होती।

अभी तक की गई सम्यक खोज-बीन और जाच-पड़ताल के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि विलकुल अ-सुरक्षित अवस्था में छूट जाने पर भी जो लोग विस्पेट से ६,००० फुट या इस से अधिक दूरी पर थे उन्हें वीक्रेण द्वारा किसी विशेष प्रकार की क्षति नहीं पहुँची। ऐसे बहुत कम उदाहरण मिले जिन में विस्पेट स्थल से एक मील से लेकर ६,००० फुट की दूरी पर स्थित लोगों में बाद में, रक्त में थोड़े-बहुत परिवर्तन की शिकायत पाई गई। परन्तु वीक्रेण के प्रभाव से केवल हल्के असर और अनिश्चित लक्षणों के अतिरिक्त शायद ही कोई व्यथा प्रगट हुई हो। पाठकों को

अवश्य ही इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये दूरियाँ केवल ऐसे लोगों से संबंध रखती हैं जो हिरॉयुमा के प्रकार के, पर्याप्त ऊँचाई पर आकाश मंडल में किये गए विस्फोटों के समय बिलकुल अ-सुरक्षित अवस्था में छूटे हुए हों।

न पीढ़ियों को और न उन का इलाज करने वालों को पता चल पाता है कि विकिरण से किस प्रकार की अ-सुरक्षा रही होगी। कोई नहीं जानता कि बाद में क्या खतरा होगा और उस की क्या सीमा होगी क्योंकि विकिरण दृष्टिगोचर नहीं होता। यह सत्य है कि "गामा किरणों" बड़ी तीक्ष्ण होती हैं, परन्तु यह भी सत्य है कि बम तथा व्यक्तियों के बीच जितना अधिक भारी पदार्थ होगा उतनी ही सुरक्षा उन्हें प्राप्त हो जाएगी। 'गामा किरणों' से बचने में कपड़ों से कोई लाभ नहीं हो सकता।

विकिरण जनित व्यथा (Radiation Sickness) के लक्षण बाद में प्रकट होते हैं और अनजान व्यक्ति के लिए इस बात का पता लगाना कठिन हो जाता है कि ऐसी कोई व्यथा हो गई या होने वाली है। ऐसा प्रतीत होता है कि जापान में साबधानी में कमी और सामान्य पथ-प्रदर्शन का अभाव होने पर भी पहले ही दिन जी मिचलाने और उल्टियों की शिकायत से लोग भुक्क हो गए थे। बड़े परिणाम में विकिरण द्वारा उबकाई आती है, उल्टियाँ होती हैं और अत्यंत चिंता एवं हर उत्पन्न होता है, किन्तु भय तथा चिंता से भी अवस्थाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। विकिरण जनित क्षति के परिणाम स्वरूप थोड़े-ही दिनों या हफ्तों में बिना उबकाई या उल्टियों के भी भूख में कमी, थकावट, आँसू, प्यास एवं ज्वर प्रकट हो सकते हैं। कुछ लोगों के सिर के बाल भी कुछ समय उपरांत संभवतः एक या अनेक हफ्तों बाद उड़ जाते हैं, परन्तु वे शीघ्र ही उग आते हैं।

बम वर्षा अथवा विस्फोट के समय विकिरण जनित क्षति के संबंध में औसत दर्जे का आदमी कुछ भी नहीं कर सकता अर्थात् जो कुछ भी बाद में किया जाय वह योग्य चिकित्सकों द्वारा किया जाना चाहिए। यह याद रखना ठीक होगा कि जो लोग किरण ताप में खुले छूट गए हों उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने को अधिक न थकावें और ठण्ड से बच कर रहें। उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी और निद्रा प्राप्त होनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि अच्छी प्रकार पर्याप्त मात्रा में वस्त्र पहनें, छोटे-मोटे घावों को स्पष्ट-संक्रमण से बचावें। उन्हें चाहिए कि पीलेपन, असाधारण थकावट उपस्थित या बाद में विकसित होने वाले संक्रमण के विषय में डॉक्टर का परामर्श लें, परन्तु याद रहे कि अणु आक्रमण में अपंग हो जाने का मूल कारण विकिरण नहीं होता।



सूइयां और जीवाणु-विकास-अवरोधक औषधियां

(Injections and Antibiotics)

वस्त्र, घर की सजावट और मनोरंजन आदि के विषय में तो लोगों को एक सनक सी सवार रहती ही है, परन्तु स्वास्थ्य और औषधियों के प्रयोग में भी उन का यही काल रहता है। कुछ वर्ष हुए प्रत्येक व्यक्ति की ओर से 'सल्फा' औषधियों (Sulpha Drugs) की मांग रही। फिर लोग कुछ वर्षों तक पेनीसिलिन (Penicillin) के पीछे दीवाने रहे। इस के बाद लोगों की सनक ऑरियोमाइसिन (Aureomycin) की ओर घूम गई और आज-कल यह सनक उन औषधियों व उपचारों पर केंद्रित हो गई है जिन्हें 'फुल स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स' (Full Spectrum Antibiotics) कहते हैं अर्थात् ऐसी औषधियां और ऐसे उपचार जो रोगों के कांटाणुओं के विकास को रोकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि कुछ सप्ताहों या महीनों बाद क्या हो। अतः यह जान लेना आवश्यक है कि और बातों के सगान औषधियों और उपचारों में भी सनक चलती है।

यह बात विशेष रूप से भली भांति समझ लेनी चाहिये कि यद्यपि किसी खास नाम से, किसी विशेष व्यापारिक संज्ञा या किसी विशेष प्रकार के 'एंटीबायोटिक' के रूप में जब कोई औषधि बिकती है, तो चाहे वह अनुसंधान के नाले नवीनतम वस्तु ही क्यों न हो, यह नितांत आवश्यक नहीं कि वह किसी भी रोग या सभी रोगों के लिए सर्वोत्तम औषधि या उपचार सिद्ध हो। हो सकता है कि वह किसी खास बीमारी या संक्रमण के लिए बहुत सफल हो सके, परन्तु दूसरे प्रकार की व्याधियों में उस का कोई मूल्य नहीं भी हो सकता।

अनेक लोग यह समझते हैं कि हमें किसी विशेष प्रकार के 'एंटीबायोटिक' का इंजेक्शन या 'पेनीसिलिन का इंजेक्शन' लगवाना चाहिये या 'सल्फा' औषधि द्वारा उपचार कराना चाहिये। ऐसी अवस्थाओं के सम्बन्ध में चैतावनी के एक-दो शब्द आवश्यक हैं। इस बात की पूरी सम्भावना है कि 'सल्फा' औषधियों का ना-समझी से प्रयोग करने वाले लोग अपने आप को स्थायी हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसी औषधियों का प्रयोग केवल तभी होना चाहिये जब उन बीमारियों या संक्रमणों का इलाज किया जा रहा हो जिन के लिए वे विशेषतः उपयुक्त हैं; परन्तु प्रत्येक प्रकार की व्याधि में ना-समझी से उन औषधियों के प्रयोग से मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था उत्पन्न हो सकती है जो अच्छी नहीं कही जा सकती। 'पेनीसिलिन एवं अन्य एंटीबायोटिक्स' का प्रत्येक प्रकार के शारीरिक उत्पात

में बार-बार प्रयोग करने से यह संभव हो सकता है कि जब किसी ऐसे संक्रमण के इलाज के लिये उन की अत्यंत तीव्र आवश्यकता हो जिस के लिए वे प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं, तो बिना समझ-बूझों और बार-बार उन का प्रयोग करने से उन का प्रभाव कम हो सकता है अतएव वे तत्सम्बन्धी दोष उस प्रकार दूर नहीं कर सकते जिस प्रकार उस अवस्था में करते हैं जिस में सोच समझ कर उन का प्रयोग किया जाता है। अतः इस पुस्तक के प्रकाशक इस बात पर बल देते हैं कि 'सल्फा' के समान औषधियां तथा स्वास्थ्य-लाभ के लिए 'पीनीसीलिन' अथवा 'एंटीबायोटिक्स' का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिये और यदि किया भी जाए, तो केवल तभी जब स्वास्थ्य-रक्षा या किसी उपचार विशेष के लिए उन की अत्यन्त आवश्यकता पड़े।

ऐसा लगता है कि संसार के अनेक भागों पर सूई (इन्जेक्शन) की सनक सवार है। बहुत से लोग समझते हैं कि यदि कम्पाउन्डर, डॉक्टर, बँट्या या अन्य कोई व्यक्ति उन के सूई लगा दे, तो उन के स्वास्थ्य के सुधारने में जादू का सौ असर हो जाएगा। परन्तु ऐसा होना आवश्यक नहीं। दूर्भाग्य से अनेक अनौतक व्यक्ति ऐसे लोगों के अन्धीविश्वास का नाजायज फायदा उठाते हैं और बिना आवश्यकता के ही उन्हें 'इन्जेक्शन' लगा कर मनमाने दाम वसूल करते हैं जब कि ऐसी सूइयों में मामूली सा ऐसा पदार्थ होता है जिस में औषधि का कुछ भी अंश नहीं होता।

सूइयों का अपना निजी स्थान है, परन्तु वे भी लाभप्रद हो सकती हैं जब किसी व्यक्ति की बीमारी में उन के प्रयोग की आवश्यकता का वास्तविक संकेत मिले। सूइयों तभी लगानी चाहियें जब उन की अत्यंत आवश्यकता हो। सूई लगाने में खतरा हो सकता है और स्वास्थ्य लाभ एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिये बिना विशेष आवश्यकता के उन की सिफारिश नहीं करनी चाहिये।

पोलियो (Polio) या शिशु पक्षाघात

पो लियो एक बहुत पुरानी बीमारी है, परन्तु इस की आधुनिक जानकारी १९०५ ईस्वी से पूर्व नहीं हो सकती थी।

पक्षाघात अचानक और बहुधा बिना किसी चेतावनी के बच्चों पर आक्रमण करता है चाहे वे स्वस्थ, अच्छा भोजन प्राप्त करने वाले और अच्छे घरों के निवासी, अथवा कमजोर, भरपेट भोजन न पाने वाले और झोंपड़ी के निवासी हों। इस का प्रहार होने पर पीड़ित व्यक्ति के कटुम्ब को अनेक दिनों या हफ्तों तक संशय और अनीतिचतता बनी रहती है और इस बात का अनुमान नहीं हो पाता कि इस आघात का अंतिम रूप क्या होगा। प्रायः देखने में आता है कि पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति सदा के लिये अपंग हो जाते हैं। जब यह प्राणहानि करता है तो शीघ्र ही घातक प्रहार करता है, परन्तु आम तौर पर सख्त बीमारी के बाद ही ऐसा होता है।

शिशु-पक्षाघात इस रोग के दो व्यापक रूप से प्रचलित नामों में से एक नाम है। पहले-पहल शिशु और बच्चे ही इस बीमारी के शिकार होते थे और उन्हीं दिनों इस बीमारी का नामकरण हुआ। दूसरी बात यह भी है कि रोग का प्रमुख लक्षण लकवे के रूप में प्रगट होता है यद्यपि अनेक बार यह पक्षाघात स्थायी नहीं होता। इस संज्ञा का पहला शब्द जब अधिकधिक अनुपयुक्त होता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कम-से-कम इस रोग के पीड़ितों का २५ प्रतिशत दस वर्ष से ऊपर की अवस्था वाले बालक थे और अधिक अवस्था के पीड़ितों की संख्या भी हटता से बढ़ती जा रही है।

शिशु-पक्षाघात का दूसरा नाम 'पोलियो' है। यह पोलियो माइलाइटिस (Polio-myelitis) का छेटा रूप है, और तीव्र एन्टीरियर पोलियो माइलाइटिस (Acute Anterior Polio-myelitis) कहने का संक्षिप्त प्रकार है।

जो व्यक्ति तीन शब्दों का अर्थ समझता है वह इस बीमारी का अर्थ जान लेता है। यह बीमारी बड़ी तीव्र होती है अर्थात् यह अचानक तीव्र गति से आती है और बड़ी भीषण प्रकार की होती है। यह रोग सृजन उत्पन्न करने वाला है। सृजन स्तम्भ (Spinal Cord) या लम्ब नाड़ी (Medulla) अथवा दोनों में आ जाती है। सब से अधिक गंभीरता से प्रभावित होने वाले भाग केन्द्रित चेता-संस्थान के आगे बढे हुए 'सींग' हैं जो 'H' आकार के और भूरे वर्ण के आंतरिक दो खंडों का रूप उपस्थित करते हैं। इन 'सींगों' पर स्नायु कोष (Nerve Cells) स्थित होते हैं जो शरीर के सभी ऐच्छक पेशियों के कार्य का संचालन करते हैं।

केन्द्रीय चेतना-संस्थान के 'पोलियो' द्वारा सब से अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र वे हैं जो पीठ, छाती, गर्दन, गले और कुछ सीमा तक आंखों जैसे अवयवों की पेशियों पर नियंत्रण रखते हैं। अधिकतर घटनाओं में ये सभी पेशियां प्रभावित नहीं होतीं; सामान्यतया केवल एक बांह या एक टांग ही पक्षाघात के लक्षण प्रकट करती हैं। जब छाती के सांस लेने में सहायक पेशियां बेकरार हो जाती हैं, तो जीवन की रक्षा ही सब से प्रमुख समस्या बन जाती है। परन्तु चाहे बीमारी के लक्षण कुछ भी हों, हमें याद रखना चाहिये कि प्रत्येक स्थिति में शरीर के जिन अंग या उपांगों पर लकवा पड़ता है, प्रायः उन्हीं पर सीधा प्रहार नहीं होता। पहले इन भागों के कार्यों पर नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय चेतना-संस्थान में स्थित कोशों पर क्षति पहुँचती है। चूँकि बिना स्नायु-नियंत्रण के कोई भी पेशी कार्य नहीं करती अतएव स्नायु कोष पर स्थायी या अस्थायी हानि पहुँचने का अर्थ यह हुआ कि उन के द्वारा नियंत्रित पेशी थोड़े-या अधिक समय तक पक्षाघात से प्रभावित हो गई, यद्यपि कुछ अवस्थाओं में किसी पेशी विशेष को संचालित करने वाले कोष ऐसी हानि से बच भी सकते हैं और इस के फल स्वरूप सारी पेशी पक्षाघात से पूरी तरह पीड़ित न हो कर केवल क्षीयल हो जाएगी।

जब गले की पेशियां, विशेषतः नरम तालू या निगलने से संबंधित पेशियां लकवे से प्रभावित होती हैं, तो खतरे की वास्तविक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये पेशियां लम्ब नाड़ी (Medulla) में स्थित उन कोशों के समूहों द्वारा संचालित होती हैं जिसे कभी-कभी सुषुम्ना-शीर्षक (Bulb) कहते हैं। इस तथ्य से सुषुम्ना-शीर्षक (Bulb) के पक्षाघात (Bulbar Polio) शब्द की उत्पत्ति होती है, और चूँकि सुषुम्ना भी सांस लेने के कार्य एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न होती है, अतएव सुषुम्ना-शीर्षक के पक्षाघात (Bulbar Polio) से प्रगट होता है कि प्राण खतरे में हैं।

अनेक अधिकारी अब इस बात पर सहमत हैं कि यह रोग संक्रामक होता है, और किसी व्यापकतः दृष्टा में "रोग का संक्रामक विष" परिवार के किसी एक या अधिक सदस्यों के कारण उत्पन्न होता है।

“रोग के लक्षण”

जब पक्षाघात का रोग-विष अपने शिकार पर प्रहार करता है तो सर्व प्रथम व्यया का मुख्य लक्षण पाचन शक्ति की गड़बड़ी के रूप में प्रकट होता है। इस का तात्पर्य यह नहीं कि यह लक्षण निश्चयतः पक्षाघात के आगमन का द्योतक हो, क्योंकि पाचन क्रिया की गड़बड़ी अनेक अन्य कारणों में से एक हो सकती है; दूसरी ओर सामान्य घटनाओं में पाचन क्रिया का अव्यवस्थित होना ही रोग का एक मात्र लक्षण हो सकता है। आज-कल अनेक चिकित्सक इसे निश्चित समझते हैं कि बहुत से सामान्य रोग अनेक दूसरे प्रकार के रोग तथा पाचन क्रिया की गड़बड़ी, जिस का वास्तविक कारण कभी ज्ञात नहीं हो पाता, इसी रोग-विष से होते हैं।

यदि वास्तव में पक्षाघात का आक्रमण होने वाला हो, तो चाहे पाचन-क्रिया में प्रारम्भिक गड़बड़ी हो या न हो, यह संभव है कि थोड़ा-बहुत बुराज़ार और सिर-दर्द, गले की खराबी इत्यादि तुरंत ही बढ़ने लगें। आसित अवस्थाओं में सिर-दर्द बढ़े, और

का होता है और गर्दन तथा पीठ के ऊपरी भाग में झीघू ही कड़ापन तथा दर्द महसूस होता है। इस प्रकार पीठित को यदि बिस्तर में सीधे बिछाने और उस की गर्दन एवं पीठ को आगे की ओर झुकाने का प्रयत्न किया जाए, तो उसे यह दर्द पहुँचता है और वह ऐसा प्रयत्न करने से रोکتा है। प्रारम्भिक लक्षणों में से ये सब से अधिक निश्चित हैं, और जब वे इस प्रकार प्रकट होने लगें तो जब तक किसी दूसरी व्याधि का निर्णय न हो जाए, तब तक पीठित का इलाज इस तरह करना उचित है मानो पक्षाघात की प्रारम्भिक अवस्था हो।

इन लक्षणों के प्रकट होते ही चिकित्सक को बताना चाहिये। संभव है कि वह सुशुम्ना के इर्द-गिर्द के तरल-पदार्थ की परीक्षा के लिए बड़े जिस से स्पष्ट हो जाय कि पक्षाघात का संक्रमण हुआ है या नहीं।

जब भी बतार हुए पक्षाघात के लक्षणों के अनुसार आधी अवस्थाओं में बीमारी आगे नहीं बढ़ती और थोड़े दिनों में लक्षण अट्ठश्य होने लगते हैं। ऐसी दशाओं में पीठित झीघू ही स्वस्थ हो जाते हैं, परन्तु कुछ दशाओं में पोंछियों की शिथिलता निश्चित रूप से बढ़ने लगती है और न्यूनाधिक सीमा तक रोग में पक्षाघात होने लगता है। जब तबका सामान्य सीमा का होता है, तो एक या थोड़ी सी कंधों की पोंछियों, बांह या टांग की पोंछियों पर ही प्रभाव पड़ता है। अधिक गम्भीर अवस्था में सभी अंगों की पोंछियां तथा गर्दन एवं धड़ की पोंछियां निष्क्रिय हो सकती हैं और परिणाम स्वरूप पीठित एक अंगुल भर भी नहीं हिल सकता और केवल रेस्पिरैटर (Respirator) अर्थात् 'लोहे के फेफड़ों' ही के द्वारा सांस ले सकता है।

पोंछी के प्रभावित होने की प्रारम्भिक अवस्था में, वास्तविक पक्षाघात के असली रूप में प्रकट होने से पूर्व, कुछ प्रभावित पोंछियों में बड़ा दर्द होता है जिस से प्रभावित अंग की किसी भी हरकत से बड़ी बंदना होती है। बीमारी की इस अवस्था में पक्षाघात के रोगियों की सेवा करने वाली परिचारिकाओं को यह ध्यान में रखना चाहिये कि पीठितों के प्रति उन का बतौर विशेषतः विनम्रतापूर्ण हो। कष्टप्रद पोंछियों की निष्क्रियता उन में प्रवाहित होने वाले रक्त को निश्चित कर देती है। इस रक्त परिभ्रमण में बाधा और निष्क्रिय पोंछियों के नष्ट होने का अर्थ है कि कुछ दशाओं में ये पोंछियां अपने प्रसम आकार और कार्यक्षमता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इस के बाद कष्टयुक्त पोंछियों की सिद्धुन या क्षीणता के साथ स्थायी पक्षाघात उपस्थित हो जाता है। केनी (Kenny) इलाज की महत्ता का एक कारण यह भी है।

‘केनी’ (Kenny) इलाज

‘केनी’ इलाज की प्रथम अवस्था में दुखती हुई और कष्टप्रद पोंछियों में बहुत दूर तक गरम गीददियों (Racks) का प्रयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सुप्रसिद्ध नर्स सिस्टर केनी द्वारा पक्षाघात में गीददियों का महत्व सिद्ध होने से बहुत पूर्व भी गरम गीददियां दर्द और बंदना दूर करने का साधन समझी जाती थीं; यद्यपि इन के द्वारा कोई दूसरा लाभ न हो, तो भी इन का प्रयोग करना ठीक होता है। परन्तु वे रक्त संचार को जारी रखने में भी सहायक होती हैं और इस प्रकार के पोंछियों के विकार को कम करने का

कार्य भी करती हैं। इस प्रकार जब रोग की तीव्र अवस्था गुजर जाती है, तो अच्छी किस्म के तंतु बच जाते हैं और पेशियों के प्रसम कार्य को पुनः स्थापित करने का सुयोग भी बना रहता है। दूसरे शब्दों में, वे पेशियों की झियलता या पक्षाघात के रोग से मुक्त में सहायता करते हैं।

पेशियों के दर्द और वेदना की इस अवस्था में पक्षाघात का अंतिम और विच्छिन्न रूप अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। वास्तव में ऐसी अवस्था में पेशियां न मुरझाई होती हैं और न झियल, परन्तु उन में प्रसम तनाव से अधिक तनाव आ जा है। पेशियों की ऐसी अवस्था को पेशी की ऐंठन (Spasm) कहते हैं और उन के तनाव का कारण उन्हें नियंत्रित करने वाली उत्तेजित चलाएँ होती हैं। यह उत्तेजना रोग-विष (Virus) के आक्रमण जौनित तुरन्त प्रकट होने वाले परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। मांसपेशी की ऐंठन (Muscles spasm) एक जानकार चिकित्सक के समक्ष ऐसा लक्षण प्रकट कर देती है जिस से उसे विश्वास हो जाता है कि पीड़ित को निम्नतः पक्षाघात की बीमारी है। यदि रोग-विष (Virus) के इस आक्रमण को न रोका गया, तो बाद में इस के द्वारा अनंके या सभी प्रभावित कोष (Cells) नष्ट हो जाएंगे। जिस से फिर पेशियों में किसी प्रकार का भी असर नहीं पड़ सकता। फलतः मांसपेशी कमजोर और असहाय हो जाती है; और इस प्रकार पेशियों आदि की कार्य-अक्षमता पोलियो (Polio) की अंतिम अवस्था होती है।

पक्षाघात की तीव्र अवस्था में पेशियों के दर्द और ऐंठन को कम करने के लिये अनंके दवाओं का प्रयोग करने का प्रयत्न किया गया है। इन दवाओं में से कुछ स्नायु कोषों (Nerve Cells) प्रभाव डालती हैं और उन का लक्ष्य पेशियों को शांत करना है। उन के कार्य को हल्का कर देना होता है। दूसरी क्रियाएँ रक्त संचार पर प्रभाव डालती हैं बाहरी तौर पर यह लाभ बढ़ाया परिप्राप्त होता है, परन्तु सदा यह खतरा रहता है कि वहाँ इन औषधियों की क्रिया से रोग-विष के आक्रमण के फल स्वरूप प्रभावित और न्यूनतम अवस्था में क्षीत ग्रस्त स्नायु कोषों में अधिक रुकावट न पड़ जाए। चाहे तुरन्त थोड़ा-बहुत आराम पहुँच जाए फिर भी यदि ऐसी दवाओं का प्रयोग न किया जाए तो अंतिम अवस्था बुरी नहीं होगी। इसीलिये पेशियों के दर्द और ऐंठन को नियंत्रण में रखने के लिए तेज दवाओं के प्रयोग की अपेक्षा केनी गैद्दियों (Kenny Packs) का उचित प्रयोग बेहतर समझा जाता है। केनी गैद्दियों (Kenny Packs) का अर्थ है कि उन का आकार कष्ट और वेदना के क्षेत्र के अनुरूप होना चाहिये और तंतुओं को जलाने के खतरे के बगैर उन का इतना गरम होना आवश्यक है जितना रोगी सहन कर सके। जब तक वे गरम ही रहें इसी बीच में नई गैद्दियों का प्रयोग किया जाना चाहिये। यदि उन्हें ठंडा और चिपीचपा होने तक छोड़ दिया गया तो रोगी की बेचैनी कम होने के बजाए बढ़ जाएगी।

गाम तौर पर रोगी और उस के घर वाले दोनों अस्पताल की अपेक्षा घर ही में देख-भाल करना बेहतर समझते हैं और कभी-कभी तुलनात्मक सुरक्षा के साथ ऐसा किया भी जा सकता है। अस्तु, सामान्य अवस्थाओं को छोड़ कर शेष में इस विचार का समर्थन करने के पूर्व चिकित्सक के लिए यह उचित होना कि वह इस बात का निश्चय कर ले कि रोगी के परिवार में से कोई-न-कोई व्यक्ति पक्षाघात के रोगी की देख-भाल करना

जानता है, और उस के पास सभी आवश्यक साज-सामान मौजूद है। उसे यह भी चाहिये कि यदि रोनी की दुहा बिगड़ने लगे तो उसे झीघू ही अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करे, ऐसी व्यवस्था बिना किसी चेतावनी के उपस्थित हो सकती है।

वायु-शोषक स्वांस-यंत्र (Respirator) का प्रयोग

सांस लेने में कठिनाई के कारण स्वांस-यंत्र (Respirator) का प्रयोग किया जाता है। यदि यह कठिनाई स्वांस लेने में सहायक छाती की पीछियों के पक्षाघात के कारण उत्पन्न हुई हो, तो तत्काल और उस के उपरान्त भी स्वांस-यंत्र का प्रयोग जीवन-रक्षा में अत्यंत सहायक हो सकता है। इस सम्बन्ध में कार्य करने वाली मांस पीछियाँ केवल छाती की दीवारों में नहीं होतीं, बल्कि ह्वासपटल या महाप्राचीरा (Diaphragm) भी इस में सहायक होता है। यह महाप्राचीरा पीछियों के तंतु-जाल का गुम्बद के आकार का एक पर्दा सा होता है और छाती और उदर-बहुवर के बीच में विभाजक का कार्य करता है। यदि इन पीछियों की अपेक्षा अन्य मांसपीछियाँ प्रभावित हों, जैसा कि सुष्पन्ना-झीबक के पक्षाघात (Bulbar Polio) में होता है, तो स्वांस-यंत्र से भी जीवन रक्षा नहीं हो सकती।

जब छाती की स्वांस-क्रिया में सहायक पीछियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं, तो रोनी केवल सांस लेने के अयोग्य ही नहीं हो जाता, बल्कि खांस भी नहीं पाता। इस का अर्थ यह है कि चाहे स्वांस-यंत्र आवश्यकतानुसार ह्वा अन्दर पहुँचाने में सहायक क्यों न हो, रोनी का वायु-मार्ग कफ या दूसरे खुरार इत्यादि मलोत्सर्गों के कारण जिनमें वह सामान्य अवस्था में खांस कर बाहर कर देता, अवरुद्ध हो जाता है।

आज-कल रोनी द्वारा स्वांस-यंत्र का प्रयोग कराते समय उस के तुरन्त बाद ट्यूकिया टॉमी (Tracheotomy) नामक शल्य-चिकित्सा की जाती है। इस शल्य-चिकित्सा में गर्दन के सामने की ओर एक सुराख कर दिया जाता है और रोनी की ह्वास-नलीका (Trachea) में उस के स्वर-यंत्र (Larynx) से थोड़े नीचे एक नली डाल दी जाती है। रोनी इस प्रकार इस नली द्वारा न केवल सांस लेने में समर्थ हो सकता है, बल्कि इस में से नर्स एक शोषक नली के प्रयोग द्वारा रोनी के वायुमार्ग को बलगम या अन्य उत्सर्ग निकाल कर साफ भी रख सकती है।

जब छाती की पीछियों का पक्षाघात पर्याप्त रूप से इतना कम हो जाए कि रोनी सामान्य ढंग से सांस ले सके, तो 'ट्यूकिया टॉमी' की नली सुगमता से हटा दी जा सकती है। शल्य-चिकित्सा में किया गया सुराख झीघू ही बंद हो जाता है, घाव भर जाता है।

स्वांस-यंत्र के प्रयोग करने वाले रोगियों को दिन में चौबीसों घंटे नर्सों की सहायता की आवश्यकता होती है और नर्स रोनी को देखभाल और मशीन को हर समय चालू रखने के कार्य में विशेष प्रकार से प्रशिक्षित होनी चाहिये।

पूरी तरह से पक्षाघात का पीडित कभी-कभी थोड़े ही महीनों में पर्याप्त रूप से स्वस्थ हो कर बिना किसी इलाज के इधर-उधर चलने-फिरने और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो जाता है। आम तौर पर लकड़ों से पीडित को

फिर से शक्ति पहुँचाने और उनके दैनिक कार्यों को करने में फिर से समर्थ बनाने में विशेष प्रकार की दीर्घ कालीन रोग संश्लेष (Therapy) चिकित्सा की अवस्था होती है। इस प्रकार का इलाज सिस्टर केनी (Sister Kenny) द्वारा आविष्कृत कार्यक्रम की दूसरी अवस्था के बड़े अंश का रूप लेती है।

पक्षाघात की घटनाओं की यौगिक संख्या का थोड़ा ही प्रतिशत ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जब इन या अन्य प्रकार के उपचारों द्वारा रोगी की दशा में कोई सुधार नहीं होता और जब पीड़ित व्यक्तियों को अपनी अपंगता को सम्भव रूप से कम करने के लिए शल्य-चिकित्सा के सहायक बंधनों (Braces) के प्रयोग की ओर अन्य उपायों का अवलम्बन करने की आवश्यकता होती है। पक्षाघात की ये अवस्थाएँ बहुत अधिक आकृष्ट करती हैं और जब लोगों को या उन के बच्चों को पक्षाघात के आक्रमण की संभावना प्रकट होती है तो उन का मानसिक चित्रण उन्हें बहुत विचलित कर देता है।

जब पक्षाघात का आक्रमण होता है

किसी व्यक्ति को पक्षाघात के एक आक्रमण के बाद दूसरा आघात बहुत ही कम अवस्थाओं में होता है। इस दृष्टि से यह रोग-विष (Virus) से उत्पन्न होने वाले, कनसू (Mumps) मॉतिया-चंचक इत्यादि अनेक रोगों से समानता रखता है। अतएव एक बार लकड़ा पड़ जाने पर इस के रोगी को इस से दूसरे आक्रमण का भय नहीं होना चाहिये।

संक्रामक रोगों के दीर्घ कालीन अध्ययन से यह सिद्ध हो चुका है कि जब रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु अथवा रोगविष हम पर आक्रमण करते हैं, तो हमारा शरीर तुरंत ही विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करना आरम्भ कर देता है, जिस से वह इन शत्रुओं का मुकाबला कर सके। इन रासायनिक रक्षा सैनिकों को सामूहिक रूप में एंटी बॉडीज (Antibodies) अथवा 'रोग निरोधक' की संज्ञा दी जाती है। साधारणतया ये रक्त की नालियों के साथ चलते हैं और इन में से अनेक बड़े जीवन पर्यन्त निवास करते हैं जिस से उसी प्रकार के रोग-विष अथवा कीटाणुओं के द्वारा कभी बाद में आक्रमण ही अवस्था में शरीर बिना क्षति उठाए हुए ही उन शत्रुओं पर सफलता से विजय प्राप्त कर लेता है। रोग के संक्रमण का प्रतिरोध करने वाली इस योग्यता का नाम रोग-प्रवण मुक्तावस्था (Immunity) है।

जिन्हें यह बीमारी हो चुकी है उन रोगियों के रीधर-द्रव या रक्त-रस (Serum) के अध्ययन से सिद्ध हो गया है कि रोग की तीव्र अवस्था के बीतने तक विशिष्ट प्रकार के निरोधकों (Antibodies) की मात्रा रीधर में बहुतायत से उपस्थित हो चुकती है। पक्षाघात (Polio) के सम्बन्ध में रोग-विष (Virus) पीड़ित के शरीर के विभिन्न भागों में पाया गया है, परन्तु नाक और गले के मलौत्सर्ग में तुलनात्मक दृष्टि से इस की बहुतायत पाई जाती है और आंतां द्वारा निस्पृष्ट मल में तो यह सब से अधिक मात्रा में होता है।

दीर्घ काल से देखने में आया है कि एक ही कटुम्ब में पक्षाघात की घटनाएँ एक से अधिक शायद ही होती हैं; और किसी व्यक्ति विशेष में यह विष कब से आ गया यह पहेली हल करना बहुधा असंभव हो जाता है। किसी समाधान की प्राप्ति के प्रयत्न में स्वस्थ कटुम्ब के सदस्यों के शारीरिक मलौत्सर्ग की अनेक बार जांच की गई है। बहुधा

ऐसा होता है कि इन में से सब या अधिकांश अवस्थाओं में उन सदस्यों को बिना प्रभावित किए ही रोग-विष (Virus) उन के अन्दर उपस्थित रहता है और यह भी संभव है कि यह विष उन में रोगियों से भी अधिक समय तक रहे और उन्हें हानि न करे। इस के अतिरिक्त पक्षाघात (Polio) से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के सामुदायिक अध्ययन से पता चलता है कि ऐसे स्थानों में रोग-विषयुक्त लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है। वास्तव में इस रोग के प्रशिष्टित जानकार लोगों का अनुमान है कि पक्षाघात के संक्रमण के दिनों में किसी जन समुदाय में रोगियों की संख्या से साँ गुना या उस से अधिक स्वस्थ व्यक्ति ऐसे निकलने जिन के शरीर में यह रोग-विष उपस्थित होता है।

अब विशेषज्ञ लोग विश्वास करने लगें हैं कि अधिकांश पक्षाघात के रोगियों को ऐसे स्वस्थ लोगों से यह बीमारी लग जाती है जिन में रोग-विष पहले ही से उपस्थित रहता है, परन्तु इस का पता नहीं चल पाता। इस का अर्थ यह है कि रोग पकड़ने की अवस्था का पता लगाने का कोई व्यावहारिक उपाय नहीं है और रोगियों को अलग रखना या संसर्ग-प्रीतबंध-व्यवस्था (Quarantine) इस सम्बन्ध में बहुत ही कम सहायक सिद्ध होती है।

इन अब संक्षेप में निरोधक तत्वों (Antibodies) के विषय पर दूसरे ढंग से टिप्पणी करेंगे। ऐसा पता चला है कि बीमारी से संक्रामक रूप में प्रभावित क्षेत्र के अनेक स्वस्थ निवासी केवल रोग विष युक्त होते हैं, बल्कि उन के रीधर-द्रव (Serum) में निश्चित प्रकार से पक्षाघात के निरोधक तत्व अत्यधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः इस प्रकार के तथा दूसरी श्रेणी के उन लोगों के जिन्हें स्पष्ट रूप में कभी लकड़ों का रोग न हुआ हो, सम्यक अध्ययन से प्रगट हुआ है कि अनेक तरुणावस्था वालों (१३ से १९ वर्ष तक वालों) और सभी प्राँट. लोगों में पक्षाघात विरोधी तत्वों का भंडार रहता है। वास्तव में यही कारण है कि जिन लोगों पर कभी लकड़ा न गिरा हो उन में से इतने अधिक व्यक्ति तीव्र पक्षाघात से पीड़ित लोगों के सम्पर्क में आने पर भी इस बीमारी से अछूते छूट जाते हैं। इस अद्भुत प्राकृतिक घटना को समझने के लिये हमें वाध्य हो कर इस निष्कर्ष पर पहुँचना है कि उन में रोग के प्रतिरोध की शक्ति का मुख्य कारण उन का एक या अधिक बार रोग के सम्पर्क में आना, अस्थायी रूप से विषयुक्त होना और सामान्य प्रकार से रोग युक्त या रीहृत होना ही है। इन्हीं सम्पर्कों के कारण पक्षाघात के लक्षण प्रगट हुए बिना ही उन के अन्दर निरोधक तत्वों (Antibodies) की दृष्टि में उत्तेजना मिली। अतएव यह स्पष्ट है कि १३ से १९ वर्ष तक के बच्चों में से बहुत से और प्राँट. में से अधिकांश पहले ही से पक्षाघात से अनाक्रमणीय (Immune) हो जाते हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास कोई ऐसे साधन नहीं है जिन से बिना थकाऊ और खर्चीली परीक्षा के किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इस की पूर्णता की जा सके। संभवतः यह कहना विश्वस्त ही होगा कि चाहे असित प्राँट. व्यक्ति कितनी ही बार या रोगी के कितने ही निकट सम्पर्क में आए, उसे साँ में एक बार भी इस बीमारी से पीड़ित होने की संभावना नहीं होती।

पक्षाघात के टीकों का प्रयोग

पक्षाघात विरोधी टीके हमारे समक्ष इस रोग की रोक-थाम के लिए एक दूसरी और

अधिक आशाजनक व्यवहार विधि प्रस्तुत करते हैं। आम तौर पर इन टीकों के द्वारा शरीर में शक्तिशाली रूप में रोग निरोधक तत्व (Antibodies) उत्पन्न करने की प्रेरणा मिलती है और इस प्रकार रोग से शरीर की रक्षा हो जाती। डॉक्टर सॉक (Dr. Salk) द्वारा जीवजैव पक्षाघात के टीकों की उन्होंने स्वयं तथा कुछ अन्य लोगों ने पशुओं तथा स्वेच्छा से अपने टीका लगवाने वाले व्यक्तियों पर ध्यानपूर्वक परीक्षा की और इस के उपरांत सन् १९५४ में विश्वस्त क्षेत्रीय जांच द्वारा स्वीकृत होने पर संयुक्त राज्य अमेरिका में १९५५ की बसंत ऋतु में स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं तथा अनेक राज्यों में विश्व पक्षाघात के निमित्त राष्ट्रीय स्थापना (National Foundation for Infantile Paralysis) के तत्वावधान में दसियों लाख बच्चों के टीका लगाया गया। अब यह टीका हानि-रहित और प्रभावशाली सिद्ध हो चुका है। पक्षाघात के ऊपर अंतिम विजय की निश्चित संभावना दिखाई पड़ती है। पक्षाघात के रोग-विष (Polio Virus) की तीनों कष्टप्रद अवस्थाओं में इस टीके की संशोधित इरीणयां प्रभावशाली होती हुई मालूम पड़ती हैं।

इस बीमारी की रोक-थाम करने की कुछ प्रणालियां हैं जिन का संभावित मूल्य है अतएव इन का प्रयोग किया जा सकता है। रोगग्रस्त होने से कुछ सप्ताह पूर्व पीडितों के अनुभव और यात्राओं के अध्ययन से इस संभावना का संकेत मिलता है कि पक्षाघात के रोग के संक्रमण के निमित्त कुछ पारोस्थीतियां मार्ग प्रशस्त करती हैं जिस से यह सुझाव मिलता है कि कुछ आवश्यक सावधानियां बरती जानी चाहियें।

चूंकि रोग का आक्रमण होते ही बार-बार पाचन क्रिया की गड़बड़ होने लगती है और चूंकि पीछियों पर बहुधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। यह मृत्नासब जान पड़ता है कि पक्षाघात के मौसम में, चाहे मौसम कैसा ही हो, अस्वाभाविक या कीठनता से हजम होने वाले खट्टा पदार्थों का सेवन करने में सामान्य से अधिक सावधानी बरतनी चाहिये, और साथ ही आदत के अनुसार किसी भी कीठन प्रकार के शारीरिक व्यायाम का भी परित्याग करना चाहिये। इसी प्रकार चूंकि रोग-विष (Virus) रोगी के नाक, गले आंतां के मल-मूत्र में बहुतायत से पाया जाता है और इस प्रकार के मल द्वारा शय दूषित हो जाते हैं अतएव हाथ-मुंह धोने के उपरांत प्रयोग किया हुआ जल तथा शारीरिक मल को दूर करने का विशेष ध्यान रखना चाहिये। यद्यपि यह वास्तव में सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि दूषित भोजन शरीर के भीतर रोग-विष उत्पन्न कर देता है, तथापि इस की संभावना बनी रहती है। अतएव भोजन को दूषित होने से बचना चाहिये और विशेषतः मीठपच्यों से इस की रक्षा होने की चाहिये क्योंकि ये रोग-विष वाहक सिद्ध हो चुके हैं। इस के अतिरिक्त चूंकि रोग-विष (Virus) के वाहक स्वस्थ व्यक्ति भी सामान्य नागरिकों में होते ही हैं और रोग द्वारा प्रभावित क्षेत्र में तो और भी अधिक संख्या में होते हैं। अतएव भीड़-भाड़ से दूर तथा जिन के साथ छाल में या अधिक बार संपर्क न रख हो ऐसे लोगों से भी बच कर रहने से बीमारी लगने का खतरा कम हो जाता है।

अनेक चिकित्सकों का विश्वास है कि जब पक्षाघात संक्रमक रूप में प्रकट हो रहा हो तो नाक और गले की छल्य चिकित्सा करना बुद्धिमानी नहीं क्योंकि ऐसा मालूम पड़ता है कि इस प्रकार छल्य-क्रिया से रोग-विष के शरीर में प्रवेश करने के लिये द्वार खुल जाता है। ऐसी अवस्था में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि रोगी पक्षाघात के

उस भयंकर रूप से पीड़ित हो जाए जिससे सुष्पन्ना-बीर्बक का पक्षाघात (Bulbar Polio) कहते हैं जब तक इस प्रकार के खतरे की संभावना हो तब तक बड़ी सावधानी बरतना उचित होना। अनेक बार बल की ख़लिय चिकित्सा जैसे कि ग्रीन्स्टीचों को निकाल देना इत्यादि भी पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य को ख़तरा उत्पन्न किए बिना कुछ सप्ताह तक रोक दिया जा सकता है।

अध्याय ४०

आकस्मिक घटनाओं में प्राथमिक सहायता या चिकित्सा

आकस्मिक घटनाएं तो आए दिन घटती ही रहती हैं। प्रत्येक बड़े परिवार में झांपद ही कोई ऐसा दिन जाता है कि किसी-न-किसी के चोट-चपेट न लग जाती हो, तबचा कहीं से छिल न जाती हो, कोई अंग कुचल न जाता हो, आंख में कुछ न पड़ जाता हो या दांत में पीड़ा न उठ खड़ी होती हो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि ऐसी चोट बड़ी गहरी होती है, उदाहरणार्थ—कोई हड्डी टूट जाए या कहीं से इतना गहरा कट जाए कि बहुत खून निकलने लगे। ऐसी दुर्घटनाओं के समय बहुत से लोग तो बस खड़े-तमाशा देखते रहते हैं और पीड़ित व्यक्ति को कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिये, क्योंकि तात्कालिक और उचित उपाय से किसी पीड़ित व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं।

पट्टी बांधना

प्रायः प्रत्येक चोट पर पट्टी बांधनी आवश्यक होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इरर के विभिन्न भागों पर पट्टी बांधना सीखना चाहिये। पोट्टियां साफ कपड़े की होनी चाहिये। हाथों और टांगों की पोट्टियां दो-दो इंच चौड़ी होनी चाहियें। उंगलियों की पोट्टियां एक इंच से थोड़ी कम चौड़ी होनी चाहिये। कुछ पोट्टियां पहले ही से तैयार कर के रख लेनी चाहिये। इन को मोल कर के साफ कनज या साफ कपड़े में बांध कर रख लेना चाहिये। जबले तीन पृष्ठों के चित्रों द्वारा पोट्टियां बांधने की ठीक रीति दिखाई गई है।

प्राथमिक चिकित्सा का बक्स

चिपकने वाली एक-एक इंच चौड़ी पीट्टियां; प्रत्येक पट्टी एक जलग डब्बे में रखी है।

पतले हलके कपड़े. (Gauze) के लगभग तीन इंच लम्बे और तीन इंच चौड़े. चाँकरे टुकड़े. जो कीटाणुरहित हों, प्रत्येक टुकड़ा एक जलग डब्बे में रखा है।

भिन्न-भिन्न चौड़ाई की कीटाणुरहित पीट्टियां, ये जलग-जलग डब्बों में रखी हैं। तिकनी पीट्टियां।

कीटाणुरहित पतले-हलके कपड़े. (Gauze) के गज-गज भर के चाँकरे टुकड़े., ये जलग-जलग डब्बों में रखे हैं।

जल हुए पर लगाने का मरहम। यदि इस में पाँच प्रतिशत जमा हुआ टैनिक एसिड (tannic acid jelly) मिला हुआ है तो और भी अच्छा है।

एरोमैटिक स्पिरिट्स ऑफ़ अमोनिया (aromatic spirits of ammonia), यह रबड़ की छट वाली झोड़ी में है।

दो प्रतिशत आयोडीन (iodine) वाला घोल, यह रबड़ की छट वाली झोड़ी में है।

घमनी पर चाप दे कर रक्तस्राव को रोकने के लिए काम में लाए जाने वाली पीट्टियां आँद (Tourniquet), ये लचकीली न हों।


कैची।

तीन-तीन इंच लम्बी खपीचियाँ।

एक-एक और दो-दो इंच चौड़ी पीट्टियां जो लपेट कर गोल की हुई हैं (roller bandages)।

तार या पतले तख्त की खपीचियाँ।

आँखों में लगाने के लिए कंच की नीलियों में भरा हुआ कॅस्टर ऑइल (Castor Oil) या मिनिरल ऑइल (Mineral Oil)।



पट्टी को गोलार्ध में लपेटने की रीति



पट्टियों के प्रकार


- A. सिर की पट्टी—यह आगे से पीछे और पीछे से आगे लेजा-लेजा कर बांधी जाती है (Recurrent of head) । B. गर्दन में चारों ओर लपेटे जाने वाली पट्टी । C. छाती और कंधों की विशेष पट्टी । D. अंग्रेजी अंक 8 के आकार में बांधी जाने वाली वह पट्टी जिस के विभिन्न केन्द्र हों (Eccentric figure-of-eight) । E. अंग्रेजी अंक 8 के आकार में बांधी जाने वाली वह पट्टी जिस का एक ही केन्द्र हो (Concentric figure-of-eight) । F. उरसोन्ध (groin) की पट्टी; इस में लपेटें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आकर चित्रित आकार ग्रहण कर लेती हैं (Spica of groin) । G. उंगली के छोर की पट्टी । H. टांग की पेंचदार वह पट्टी जिस में लपेटें एक ओर पलटा खा-खा कर नीचे की ओर उतरती हैं (Spiral reverse of leg) । I. टांग की पेंचदार वह पट्टी जिस में लपेटें एक ओर पलटा खा-खा कर ऊपर की ओर चढ़ती हैं (Ascending spiral of leg) । J. अंग्रेजी अंक 8 के आकार में बांधी जाने वाली पांव और गट्टे की पट्टी (Figure-of-eight of foot and ankle) ।

शरीर के किसी अंग का कुचल जाना

जब कोई व्यक्ति गिर पड़ता है या उस के शरीर के किसी अंग पर चाँट पड़ जाती है तो त्वचा के भीतर के मांस को हानि पहुँचती है और छोटी-छोटी कुछ रक्त-वाहिनियाँ कट जाती हैं। इस से चूटीला स्थान नीला भस्मा सा दिखाई देने लगता है।

चिकित्सा

तुरन्त ही इस चूटीले स्थान पर या तो बर्फ रख दीजिये या ठंडा-ठंडा पानी डालिये। चूटीले भाग को ऊपर उठाइये; इस से पीड़ा कम होती है। यदि चूटीले स्थान का मांस फट



घटने की पंचवार बह पट्टी जिस में लपेटें एक ओर पलटा खा-खा कर नीचे की ओर उतरती हैं। घटने की चक्की से जरा ऊपर से बांधना ज़रूरी कीजिये और घटने के नीचे पलटें दे कर अन्त में पिन लगा दीजिये।

गया हो, तो उस पर थोड़ा सा सल्फाथियाज़ोल का पाउडर (Sulfathiazole Powder) बुरक दीजिये और साफ कपड़े की पट्टी बांध दीजिये।


अपघर्षण और कट जाना

किसी घाव को साफ करने समय उस को जितना कम छुआ जाए, उतना ही अच्छा होता है। घाव को बिल्कुल साफ पानी, या साबुन और पानी से धोइये, साफ कपड़े, से उसे सुखा दीजिये, और यदि घाव छंटा और काफी साफ है, तो उस पर सल्फोथायमाजाल लगाइये और फिर पट्टी बांध दीजिये। जब तक घाव बिल्कुल भर न जाए, तब तक प्रोविदन पट्टी खोल कर नई पट्टी बांधते रहना चाहिये।


यदि घाव बड़ा है और संक्रमित हो गया है तो एक-दो दिन तक बड़ी सी नीली पट्टी घाव पर बांधनी चाहिये जिस से वह साफ हो जाए। यह नीली पट्टी साफ पतले-इलके



खुले हाथ या पंजे पर पट्टी बांधने की रीति।




खुले हाथ या पंजे की पट्टी।




बांह की पट्टी—कलाई पर से बांधना आरम्भ कीजिये और चित्रित रीति से ऊपर की ओर बांधते जाइये ।




कलाई की पट्टी—अंगुल के अनुसार एक-के-बाद-एक लपेट देते जाइये ।



अंग्रेजी अंक 8 के आकार में बांधी जाने वाली कोहनी की पट्टी ।



उंगली की पट्टी—प्रत्येक उंगली पर अलग-अलग बांधिये । उंगली की पट्टी—अंगुली के अनुसार लपेटें दीजिये ।



स्तन और छाती की पट्टी ।




सिर के लिए
चार-खोपें
वाली पट्टी



सिर की पट्टी—घीघ्रित रीति से कपड़े को काट कर चार छोर बना लीजिये; जंकों के अनुसार बाँधिये।




खोपड़ी की पट्टी।



आंख पर पट्टी बांधने की रीत ।


सिर की तिकुनी पट्टी—एक ओर का चित्र ।



सिर की तिकुनी पट्टी





आंख की
पट्टी ।



जांघ की पट्टी— चित्रित रीति से पट्टी काटिये और दक्षित रीति से बांधिये ।

कंधे की पंचवार वह पट्टी जिस में
लपेटें एक ओर पलटा खा-खा कर
ऊपर की ओर चढ़ती हैं (Spiral
bandage of the Shoulder) ।





बांह के ऊपरी भाग और कंधे को पट्टी ।



बांह की झोली (Sling) के लिए त्रिकोणी पट्टी ।

कपड़े (Gauze) या सूती कपड़े की छेँ और इसे कई तहें लगा कर मोटा कर लिया जाए और फिर एप्सम साल्ट (Epsom Salt) के घोल में अच्छी तरह भिना लिया जाए (घोल बनाने के लिए एक प्याले गरम पानी में चाय की चम्मच भर एप्सम साल्ट चाहिए—चम्मच खूब ऊपर तक भरा है)। इस कपड़े को नीला रखने के लिए बार-बार एप्सम साल्ट का थोड़ा-थोड़ा घोल इस पर डालते रहना चाहिये। जब इस उपाय से घाव बिल्कुल साफ हो जाए, तो एक साफ-सुथरे कपड़े के टुकड़े पर सल्फायजोसोल मरहम की पतली सी तह लगा कर घाव पर रख दिया जाए। इस से घाव जल्दी भर जाएगा। इसे साफ रखने के लिए प्रीतिदिन, या यदि आवश्यकता है, तो दिन में दो-तीन बार, पट्टी बदल देनी चाहिये।

गहरे घाव जिन में से रक्त अधिक बहता है

यदि घाव से खून निरन्तर निकलता रहे और बन्द न हो, तो कपड़े के एक टुकड़े को बहुत गरम पानी में डुबा कर घाव पर रखना चाहिये और दबाना चाहिये। पानी बहुत गरम होना चाहिये, नहीं तो इस उपाय से कोई लाभ नहीं होगा।

यदि घाव में से खून बहुत तेजी से बह रहा हो, तो रोंगी को लिटा दीजिये और दोनों अंगुठों से घाव के ऊपर के भाग को दबाइये। यदि हाथ या टांग पर घाव लगी हो, तो एक कपड़े या रुमाल को तह कर के घाव के जरा ऊपर ढीला बांध दीजिये और उस में एक मजबूत लकड़ी या डंडा डाल कर उसे एँठिये। एक छोटा सा नोल पत्थर या एक काँच घाव के ऊपर पट्टी की तह में रक्खा जाए, तो यह केवल कपड़े को घाव के ऊपर बांधने की अपेक्षा रक्त बन्द करने में अधिक सफल रखेगा। कपड़े को जोर से एँठिये, परन्तु हर १५ मिनट के पश्चात् ढीला कर दीजिये जिस से खून का दौरा उन भागों में रुक न जाए। जिस हाथ या टांग में से रक्त बह रहा हो उसे ऊपर उठा कर किसी वस्तु पर टिका दिया जाए जिस से रक्त का प्रवाह कुछ कम हो। ज्योंही रक्त का बहना बन्द हो जाए, त्योंही उस कसी हुई पट्टी को धीरे-धीरे ढीला कर देना चाहिये, एक बार में बहुत कम ढीली हो, क्योंकि यदि पट्टी एक दम ढीली कर दी गई, तो घाव से फिर खून बहने लगेगा।

ज्योंही पट्टी कस कर बांध दी जाए और खून निकलना कम हो जाए, त्योंही एक तीली या सीक के छोर पर थोड़ी सी धुनी हुई रुई लगा लेनी चाहिये और फिर टिंक्चर आयोडीन, मर्थियोलेट (Merthiolate), डेटोल (Dettol) या और किसी निःसंक्रमक द्रव्य में भिना कर इस फाहे को घाव पर रख देना चाहिये। जब रक्त बहना बन्द हो जाए तो उस घाव पर कपड़े की कुछ तहें रख दीजिये। कपड़ा कुछ मिनट तक पानी में उबाल लिया गया हो। इस के बाद पट्टी बांध दीजिये।

खोपड़ी के घाव से रक्त-स्राव बन्द करने का उपाय

घाव पर एक पतला सा कपड़ा टिंक्चर आयोडीन में भिना कर रख देना चाहिये;

फिर इस के ऊपर साफ कपड़े, की कहीं तहें लगा कर नद्दी सी बना देनी चाहिये। इस नद्दी को जोर से घाव पर दबाइये।

चेहरे और गर्दन से रक्त बहना

कटे हुए छोट से रक्त बहना इस प्रकार बन्द करना चाहिये। हाथ धोकर अंगूठे के पास वाली उंगली मुँह के भीतर जोर अंगूठ बाहर रख कर घाव वाले स्थान को अंगूठे और उंगली से जोर से दबाइये।

चेहरे से अधिक रक्त बहते समय रोनी का बला इस प्रकार पकीडिये मानो आप उस का बला घोंट रहे हों। उस का बला जबड़ों के नीचे से पकड़ कर जोर से दबाइये। इस से खून निकलना कम हो जाएगा। इस के जीतीरक्त नद्दी बना कर घाव को रीसे ही दबाइये जैसा कि खोंपड़ी के घाव से रक्त-स्राव बन्द करने के विषय में बताया गया है।

कंधों और बगलों से खून बहना

हंसली की हड्डी के बीच के भाग को पीछे से अंगूठे की सहायता से जोर से दबाइये। (पृष्ठ ३१५ देखिये)

दबाव-बिन्दु (Pressure-Points)

पृष्ठ २४ पर तीरों द्वारा तथा पृष्ठ ३१४ पर नन्हें-नन्हें वृत्तों (Circles) द्वारा दिखाए गए स्थानों पर यदि धमनियों को दबाया जाए, तो दबाए हुए स्थान से अगले स्थानों का रक्त-स्राव बन्द करना सम्भव हो सकता है; उदाहरणार्थ—यदि टांग में से बहुत रक्त स्राव हो रहा हो, तो जांघ पर के दबाव-बिन्दु को दबाने से रक्त-स्राव बहुत कुछ कम हो जाएगा। इसी प्रकार कोहों और दबाव-बिन्दु दबाया जाने से अत्यन्त रक्त-स्राव के नियंत्रण में बड़ी सहायता मिलती है।


घाव संक्रमित (infected) हो जाने पर क्या करना चाहिये

जब घाव लाल हो जाता है, उस में दर्द होने लगता है और वह सूज जाता है और उस में पीप पड़ जाती है, तो इस का सब से अच्छा इलाज यह है कि कपड़े के छोट-छोट टुकड़ों को एक चम्मच बोरिक एसिड और आधे प्याले पानी से बने हुए घोल में भिगो कर घाव पर रक्खा जाए। कपड़े पर बार-बार थोड़ा-थोड़ा यह घोल डालते रहना चाहिये जिस से यह बराबर नीला रहे। घाव पर रक्खे जाने वाले इन सब कपड़ों को पहले गरम पानी में उबाल लेना चाहिये। यदि बोरिक एसिड के घोल से भीयं हुए कपड़े के ऊपर मोमजामे का टुकड़ा या मोम का कागज या केल के पत्ते का टुकड़ा रख दिया जाए, तो यह कपड़े


धमनियों के रक्त-स्राव को रोकने के लिए छः
मुख्य दबाव-बिन्दु ।



हृदय और घाव के बीच, घाव से निकलता
रक्त-बिन्दु को दबाइये ।




बांह के ऊपरी भाग में
धमनी पर चाप दे कर रक्त-
स्राव रोकने का साधन
(tourniquet) ।





कनपटी की धमनी पर दबाव (चाप) ।



अधोजत्र (अधोक्षक) धमनी (Sub-clavian artery) का दबाव-बिन्दु । बाईं
शिरा-धमनी पर दबाव ।



बांह के ऊपरी भाग में थमनी पर दबाव ।



घेहरे की थमनी पर दबाव ।



उरुसिन्ध (Groin) की थमनी पर दबाव ।


को जल्दी सूखने नहीं देगा। यदि बोरक एंसड न मिल सके तो साधारण नमक, एपसम सॉल्ट का प्रयोग किया जा सकता है।

यदि हाथ या पैर के किसी घाव या चोट में पीप पड़ गई है, तो बारी-बारी से गर्म और ठंडे पानी से सेंकिये। यह उपचार पृष्ठ १५१ पर देखिये।

मोच आना

मोच एक ऐसी चोट है जो जोड़ के यकायक मुड़ जाने से आती है। प्रायः कलाई और टखने के जोड़ों में मोच आ जाती है।

मोच आए हुए भाग को आधे घंटे तक ठंडे पानी में डबाए रखिये। यदि पास नदी या चश्मा बहता हो तो इलाज और भी सरल हो जाता है। यदि टखने में मोच आ जाने के बाद चलना पड़े, तो पृष्ठ २१८ पर के चित्रों के अनुसार पट्टी बांधिये।




बांह के ऊपरी भाग में धमनी को अपने आप बसाना।

घर पहुँचने पर बटुटे (टखने) पर अंग्रेजी अंक ४ के आकार में पट्टी कस कर बांध दीजिये। यदि सम्भव हो, तो एक छोटी सी र्थली में बर्फ भर कर दुखते हुए बटुटे पर रख दीजिये। (परन्तु यह ध्यान रहे कि र्थली और बटुटे के बीच फ्लार्लिन का एक टुकड़ा अवश्य रख दिया जाए।) दो घंटों के बाद आध घंटे के लिए र्थली हटा देनी चाहिये। बारह घंटों के बाद बारी-बारी से पृष्ठ १५१ पर वर्णित विधि के अनुसार गरम और ठंडे पानी से सेंकना चाहिये। इन इलाजों के बीच-बीच में टखने पर इस प्रकार पट्टी बांधिये कि अराम मिले; हो सके तो रिबंचने वाली (clastic) पट्टी का प्रयोग कीजिये। प्रायः इस प्रकार की चिकित्सा कुछ ही दिन तक आवश्यक होती है।


टूटी हुई हड्डियाँ

हड्डी टूट जाने पर सदा डॉक्टर को बुलाना चाहिये। नीचे दिये हुए तात्कालिक




बांध आए हुए गट्टे (टखन) पर पट्टी बांधने की रीति ।


गट्टे को सुरक्षित रखने के लिए: (१) दो इंच चौड़ी एक संकरी पट्टी लीजिये और उसे पांव के नीचे एड.१ के बिल्कुल आगे रखिये । दोनों सिरों को ऊपर की ओर उठाते हुए गट्टे के चारों ओर इस प्रकार लपेटिये कि दोनों सिरें एड.१ के ऊपर आडे, छे कर एक दूसरे पर आ जाएं । (२) अब दोनों सिरों को आगे की ओर इस प्रकार ले जाइये कि वे पांव के ऊपरी भाग (instep) पर आडे, छे कर एक दूसरे पर आजाए । फिर नीचे पांव के घुमाव (arch) की ओर लेजाइये और दोनों ओर एक-एक सिरें को पट्टी के नीचे खोस दीजिये । (३) दोनों सिरों को पीछे की ओर ऊपर को कस कर खींचिये और पांव के ऊपरी भाग (instep) पर ला कर बांध दीजिये ।



ठांग के निचले भाग की टट्टी इन्हें बंधाई के लिए अच्छी सपत्थी ।



अन्न-बाह्य की टूटी हुई हड्डी के लिए कम-चलाऊ खपटनी ।



टूटी हुई हड्डी के जड़ने में प्रकृतिक का उदारतापूर्ण कार्य ।

उपाय उन के लिये हैं जिन्हें तुरन्त ही डॉक्टर न मिल सकता हो; और इन का प्रयोग केवल इतनी देर करना चाहिये जितनी देर डॉक्टर के आने में लगे।

जब किसी व्यक्ति की कोई हड्डी टूट जाए, तो उसे धीरे से लिटा दीजिये और कहिये कि चुपचाप रहे। जब हड्डी टूट जाती है, तो उस के दोनों टूटे सिरों पर नुकीले टुकड़े, इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार टूटी हुई लकड़ी के टूटे सिरों पर रहते हैं। जरा सा हिलने-डुलने से ये नुकीले टुकड़े, मांस में बुरी तरह चुभते हैं, और बहुत कष्ट और क्षति पहुँचाते हैं।

जिस व्यक्ति की हड्डी टूट गई हो उसे कहीं उठा कर ले जाने से पूर्व चूटीले अंग पर किसी प्रकार की खपच्ची बांध देनी चाहिये जिस से हड्डी के टूटे सिरों हिल न सकें।

यदि बांह या टांग की हड्डी टूट गई हो तो बांस की चौड़ी-चौड़ी खपच्चीयाँ बना लीजिये। यदि बांह की हड्डी टूटी हो तो बांस की खपच्चीयाँ एक-एक फुट लम्बी होनी चाहिये और यदि टांग की हड्डी टूटी हो, तो खपच्चीयाँ इतनी लम्बी हों कि पैर से ले कर कूल्हे तक पहुँच जाएँ।

खपच्ची बांधने के लिए पहले टूटी बांह या टांग को बहुत ही धीरे-धीरे इतना सीधा कर लीजिये कि खपच्ची जम सके। यह काम बहुत धीरे-धीरे और सावधानी से करना चाहिये जिस से बहुत अधिक पीड़ा न हो। इस के पश्चात् टूटे हुए भाग के चारों



ओर ढेर सी रुई लपेट दीजिये या रुई न मिल सके तो कपड़े के टुकड़े, बांध कर गद्दी सी बना लीजिये और खपच्चीयाँ चारों ओर कस कर बांध दीजिये। यह सब कुछ करने के पश्चात् ही रोगी को घर, अस्पताल या औषधालय ले जाना चाहिये।

टूटी हड्डी को जुड़ने के लिए तीन सप्ताह या उस से भी अधिक समय लगता है, अतः उस समय तक ये खपच्चीयाँ बंधी रहनी आवश्यक हैं।

मिश्रित या विशेष अस्थि-भंग (Compound Fractures)

जब टूटी हुई हड्डी या हड्डीयाँ त्वचा को छेद कर बाहर निकल आती हैं, तो इस दशा को मिश्रित या विशेष अस्थि-भंग कहते हैं। इस में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मांस-तन्तुओं के अन्दर नन्दनी और कीटाणु घुस जाते हैं जिस से घाव

का संकीर्ण होना निश्चित ही समझना चाहिये। जहाँ तक हो सके किसी योग्य डॉक्टर को बुला ही लेना चाहिये, इस प्रकार से टूटी हुई हड्डी की चिकित्सा खुले घाव की चिकित्सा जैसी होनी चाहिये। जब तक शरीर आवश्यक मरम्मत न कर ले, तब तक घाव में एक नली (Drainage Tube) डाल रखनी चाहिये जिस में से कीटाणु और विष निकलता रहे। इस प्रकार के अस्थि-भंग का इलाज बड़ी सावधानी से करना चाहिये।

हड्डी उखड़ना

जब जोड़, पर से किसी हड्डी का सिरा अपनी जगह से हट जाता है, तो इस दशा में वह जोड़, हिलाया-बुलाया नहीं जा सकता। इस से हड्डी उखड़ने और हड्डी टूटने में जो अंतर है वह समझ में आ जाएगा।

हड्डी उखड़ने की चिकित्सा करने का यह उद्देश्य होता है कि हड्डी का एक सिरा अपने स्थान पर आ जाए। इसीलिए डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। अतः ऐसी दुर्घटना होने पर या तो रोगी को डॉक्टर के पास ले जाइये या उसे ही बुला लीजिये। चोट लगने के पश्चात् जितनी ही जल्दी डॉक्टर की चिकित्सा आरम्भ करवा दी जाए, उतना ही उखड़ी हुई हड्डियों को उन के स्थानों पर बँठा देना आसान हो जाएगा। एक या दो दिन की देर करने से सम्भव है कि डॉक्टर को क्लिय-क्रिया द्वारा इलाज करने की आवश्यकता पड़े।

बिजली का झटका

उन नगरों में जहाँ विद्युत शक्ति प्राप्त है तथा उन स्थानों में जहाँ से हो कर बिजली के तार जाते हैं, कभी-कभी लोगों को विद्युन्मय तारों के सम्पर्क में आ जाने से बिजली के झटके लग जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिजली के विद्युन्मय तार के सम्पर्क में आ कर पृथ्वी अथवा फर्श पर पड़ा पाया जाए, तो धुएँ और आग के चिन्हों से बिजली का संकेत मिल जाएगा, परन्तु इन चिन्हों के अभाव में भी यह निश्चय हो सकता है कि तार में हो कर खतरनाक मात्रा में विद्युत प्रवाह हो रहा है, अन्यथा मनुष्य चेतनाहीन नहीं होता।

ऐसे अवसर पर सब से पहला काम यह होना चाहिये कि झटका खाए हुए व्यक्ति को बिजली के तार के पास से दूर हटा दिया जाए, परन्तु इस में यह सावधानी होनी चाहिये कि आप के हाथ न तो विद्युन्मय तार को छूएँ और न उस व्यक्ति के शरीर को, ताकि आप को भी झटका न लग जाए। यह कार्य बड़ा कठिन है परन्तु निम्नीलिखित परामर्शों के अनुसार चल कर किया जा सकता है।

बिजली का झटका खाए हुए मनुष्य को विद्युन्मय तार के सम्पर्क से हटाने से पूर्व ऐसा उपाय कर लीजिये कि बिजली का आप पर कोई प्रभाव न हो। ऐसा करने के लिये रबड़ के जूते पहन लीजिये। या रबड़ की चटाई पर खड़े हो जाइये। यदि ये वस्तुएँ न मिल सकें, तो बिल्कुल सूखे कागजों के ढेर पर, सूखे तख्तों पर या पुस्तक पर खड़े हो जाइये सूखे दस्ताने पहनिये और सूखा कपड़ा पहन कर बिल्कुल सूखे कपड़े के टुकड़े

या बिल्कुल सूखी छह.१ से तार को उठाइये। दस्ताने पहने हुए कप से तार उठाने की चेष्टा न कीजिये। तब उस व्यक्ति को छु.डा. लीजिये।

उस व्यक्ति के कपड़े ढाल कर दीजिये। उसे पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा मिलनी चाहिये। उस का मुँह खोल कर उस की जीभ आने को खींचिये। यदि वह सांस न ले रहा हो, तो कृत्रिम ह्वसन की विधि आरम्भ कर दीजिये (देखिये पृष्ठ ३२९)। ६ से आठ घंटे तक कृत्रिम ह्वसन की आवश्यकता हो सकती है। जब रोगी सांस लेने लगे, तो उसे ठंड से बचाए रखने के लिये गरम बस्त्रों से ढके रखिये।

इसी बीच में प्रश्वासक (inhalator) तथा डॉक्टर को बुला भीजिये।

संभव है कि रोगी का वर्ण नीला पड़ जाए, या वह बिल्कुल पीला पड़ जाए। उस की ना.डी धीमी पड़ जायगी या चलना बंद कर देगी। वह पूर्णतया बेहोश होगा। उस के शरीर पर जल जाने से घाव भी हो सकते हैं। उस का शरीर कड़ा हो सकता है, परन्तु बिजली के असर से ऐसा हो जाता है अतएव यह नहीं समझना चाहिये कि मृत्यु के कारण ऐसा हो गया है। यह समझना भी गलत होगा कि इस चिह्न के प्रकट होने से कृत्रिम ह्वसन व्यर्थ होगा। घर्षण विद्युत का प्रभाव ठीक वंसा ही होता है जैसा बिजली के विद्युन्मय तार को छूने का। दोनों का उपचार भी एक ही है।

बिजली के झटके से बचे रहने के लिए:

किसी भी लटकते हुए तार को न छुइये, क्योंकि संभव है वह कहीं विद्युन्मय तार के सम्पर्क में आ रहा हो।

विद्युत का ऐसा कोई भी उपकरण (equipment) प्रयुक्त न कीजिये जिस के तारों का आवरण टूटा-पूटा हो।

विद्युत का ऐसा कोई उपकरण न खरीदिये जो अच्छी प्रकार का न हो और या भली भाँति स्वीकृत न हुआ हो।

बेहोशी या मूर्छ

स्वस्थ और मजबूत रहने के लिये शरीर के प्रत्येक अंग को ठीक प्रकार क्रियाशील व सचेतन बनाये रखने के लिये मीस्तष्क में रक्त की पर्याप्त मात्रा होने की चाहिये, क्योंकि मीस्तष्क का केन्द्र ही कार्यो पर नियंत्रण रख कर अंगों का और शरीर की प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यदि मीस्तष्क में रक्त-प्रवाह रुक जाए तो महत्वपूर्ण क्रियाएँ भी तुरंत रुक जाएँ। मीस्तष्क में कम मात्रा में रक्त पहुँचने का पहला परिणाम बेहोशी होता है।

बेहोशी उत्पन्न करने वाली मीस्तष्क में रक्तसंचार की कमी का सदा ठीक-ठीक पता लगा लेना संभव नहीं परन्तु भोजन की कमी, बंद कमरे में रहना, थकावट, रक्तपात का दृश्य, भय, अचानक कोई बुरी खबर सुनना, पी.ड.१, या कोई भी भावावेश जीनत सदमा व इसी प्रकार की अन्य पीरीस्थितियाँ मूर्छ का कारण हो सकती हैं। बेहोशी में चेहरा पीला पड़ जाता है माथा या शरीर के अन्य भाग ठंडे पसीने से तर हो जाते हैं। रोगी को चक्कर आने लगता है और आँखों के सामने से कासा बादल सा गुजरता दिखाई

देता है। तब वह मूर्छित हो कर फर्श पर बैठ जाता या गिर पड़ता है। उस की सांस छिछली और नाड। (नब्ज) की चाल धीमी हो जाती है।

तब के अनुसार मोस्तष्क में रक्त संचार की क्रिया को प्रसम कर देना ही उपचार का लक्ष्य होता है। रोनी को लिटा देना या किसी दूसरे ढंग से उस के शरीर को नीचा रखने में सावधानीपूर्वक कार्य करना रक्त संचार को ठीक रखने में सहायक होता है। किसी और प्रणाली से मोस्तष्क में सीधे रक्त-संचार को उत्तेजना देने या अप्रत्यक्ष रूप से सिर के किसी अन्य भाग में रक्त प्रवाह को प्रेरित करना भी सहायक होता है।

यदि आप को मूर्छा आती सी मालूम पड़े, और अभी आप मूर्छित न हुए हों, तो आप को चाहिये कि आप जमीन पर चित्त लेंट जाएं या बैठ कर आने की ओर इस प्रकार झुक जाएं कि आप का सिर यथासंभव घटनों के बीच में हो जाए।

यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो चुका हो, तो उसे पीठ के बल जमीन पर लिटा दीजिये और उस के सिर को पैरों की अपेक्षा थोड़ा नीचे कर दीजिये।

उसे यथासंभव ताजा हवा में रखिये।

यदि वह निगल सके तो उसे कोई इस प्रकार स्फूर्तिदायक द्रव्य देना चाहिये, जैसे आधा गिलास पानी में चाय का आधा चम्मच एरोमैटिक स्पिरिट ऑफ़ अमोनिया (aromatic spirits of ammonia) मिला कर दिया जाए—एक बार में केवल दो-चार बूंदें ही मुंह में डालनी चाहिये।

स्मेलिंग साल्ट्स (Smelling Salts)*, एरोमैटिक स्पिरिट ऑफ़ अमोनिया को रुमाल में ले कर सांस के साथ खींचना, पंखा करना, चंहरों पर ठंडे पानी के छींटे देना अथवा धीरे धीरे तौलिये से धीरे-धीरे चेहरे पर धपोंडे, मारना, रक्त संचार को बल प्रदान कर सकता है और रोनी को होश में ला सकता है।

जोर की या बार-बार होने वाली उल्टियां

जी मिचलाना और उल्टी करते हुए जोर की उबकाई (आँबकाई) बहुत ही कष्टप्रद होती है। कारण चाहे कुछ भी हो वेदना लगभग एक सी होती है और केवल इसी वेदना से कोई यह नहीं कह सकता कि हालत कितनी गंभीर है। उल्टी काले रंग की, मटमले रंग की या पानी के समान साफ हो सकती है। शुद्ध रक्त की अथवा भोजन के साथ मिश्रित रक्त की उल्टी भी हो सकती है। जमे हुए खून के थक्के या पित्त के साथ मिले हुए पीले या हरे तरल पदार्थ की भी उल्टी हो सकती है।

मद्यसार और अनेक प्रकार के विष से भी जोर की उल्टियां हो सकती हैं। गर्द की बीमारी में भी शरीर में विष संचार होने से उल्टी हो सकती है। प्रण या मोस्तष्क में अधिक सूज, मोस्तष्क में गिल्टी (tumour) तथा रक्तसंचार में रुकावट भी भयंकर उल्टी के कारण हो सकते हैं। ऐसी हालत में प्रायः मतली नहीं होती और उल्टी रोकना कठिन हो जाता है। समुद्र-यात्राओं में उत्पन्न होने वाली मतली में जोर की उबकाई और उल्टी

*नासादर और चुने का मिश्रण, इस से सिर का चक्कर, दर्द आदि कम हो जाता है।

जाना प्रमुख लक्षण है। कान के अन्दर के भाग में बह-बहती होने से भी इसी प्रकार का कष्ट उत्पन्न हो सकता है। ऐनक की आवश्यकता होने से या आंख के गोलक (टैले) की पीछियों में संतुलन के अभाव से आंख में जोर पड़ता है, फलतः जोर की उल्टी होने लगती है। यथावस्था की अपकारक उल्टियां भी नाइ-मण्डल जीवन दोष से ही उत्पन्न होती हैं। मोटर में या हवाई जहाज में यात्रा करने से भी चक्कर आते हैं तथा उल्टियां होती हैं।

यदि रोगी को बिस्तर पर लिटाने और उस के भोजन को बंद कर देने के २४ घंटे बाद भी उल्टियां लगातार आती रहें तो तुरंत डॉक्टर को बुला भोजना चाहिये, क्योंकि हो सकता है कि बार-बार आने वाली उल्टियां किसी ऐसी भयंकर बीमारी के लक्षण हों जिस का शीघ्र ही उपचार और निदान न किया जाए तो रोगी के प्राण खतरे में हो सकते हैं।

जोर की और लगातार आने वाली उल्टियों में रोगी को बिस्तर पर लिटा देना चाहिये; उस के तलवों से लगा कर गरम पानी की बोतलें रख दी जाएं और पेट पर ठंडे पानी में भिगो कर कपड़े की गोंदियां (Compresses) रखनी चाहिये।

रोगी के भोजन को थोड़े से रस् (छोरबे), पतले दालिये, स्मि-हीन दूध या आंछक रूप से उबले हुए अंडों तक सीमित कर देना चाहिये। यदि यह भी पच न सके तो 'टैस्ट वाटर' का प्रयोग कीजिये। खूब सिके हुए बादामी रंग के टैस्ट के ऊपर गरम पानी डालिये और रसा निचोड़ लीजिये। इस तरह 'टैस्ट वाटर' तैयार हो जाएगा।

यदि यह भी असफल हो, तो भोजन बन्द कर दीजिये।

बिना भोजन के आराम करते रहने पर भी यदि चौबीस घंटे उपरांत उल्टी जारी रहे, तो डॉक्टर को बुला लीजिये। उल्टी का कारण ठीक-ठीक निर्धारित हो जाना चाहिये और यदि संभव हो, तो उस को दूर भी करना चाहिये।

दांत का दर्द

जब किसी दुखते हुए दांत में कोई छेद हो तो पहले उस में से फंसा हुआ भोजन निकाल देना चाहिये। थोड़ा सी रुई में किसी प्रकार का तार का तेल लें कर उस छेद में रख दीजिये। दांत खांदनी से रुई के इस फाड़े को अच्छी तरह अन्दर को दबा दीजिये। कभी-कभी दांत के छेद में खाने का सोडा भर देने से भी दर्द बन्द हो जाता है।

जल जाना

यदि थोड़ा सा ही जला हो तो जलें हुए भाग को ठंडे पाने में डबा देने से बड़ा आराम होता है। बीस मिनट या इस से अधिक समय तक जलें हुए भाग को ठंडे पानी में डबाए रखने के बाद कार्बोलेटेड वैसेलीन (Carbolated Vaseline; अर्थात् एक छोटे चम्मच भर वैसेलीन में दो-तीन बूंद कार्बोलेक एसिड मिला कर) जलें हुए भाग पर लगा दीजिये या फिर जंहे की सफेदी (सफेद भाग) और खाला हुआ नारियल का तेल बराबर-बराबर मात्रा में मिला कर लगा दीजिये।

यदि ठरार का कोई भाग अधिक जल गया हो तो वहां से कपड़ा काट कर जलग कर



कपड़ों में लगी हुई आग को बुझाने की रीति जिस व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए, तुरन्त ही उस के चारों ओर दूरी, कम्बल, बोट या जो कुछ भी हाथ आ जाए लपेट दीजिये, और फिर उसे फर्श या जमीन पर लिटा कर लुटकाइये । चारों ओर लिपटे हुए कपड़े के जोर से दबाते हुए लपटें बुझाने की कोशिश कीजिये । फर्श या जमीन पर से लपटें सिर तक नहीं पहुँच पायीं और इस प्रकार सांस के साथ पेट में जाने से रुक जाती हैं ।

दीर्घायु । ५. प्रतिशुद्ध सल्फाथियाजोल का मरहम (Sulfathiazole Ointment) या पीनीसीलिन का मरहम जले हुए भाग पर लगा कर पट्टी बांध दी जाए या किसी साफ कपड़े पर यह मरहम लगा कर जले हुए स्थान पर रख कर पट्टी बांध दी जाए । इसे प्रतिदिन बदलते रहना चाहिये या घाव को साफ रखने के लिए जितने समय बाद बदलना आवश्यक हो इसी हिसाब से बदलते रहना चाहिये । इस मरहम से घाव नर्म रहता है और यह जले हुए स्थान को संक्रमित (infected) होने से बचाता है । टैनीफैक्स (Tanifax) जो किसी भी औषधीय विक्रेता की दुकान पर मिल सकता है जले की अवसीर दवा है । जले भाग पर यह मरहम लगा दीर्घायु और जब थोड़ा देर बाद सूख जाए तो दूसरी तह जमा दीर्घायु । जली हुई त्वचा के लिए (Nupercainal Ointment) लाभदायक और ठंडक पहुंचाने वाला है, विशेषकर कड़वा थूप से झूलसी हुई त्वचा के लिए बड़ा गुणकारी सिद्ध होता है । एक और औषधी है जिस को Foille कहते हैं, यह बड़ा गुणकारी है ।

उत्पत्तरल से जला हुआ (Scalds)

गरम या खालते हुए पानी या तेल से जल जाने पर भी ऊपर लिखी हुई चिकित्सा सहायता पहुंचा सकती है ।

हाथ या पैर में लगी हुई फंस या कील का इलाज

सब से पहले फंस या कील को निकाल लीजिये । फिर उस भाग को सहने योग्य नर्म पानी में डूबा दीर्घायु और बीस मिनट तक उसी में रखिये । इस के बाद उस भाग पर ठंडा पानी डालिये और कोई निःसंक्रामक द्रव्य (disinfectant) या सल्फाथियाजोल मरहम लगा कर पट्टी बांध दीर्घायु । घाव को संक्रमित होने से बचाए रखने के लिए दिन में कई बार पृष्ठ १५१ पर वर्णित रीति से गरम और ठंडे पानी से संकेना चाहिये ।

सांप का काटा (सर्प दाँज)

भारतवर्ष में प्रति वर्ष हजारों लोग सांप के काटे से मर जाते हैं । परन्तु यदि ठीक समय पर उचित उपचार हो जाए, तो इन में से बहुतों के प्राण बचाए जा सकते हैं । सांप प्रायः हाथ या पैर में ही काटता है । इसीलिए तत्क्षण काटे हुए अंग पर घाव से जरा ऊपर अर्थात् दाँज-स्थान और झोपे खुरीर के बीच खुरी, रुमाल, टाई या कोई कपड़ा कस कर बांध देना चाहिये । यदि इस खुरी, रुमाल आदि को एक छेदों से डंडे की सहायता से एंठ दिया जाए, तो बहुत अच्छा है । इस से विषला रक्त खुरीर के अन्य भागों में (विशेषकर हृदय में) नहीं पहुंच पाता । बिना देर किए सांप के दाँतों के चिन्हे पर चाकू, उस्तरे या किसी अन्य साफ और तेज अस्त्र से कई चीरे लगा दीर्घायु । जिस से रक्त बह जाए । घाव के चारों ओर ये चीरे इस प्रकार लगाए जाएं कि जितना रक्त निकल सके निकल जाए । यदि इस चीरे लगे भाग पर मूंह लगा कर कोई चुसकी मार-मार के

रक्त धुँकता जाए, तो बिर्बला रक्त और रक्त-रस (Serum) बहुत अधिक मात्रा में बाहर छींचा जा सकता है। चुसकी मारने वाले को यह काम बड़ी सावधानी से करना चाहिये, ऐसा न हो कि कहीं उस का मुँह अन्दर से छिल जाए। इस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा के बाद, रोगी को ऐसे औषधालय जहाँ या ऐसे डॉक्टर के पास जिस के पास विष-हारक (anti-venin) हो ले जाना चाहिये। इस अवधि में वह डोरी, रुमाल आदि बंधा रखना चाहिये। परन्तु इसे एक घंटे से अधिक नहीं बंधा रहना चाहिये नहीं तो उस अंग के निजीब हो जाने का भय रहता है। एक घंटे के बाद उसे धीरे-धीरे ढीला कर देना चाहिये जिस से रक्त-प्रवाह फिर से जारी हो जाए।

यदि विष-हारक का प्रयोग समय पर किया जाए, तो इस से बढ. कर प्राण रक्षा का और कोई साधन नहीं। इसलिए विष-हारक के मिलने का स्थान सभी को मालूम होना चाहिये।

बिच्छू और कमखजूरे के डंक

बिच्छू या कमखजूरे (Centipede) के डंक मारने पर तुरन्त ही डंक लगे स्थान पर त्वचा में सूई से नहरे-नहरे बारह-चौदह छेद कर दीजिये। फिर त्वचा को पानी से मीला कर के उस पर पाँटौछयम परमेननेंट का चूर्ण छिड़क दीजिये और कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिये।

लू लग जाना

जब धूप में काम करते-करते लोग अचानक बंहेझ हो कर धरती पर गिर पड़ें, तो उन्हें तत्क्षण छाया वाले स्थान पर ले जाना चाहिये और सिर और छाती पर ठंडा पानी छिड़कना चाहिये। जब रोगी पर ठंडा पानी छिड़का जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति उस की छाती और बांहों को जोर-जोर से मले। लू लग जाने पर गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए तत्क्षण डॉक्टर को बुला कर रोगी को दिखाना चाहिये।

विष खा लेना

जब कोई व्यक्ति विष खा ले, तो कार्बोलीक एसिड जैसे हारक विषयों की घटनाओं को छोड़. कर प्रत्येक दशा में सब से पहला काम यह करना चाहिये कि रोगी को उल्टी कराई जाए। इस की एक विधि तो यह है कि मुँगियों आदि के पर से या उँगली डाल कर उस के गले को गुदगुदाया जाए। यदि इस से काम न चले, तो एक बिलास गुनगुने पानी में दो बड़े. चम्मच भर पिसी हुई राई, या चार बड़े. चम्मच भर नमक, या दो बड़े. चम्मच भर खाने का सोडा मिला कर पिला देना चाहिये, तुरन्त उल्टी हो जाएगी।

कार्बोलीक एसिड पी लेना

जिस ने कार्बोलीक एसिड पी लिया हो, उस के प्राण बचाने के लिये उसे बमन करवाना आवश्यक नहीं, बल्कि उसे छीघ. ही चार-पाँच कच्चे अंडे खिला दीजिये। इस

के बाद रंगी को एक गिलास पानी में एक बड़। चम्मच भर मैग्नीशियम सल्फेट (एप्सम सॉल्ट) या सोडियम सल्फेट (Sodium Sulphate) घोल कर पिता दीजिये।

सोखिया या चूड़ों का बिब खा लेना

बमन कराने के उपर्युक्त उपायों को काम में लाइये। फिर रंगी को चार-पांच कच्चे अंडे और एक बड़। खुराक मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट की खिला दीजिये।

हूबे हूबों की जान बचाना

हूबे हुए को पानी से बाहर निकाला जाने के बाद तुरन्त ही उस के मुंह और नाक में से कीचड़ निकाल दीजिये। छाती पर के कपड़े को फाड़ कर जलन कर दीजिये। उस का मुंह खोल दीजिये और दांतों के बीच एक लकड़ी लना कर मुंह खुला रहने दीजिये। रंगी को आँधा कर दीजिये, अपनी बांहें उस की बांहों के नीचे डाल कर झरूर के बीच का भाग ऊपर की ओर उठाइये जिस से पानी उस के फेफड़ों में से बाहर निकल जाए। ज्योंही पानी नाक और मुंह से निकलना बन्द हो जाए, त्योंही झरूर को आँधा लिटा दीजिये। कपड़े की गद्दी सी बना कर पेट के नीचे रख दीजिये। पीठ को दबाने से बाध फेफड़ों में से बाहर निकल जाती है और जब दबाव कम कर दिया जाता है तो हवा फेफड़ों में घुस जाती है। यदि रंगी में प्राणों के कुछ भी चिन्ह हैं, तो एक घंटे या इस से भी अधिक समय तक कृत्रिम-श्वसन जारी रखिये। यदि पास ही कोई और सहायता देने वाला है तो उस से झरूर को मलवा कर सुखवा लीजिये। गर्म पानी की बोतलें मंगवा कर रंगी के झरूर के पास रख दीजिये। पानी अधिक गरम नहीं होना चाहिये, क्योंकि भूत झरूर को तबचा बहुत अस्थानी से जल जाती है।

कुत्ते या किसी अन्य पशु के काट के का इलाज

जब कुत्ता या कोई अन्य पशु काट ले तो घाव को निःसंक्रमक पानी या साबुन और पानी से धो कर अन्य घावों की सी चीकित्सा की जाए।

इस के बाद दूसरा काम इस बात को निश्चित करना होगा कि वह कुत्ता या पशु पागल तो नहीं। उसे ऐसी जगह बांध कर रखना चाहिये कि वह आँरों को न काट सके। यदि वह पागल हो गया हो तो दस दिन के अन्दर-अन्दर मर जाएगा। यदि ऐसा हो तो रंगी को किसी अस्पताल या आरोग्य-केन्द्र में ले जाइये जहाँ सूइयां लगा कर पागल कुत्ते आदि के विष का इलाज होता है। अंग्रेजी में इस इलाज का नाम है Pasteur Treatment। रंगी में पागलपन या हडक के लक्षण प्रकट होने से पूर्व ही उपचार आरम्भ हो जाना चाहिये क्योंकि लक्षण प्रकट होने के बाद उपचार से कोई विशेष लाभ नहीं होता। यदि वह पशु भाग गया है और यह पता न लवे कि वास्तव में वह पागल या भी या नहीं, तो यही उचित होगा कि पूर्ण चीकित्सा कराई जाए।




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

रंगी को अर्धा लिटा कर कृत्रिम-श्वसन की विधि ।

यदि किसी प्रकार का संदेह हो कि इस दृष्टा में क्या किया जाए और क्या न किया जाए, तो निम्नीलिखित चार 'पास्ट्यूर इंस्टिट्यूट' में से किसी एक को तुरन्त तार भेज कर परामर्श प्राप्त कर लेना चाहिये: तार में पूरा-पूरा हाल होना चाहिये ।

इन चार संस्याओं में से प्रत्येक का पूरा पता और तार का पता इस प्रकार है:—

१. पास्ट्यूर इंस्टिट्यूट ऑफ़ इन्डिया, कर्नाली—(Pasteur)
 २. पास्ट्यूर इंस्टिट्यूट ऑफ़ सदर्न इन्डिया, कुनूर मद्रास—(Virus)
 ३. पास्ट्यूर इंस्टिट्यूट ऑफ़ रंगून, बर्मा—(Virus)
 ४. किंग एडवर्ड सातवां मेमोरियल पास्ट्यूर इंस्टिट्यूट, मिलांग, आसाम—(Rabies)
- पायल पशुओं के काटे की चीकत्सा (The Pasteur Anti-Rabic Treatment) के अब भारत में अनेक केन्द्र स्थापित हो चुके हैं, अतः उपर्युक्त चार संस्याओं से दूर रहने वालों को इतनी लम्बी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक स्थान पर बीड़या प्रकार के नावीरिक या असीनिक अस्पताल में, सभी सीनिक अस्पतालों में, बहुत से मिशन अस्पतालों में, बहो-बहो जगहों पर रेल वालों के अस्पतालों में, जिला और केन्द्रीय जेलों में इस उपचार के लिए प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं ऐसे कृत्त द्वारा काटे जाने पर जिस के पायल होने में संदेह हो, सब से पहला काम जो करना चाहिये वह है ऊपर बताया गया प्राथमिक उपचार। इस के बाद तुरन्त ही रोगी को उस निकट के केन्द्र में ले जाइये जहाँ यह विशेष चीकत्सा होती है।

अध्याय ४१

शरीर रूपी मन्दिर

इस पुस्तक के पृष्ठों में हम ने मानव शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों का अध्ययन किया है; हमें बार-बार यह ज्ञात हो चुका है कि हमारा शरीर एक अद्भुत रचना है। इस की उपमा एक मशीन से दी जा सकती है, बल्कि, वास्तव में, यह स्वयं एक अनुपम मशीन है—मनुष्य ने आज तक जितनी मशीनें बनाई हैं, उन में से कोई भी इस चमत्कारिक मशीन की बराबरी नहीं कर सकती।

अपने मस्तिष्क तथा चंता-संस्थान पर ही विचार कीजिये जिन के द्वारा मनुष्य का मन कार्य करता है और मनुष्य को इस योग्य बनाता है कि वह सोच सके, तर्क कर सके, योजनाएं बना सके, नए-नए आविष्कार कर सके, समझ सके, प्रेम कर सके और अपने बनाने वाले की स्तुति कर सके। टेलीफोन और तार के आविष्कार से बहुत पहले से ही मनुष्य के शरीर के अन्दर एक अद्भुत तार-प्रणाली है जिस के द्वारा मस्तिष्क अपने संदेश शरीर के प्रत्येक अवयव और पेशी को भेजता है।

आंख की सूक्ष्म रचना पर बहर्दा से सोचिये। इसी के द्वारा वस्तुओं आदि के चित्र बनाए जाते हैं और मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। मनुष्य भौतिक विज्ञान के विषय में बहुत कम जानकारी रखता है, परन्तु इस से बहुत पहले कि उसे इस विषय का थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, इन विज्ञान के नियमों को अद्भुत रीति से मानव नेत्र में दर्शाया जा चुका था। छाया-चित्र विज्ञान (Photography) के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में

बहुत कुछ प्रगति हुई है, परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म-ग्राही और बौद्धि-वासे-बौद्धि-वा कैमरा (Camera) भी हमारी आंख के सामने लुप्त छलता है।

पाचन-क्रिया और विपाक अर्थात् छरीर में भोजन पच कर रक्त इत्यादि बनने के कार्य (Metabolism) के चमत्कारों पर तनिक ध्यान दीजिये—इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा भोजन छरीर में से जाया जाता है और वह फिर छरीर को ऊर्जा देता है, हमारे तन्तु को टूट-पूट की मरम्मत करता है, इसी से हमारे मोस्तष्क, हमारी हड्डियों और हमारी मांस-पेशियों का निर्माण होता है जिस से हम जीवित रहते हैं, चलते-फिरते हैं, काम-काज करते हैं और सोचते-समझते हैं। मनुष्य आज तक किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार नहीं कर सका है जो इतने धोड़े, से इन्धन की सहायता से इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सके, या जो इतनी कम मरम्मत और धोड़-सी देख-रेख से अधिक समय तक इतनी निपुणता से कार्य कर सके।

इन अद्भुत प्रक्रियाओं में प्रजनन की आश्चर्यजनक क्रिया और सम्मिलित कर लीजिये, तो आप को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि प्राणी जीवन मनुष्य के क्षयां आविष्कृत और निमित्त वस्तुओं से सर्वदा भिन्न तथा अधिक उच्च क्रीट का है। क्या आप कभी ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि एक यंत्र अपने भीतर से दूसरा नन्हा सा यंत्र उत्पन्न करे ? नहीं ! कदापि नहीं !! यंत्र-विज्ञान के जगत् में ऐसा कभी नहीं हुआ, और न कभी होगा। कलन-यंत्र (Calculation Machines) तो हैं जो संख्याओं को जोड़, सकते हैं और उन्हें गिन सकते हैं, और इस प्रकार ऐसा आभास होता है कि उन में विचार करने की शक्ति है, परन्तु वे अपने अन्दर से अपने ही समान अन्य नन्हे यंत्र उत्पन्न नहीं कर सकते जो इन के घिस जानें या टूट-पूट जानें पर इन का स्थान ग्रहण कर सकें। ऐसे भी यंत्र निमित्त हो चुके हैं जो थिल्लल मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं और मनुष्य के बहुत से कामों को नकल भी कर सकते हैं परन्तु आदमी के समान काम करने वाले इस लोहे के आदमी, 'रोबोट,' ने आज तक किसी क्षिप्र 'रोबोट' को जन्म नहीं दिया !

मानव छरीर की चमत्कारीक प्रक्रियां निश्चित रूप से इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि इस अद्भुत रचना के पीछे ईश्वरीय शक्ति है। इस से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि मानव छरीर में कार्य करने वाले नियम—प्रकृतिक नियम, स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम—ईश्वरीय नियम हैं। अतः जिस प्रकार मनुष्य का यह धर्म है कि वह ईश्वर के महान् नीतिक नियम का पालन करे, इसी प्रकार उस का यह भी कर्तव्य है कि स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार ही जीवन व्यतीत करे।

जब यह बात समझ में आ गई कि अपने छरीर को और अपने स्वास्थ्य को उत्तम स्थिति में रखना हमारा धर्म है, तो हमें चाहिये कि हम स्वास्थ्य के नियमों का बड़े ध्यान-पूर्वक मनन करें और उन्हें अपनी संतान को भी सिखाएं जिस से हम सब भली भांति समझ जाएं कि हमें किस प्रकार रहना-सहना चाहिये। इस के साथ-ही-साथ यह ज्ञात हो जाने पर कि सुरासार, तम्बाकू, अफीम, पान-सुपारी, मिर्च, चाय और कोफ़ी जैसे पदार्थों का प्रयोग क्षान्कारक होता है, हमें दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिये कि हम इन पदार्थों को कभी क्षय तक न लगाएंगे। अक्षर-सम्बन्धी विषय का हमें बहुत ध्यानपूर्वक मनन करना चाहिये क्योंकि अन्य बातों की अपेक्षा इसी का स्वास्थ्य पर सब से अधिक प्रभाव

पड़ता है। हमें ऐसी अद्वय बना लेनी चाहिये कि भोजन में हमें केवल स्वास्थ्यप्रद पदार्थ ही दींचकर हों। यदि हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग कर रहे हों जो स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक हैं, तो हमें अपनी खाने-पीने की आदतों को बदल डालना चाहिये और दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिये कि हम कर्दाच की दासता में नहीं रहेंगे।

अपनी उत्पीत के पश्चात् जिन खराब पदार्थों का मनुष्य ने सर्व प्रथम प्रयोग किया, वही उस के आहार के लिए सर्वोत्तम थे। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी तो उस ने उसे खाने के लिए स्वादिष्ट फल, अन्न-पदार्थ और पृथ्वी से उगने वाली तरकारियां प्रदान की थीं। निस्संदेह जो परमेश्वर ऐसे अद्भुत शरीर की रचना कर सका, वह अवश्य यह बात जानता था कि इस शरीर के पालन-पोषण और इसे स्वस्थ रखने के लिए कौन-कौन से खराब-पदार्थ सब से अधिक उपयोगी होंगे। यदि हम ने हानिकारक पेयों और मादक पदार्थों के प्रयोग और मांस आदि खाने की आदतें डाल ली हैं, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी कर्दाचियों के दासत्व से अपने को मुक्त कर लें, और ईश्वर की कृपा से प्रकृति के उन नियमों के अनुसार जीवन बिताएं जो हमारे शरीर के लिए उचित और लाभप्रद समझे गए हैं।

जिन व्यक्तियों में अपने अन्दर उपर्युक्त परिवर्तन करने का साहस होता है उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि ऐसा करने से नया स्फूर्तिदायक स्वास्थ्य तथा मानसिक वीक्षणता प्राप्त होती है और ऐसे नए संतोषजनक आत्मसम्मान का अनुभव होता है जो उस कार्य को पूर्ण करने से होता है जिससे हम उचित तथा योग्य समझे हैं।

सब से बड़ कर बात तो यह है कि इस प्रकार का आचरण ग्रहण कर के हम अपने महान् रचीयता के सहयोगी बन जाते हैं; हमें उस की शक्ति और दया का आभास होने लगता है, जो हमें समस्त पापों से मुक्त कर सकती है। केवल इसी से हमें मन की शांति प्राप्त होती है और स्वास्थ्य के लिए मन की शांति अत्यंत आवश्यक होती है।

इस प्रकार हम ईश्वर अर्थात् अपने रचीयता के प्रति श्रद्धा और उस में दृढ़ विश्वास बनाए रख कर ही शारीरिक तथा आत्मिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम अपना यह जीवन सुखी बना सकते हैं और भविष्य में अनन्त जीवन की आशा रख सकते हैं।

जो व्यक्ति ऐसे भविष्य के अभिलाषी हों उन के लिए हमारा यह परामर्श है कि वे ईश्वर के वचन अर्थात् बाइबल का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें। उस पाँचवें पुस्तक में ईश्वर ने हमें यह वचन दिया है कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा वह हमें एक ऐसे देश में रहने को स्थान देगा जहाँ पाप, रोग और मृत्यु न होंगे, और जहाँ सब को शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक स्वास्थ्य व अनन्त जीवन प्राप्त होगा। यही नहीं बल्कि बाइबल का श्रद्धा-पूर्वक अध्ययन करने से हमें इस जीवन में भी लाभ होगा—हम अपने दायामय रचीयता के विषय में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे-जैसे हम अपने रचीयता और उस के द्वारा स्थापित शारीरिक नियमों को जानते जाएं, वैसे-ही-वैसे हमें चाहिये कि उन नियमों का सावधानी और दृढ़ता से पालन करने का प्रयत्न करें, क्योंकि उन नियमों का सम्बन्ध स्वास्थ्य से है, और वे ईश्वरीय नियम हैं। इन नियमों का पालन करने से ही स्वास्थ्य और सुख प्राप्त होता है।

पिछले अध्यायों में अभिदिष्ट नुस्खों का सूचीपत्र

नं. १. बोरिक एसिड का घोल (Boric Acid Solution) एक ऐसी साफ बोतल लीजिये जिस में ७ आउंस या उस से अधिक पानी जा सके (एक गिलास पानी)। बोतल में एक बड़ा चम्मच भर बोरिक एसिड के कण छालिये। बोतल में खाला हुआ पानी भरिये। इस का प्रयोग करने से पूर्व कुछ घंटे तक इसे इसी प्रकार पड़ा रहने दीजिये। सारा बोरिक एसिड नहीं घुलनेवा। बोतल से बाहर उठेलते समय इस बात का ध्यान रखिये कि कोई कण न आने पाए। घोल का प्रयोग करते समय अधिक पानी का प्रयोग किया जा सकता है जिस से कण घुल जाए।

नं. २. टिंक्चर आब आयोडीन (Tincture of Iodine) तैयार किया हुआ किसी भी आर्षाथ विक्रेता की दुकान से खरीदा जा सकता है।

नं. ३. आर्जीरोल का घोल (Argyrol solution) यह भी किसी आर्षाथ विक्रेता की दुकान से खरीदा जा सकता है। केवल दस प्रतिशत घोल का प्रयोग किया जाए। यदि यह तीस दिन से अधिक का हो तो इस का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

नं. ४. बोरिक एसिड पाउडर किसी भी आर्षाथ विक्रेता की दुकान से मिल सकता है।

दूसी और बाल झड़ने की चिकित्सा

नं. ५. दो ड्राम गन्धक (लगभग ७ माछे या दो चाय के चम्मच भर) एक आउंस या २ बड़े चम्मच भर बेसलीन में मिलाइये।

गंज की चिकित्सा के लिए

नं. ६. २०ग्रेन रिसोरोसिन (Resorcin) और ५ ड्राम गद्यसार और ५ ड्राम पानी मिलाइये।

दस्त रोकने के लिए

नं. ७. (क)

मिलाइये {	सबनाइट्रेट आब बिस्मथ (Subnitrate of Bismuth)	२ ड्राम
	सलोल (Salol)	१ ड्राम
	चाक मिक्सचर (Chalk Mixture)	१॥ आउंस

एक छोटा चम्मच भर तीन-तीन या चार-चार घंटे बाद दीजिये।

बच्चे के लिए

(ख)

मिलाइये {	सबनाइट्रेट आब बिस्मथ	३६ ग्रेन
	सलोल (Salol)	१२ ग्रेन
	चाक मिक्सचर	४ ड्राम

एक छोटा चम्मच भर तीन-तीन या चार-चार घंटे बाद दीजिये।

नं. ८. (Burnt Alum) इस प्रकार बनाया जाता है कि एक चम्मच में एक टुकड़ा फिटकरी डाल कर उसे आग पर रक्खा जाए, जब तक वह पिघल कर सफेद और फिर सूख न जाए, तब तक आग पर ही रखने दिया जाए।

कुल्ली और नरारे के लिए

नं. ९.	मिलाइये {	कार्बोलिक एसिड (Carbolic Acid)	१ ड्राम
		ग्लीसरॉन	१ आउंस
		सोमीश्रित बोरिक एसिड का घोल	१० आउंस

एक और उपयोगी नुसखा इस प्रकार का है:—

मिलाइये {	बोरिक एसिड (Boric Acid)	१ ड्राम
	पोटेशियम क्लोरेट (Potassium Chlorate)	२॥ ड्राम
	पेपरमिंट वॉटर (Peppermint Water)	१२ आउंस

कुल्ली और नरारे करने का एक और अच्छा नुसखा यह है कि एक गिलास पानी में एक छंटा चम्मच भर नमक और एक चम्मच खाने का सोडा मिलाइये।

नं. १०.	मिलाइये {	कार्बोलिक एसिड (Carbolic Acid)	१॥ ड्राम
		मद्यसार (Alcohol)	२ आउंस
		पानी	५ आउंस

इस से भी कुल्ली और नरारा करने का अच्छा पानी बनता है।

छंटी फूसियों आदि के लिए मखम

नं. ११.	मिलाइये {	बेंसलीन	१ आउंस
		सल्फाथियोजॉल पाउडर	३ ग्राम

क्लेजे (दिल) पर जलन या छट्‌टो छकारों को चिकित्सा के लिये

नं. १२ सोडा बाईकार्बोनेट (खाने का सोडा) या मैगनीशिया थोडा-थोडा छंटे चम्मच से खाना चाहिये।

बबासीर आदि का मखम

नं. १३. वही जो नं. ११ में बताया गया है।

दांत का संजम

नं. १४.	मिलाइये {	पिसी हुई खीरिया	॥ पाउंड
		पिसा हुआ कैस्टिल सोप (Castile Soap)	१॥ आउंस
		चीनी	१ आउंस
		पिसी हुई औरिस रूट (Orris Root)	१ आउंस

नं. १५. अंकुशी कृमि (Hookworms) के नुसखों के लिए देखिये अध्याय २८।

सूघने के लिये औषधि

नं. १६.	बराबर	{	मेन्थॉल (Menthol)
	बराबर		कपूर (Camphor)
मात्राओं में			यूकैलिप्टस आयल (Eucalyptus Oil)
मिलाइये			ओलियम पनी सिल्वेस्ट्रिस (Oleum Pini Sylvestris)

सूघने की एक सस्ती दवा

नं. १७. दवा का प्रयोग करने की यह विधि है: एक छोटा सा बांस का टुकड़ा लीजिये जो भीतर से खोखला हो। वह चार इंच लम्बा और उंबली के बराबर मोटा हो। उस के एक सिरे पर छोट या लकड़ी का टुकड़ा लगा दीजिये जिस के भीतर एक छोटा-सा छेद हो। कपड़े या रुई का छोटा-सा टुकड़ा इस दवा में भिगो कर उस के अन्दर रख दीजिये। फिर बांस का खुला हुआ सिरा नाक के छेद में लगा कर दवा को सूघिये। दिन में कई बार इस क्रिया को कीजिये। जब इस नली का प्रयोग न किया जा रहा हो तो बांस के खुले सिरे पर भी छोट लगा दीजिये जिस से दवा उड़ न जाए।

सूखी खांसी के लिए

नं. १८.	{	कोडीन सल्फेट (Codein Sulphate)	३ ग्रैन
		अमोनियम क्लोराइड (Ammonium Chloride)	७५ ग्रैन
मिलाइये		सिरप ऑव सिट्रिक एसिड (Syrup of Citric Acid)	१ आउंस
		पानी	१॥ आउंस

बचस्क रंगी एक छोटे चम्मच भर पानी में मिला कर तीन-तीन या चार-चार घंटे बाद पिए। बच्चों को चम्मच का १/३ भाग दिया जाए।

मासिक धर्म बंद हो जाने की चिकित्सा के लिए

१९. ४ ग्रैन सल्फेट ऑव आयरन (sulphate of iron) और ३ ग्रैन ओवरीन (Ovarine) मिलाइये इस को कैप्सुल में रख कर दिन में तीन बार खाइये।

हीरत-पाण्डु रोग (Chlorosis)

२०. ब्लाउड की गोलीयां (Blaud's Pills) प्रत्येक गोली में दो ग्रैन सल्फेट ऑव आयरन होता है।

नं. २१. (Blue Ointment) नीला मक्खन यह बना बनाया औषधि विक्रेता की दुकान से मिल सकती है।

नं. २२. पहले एक गिलास पानी पोटैशियम परमैंगनेट (Potassium Permanganate) का गाढ़ा घोल बनाइये। उसे बार-बार हिला लेना चाहिये और उस का प्रयोग करने से पूर्व कुछ घंटों तक ऐसा ही रक्खा रहने देना चाहिये। यह तब घोल ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिये, बल्कि इस के दो छोटे चम्मच भर कर दो गिलास पानी में मिलाइये,

उपचारानुक्रमणिका

(Treatment Index)

अंगोछना या स्पंज करना	146
क्षार मिले पानी से अंगोछना	147
नमक मिले पानी से अंगोछना	146
विच-हेजल (witch hazel) से अंगोछना	147
छराब मिले पानी से अंगोछना	147
सिरका मिले पानी से अंगोछना	147
अंनमा (पिचकारी)	143
अंनमा, गरम श्वेतसार का	149
अंनमा, टौनक एसिड का	192
अंनमा, नमक का	192
अंनम से सफाई	199
अंनम का सामान	148
आंख का उठना (Conjunctivitis)	264
आंख धोना	76
गृहीरियां	268
कान, कान में घुसे हुए कीड़े, आदि को निकालना	77, 267
केनी इलाज (Kenny)	294
कृत्रिम-हृवसन की विधि, डूबे हुए या बिजली का झटका खाए हुए व्यक्ति के लिए	329
गरम और ठंडे पानी द्वारा चिकित्सा	141
गरम पानी की धली	144
ठंडी गद्दी (cold compress), बिना बर्फ की	146
पीट्टियां बांधना	309-311
बफरा, औषधि रूप में	178
योनि की पिचकारी	143
राई का पलस्तर	280
शरीर को रगड़ना, दस्ताना पहने हाथ को ठंडे पानी में भिगो कर	142
सेंके, आदू	186-140
सेंके, पैरों में गरम पानी की	140
सेंके, वीस्त-गह्वर के अवयवों के लिए गरम पानी की	141

रोग-निरोधक टीके

रोग	आयु और परिस्थितियाँ	पहली बार के टीके और बाद के टीके
१. झीतला चेचक (Small-pox)	या छः महीने का होने से पूर्व ही प्रत्येक हर तीन साल के बाद टीका लगना चाहिये। बालक के टीका लगना चाहिये।	परन्तु यदि चेचक फैल रही हो, तो जहाँ संक्रमण की सम्भावना हो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के टीके लगना चाहिये।
२. मोतीझरा या आंत्रिक ज्वर या मियादी बुखार (Typhoid)	एक साल से ऊपर का हो जाने पर; दो टीके—एक पहले और दूसरा ७-१० दिन के बाद। फिर प्रति वर्ष एक टीका।	
३. हैजा (Cholera)	एक साल से ऊपर का हो जाने पर; दो टीके—एक पहले और दूसरा ७-१० दिन के बाद। फिर प्रतिवर्ष एक टीका।	
४. महामारी (Plague)	एक साल से ऊपर का हो जाने पर; दो टीके—एक पहले और दूसरा ७-१० दिन के बाद। फिर हर छः महीने बाद एक टीका।	
५. मोह-ज्वर (Typhus)	एक साल से ऊपर का हो जाने पर; दो टीके—एक पहले और दूसरा ७-१० दिन के बाद। फिर साल भर में दो बार—एक नवम्बर के आरम्भ में और दूसरा फरवरी के आरम्भ में।	
६. पील ज्वर (Yellow Fever)	आयु-प्रतिबन्धन नहीं है। प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो पील ज्वर वाले क्षेत्रों में से गुजरे (अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका में)।	केवल एक टीका। फिर हर चार साल के बाद।
७. हनुस्त्व जमह (Tetanus)	या ३-५ की आयु में	पहली बार—तीन-तीन सप्ताह के बाद एक-एक टीका। इन टीकों के साल भर बाद संक्रमण-निरोधक क्षक्ति बढ़ाने के लिए एक टीका। फिर यह रोग जीवन भर नहीं होता।
८. झिल्लीक- प्रदाह (Diphtheria)	३ वर्ष की आयु में। ८ वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों को Schick Test नामक प्रारम्भिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं।	N.A.F.T. के दो टीके। पहला टीका लग चुकने के बाद दूसरा। फिर संक्रमण निरोधक क्षक्ति बढ़ाने के लिए साल भर बाद एक और टीका 1. c.c. का।

दुर्घटनाएं तथा आकस्मिक घटनाएं (अनुक्रमणिका)

अपघर्षण और कट जाना	304
आंख में कण पड़ जाना	268
उदर-खल या बाय-खल (Colic)	100
उल्टियां, जोर की या बार-बार होने वाली	323
एँठन, शरीर (पैशियों) में (Convulsions)	101
कान में कीड़े, आदि का घुस जाना	267
कुत्ते या किसी अन्य पशु का काटा	327
कुचल जाना, शरीर के किसी अंग का	308
कृत्रिम इवसन	329
जल जाना	328
जला हुआ, उत्पलतरल से (Scalds)	326
हृय जाना	327
दुग्धा	287
दांत का दर्द	328
नक्सीर छटना	204
पट्टी बांधना	301
फंस या कील लग जाना	326
बिच्छू और कनखजरे के डंक	326
बिजली का झटका	321
बेहोशी या मूर्छा	322
मोच आ जाना	310
रक्त बहना	312
कंधे और बगल से	313
सोपही के घाव से	312
घोहरे और मर्दन से	315
लू लग जाना	296
विष खा लेना	326
कार्बोलिक एसिड	326
सोखिया या चूखे का बिष	327
सांप का काटा (सर्प दंष्ट)	326
हड्डी उखड़ना	321
हीडियां, टटी हुई	204
हँसा	190

सामान्य अनुक्रमणिका

अंकुर-कृमि रोग, चिकित्सा	---	---	२२७, २३०
अंगोछना, क्षार मिले पाने से	---	---	१५७
नमक मिले पानी से	---	---	१५६, १५७
विभिन्न प्रकार से	---	---	१५६, १५७
शराब मिले पाने से	---	---	१५७
अजीर्ण, लक्षण और कारण	---	---	१९६
की चिकित्सा	---	---	१९७
अण्डा, रोगी के लिये बनाने की विधि	---	---	१५९
की सफेदी (सफेद भाग), बच्चों के लिए	---	---	१३७
अणु प्रमाण विस्फोट, और विकिरण	---	---	२८१
अदरक	---	३३, ३८, ५३, १९६	
अन्न-मार्ग	---	---	३६
अनिमा या पिचकारी	---	---	१५३
टोनिक एसिड का	---	---	१९२
नमकीन पानी का	---	१९२, १६९	
श्वेतसार का	---	---	१६९
अस्थिपंजर का रेखाचित्र	---	---	५९
अस्थिभंग, मोहरत या विशेष	---	---	३२०
आंख, का उठना (Conjunctivities or sore eyes)	---	---	२६५
में चिंगारी या बाहर से किसी अन्य वस्तु का पड़ जाना	---	---	२६४
में चुने का टुकड़ा पड़ जाना	---	---	२६४
में दर्द (पीडा)	---	---	२६७
की रक्षा के नियम	---	७५, ७६	
के रंग	---	---	२६४
गुहोरियां	---	---	२६४
दूर की चीजें दिखाई देना, पास की चीजें दिखाई देना	---	---	२६७
पलक के सिरों का सूज जाना	---	---	२६४
रोहें	---	---	२६७
आंत उतरना (Hernia)	---	---	२७५
बड़.१ आंत	---	---	४१
आंतें	---	२२६-२३३	
आकस्मिक घटनाएं, (दुर्घटनाएं)	---	---	३०१
अस्तं	---	७४, १००	
आन्त्र-पृष्ठप्रदाह (Appendicitis)	---	---	२०६
आमाशय	---	---	३७

ऑरजोमाइसिन (Aurcomycin), पीचश की चिकित्सा में	२०४
इन्फ्लूएंजा, में खान-पान, की चिकित्सा	२३८
उदर-दुल या वायु-दुल की चिकित्सा	१७०
औल्टियां, जोर की और बार-बार	३२३
एक्जीमा	२६०
के लिये मरहम	२६०
एंटोन, शरीर (पीछियों) में	१७१
ओलओरोसिन ऑफ मेल फर्न	२३२
औषधियां, और सुइयां, जीवाणु-विकास-जवरोधक	२९१
विज्ञप्त औषधियां	१५८
'सल्फा' औषधियां, अधिक पानी पीने का महत्व	२०६
बंधे, से खून बहना	३१३
की पट्टी	३०३, ३१०, ३११
कट-जाना (शरीर के किसी अंग का)	३०५
फ्लेक्जूर, के डंक का इलाज	३२७
कमलबाई	२७६
कमरा, रंगी की देख-भाल	१४४, १५८
कनसुए	१८१
कण्ज, चिकित्सा	१९८
पानी पीने से लाभ	१९९
बच्चे को, चिकित्सा	१४२
कानों की रक्षा	७७
कान में कीड़। आदि	२६८
की पीड़।	२६८
का बहना	२६९
बहरापन	२६७
के रोग	२६७
काला आजार	२१९
कीटाणु, द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग	२७, १०१
कहाँ से आते हैं	१०२
क्या हैं	१०१
बच्चा	१०४
रोग कैसे उत्पन्न करते हैं	१०२
शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं	१०४
कील या फंस, हाथ या पैर में लगी हुई, का इलाज	३२६
ककर खांसी	१८३
में रंगी का आहार	१८४

कुछले हुए अंग की चिकित्सा	---	---	३०४
कुत्ते या किसी अन्य पशु का काटा	---	---	३२८
कुत्ली और गरारा (नुसखा)	---	---	३३५
केंचू (पेट में), चिकित्सा	---	---	२२६
कैल्शियम, आहार में	---	---	९५
कोट.	---	---	१८४
क्लोरोमाइसीटिन (chloromycetin)	---	---	१८७
क्षय-रोग या यक्ष्मा	---	---	२४२
से कैसे बचें	---	---	२४५
कैसा लगता है	---	---	२४३
निर्माणिया के बाद	---	---	२४१
की चिकित्सा	---	---	२४६
को फैलने से रोकने के उपाय	---	---	२४४
रोगी का आहार	---	---	२४६
के लक्षण	---	---	२४३
खटमल	---	२०९, २१०, २५१	
खपिचियां	---	३१८, ३२०	
खसर	---	१७९	
की चिकित्सा	---	१८०	
खानिज पदार्थ, भोजन में	---	---	९५
खांसी और जुकाम	---	१७२, २३६	
खान-पान (बच्चों का) अनूचित व अनियमित	---	१६८, १७७, १३८	
खाने की आदतें	---	१००	
खजली, लक्षण, चिकित्सा	---	---	२५८
खोपड़.पं. का दाद	---	---	२६२
के घाव से रक्त-स्राव बन्द करने का उपाय	---	---	३१२
गीठिया	---	---	२७६
गद्गदी, ठंढी, बिना बर्फ की	---	---	१५६
गल-ग्रंथियां (गद्गद)	---	---	२३४
गलसूए	---	---	२२४
बड़े, हुए, चिकित्सा	---	---	२३५, २३६
गर्दन से रक्त बहना	---	---	३१३
गर्मी रोग	---	---	२५१
गर्भाधान संबंधी समस्याएं	---	---	१११-१२३
गर्भवती स्त्री की देख-भाल	---	---	११५
गर्भावस्था की अवधि	---	---	११४
गर्भावस्था में भय-सूचक चिह्न	---	---	११४

गर्भावस्था के लक्षण	---	---	११४
प्रसव	---	---	११७
प्रसव की तैयारी	---	---	११५
गर्भावस्था में शिशु का विकास	---	---	१११
के रोग	---	---	२५६
नृत्त रोग (मृत्यु-जन्य व्याधि)	---	---	२५०
बूढ़ी, चिकित्सा	---	---	२६४
घमाँरी, चिकित्सा	---	---	२६०
घाब में पीप (संक्रामित घाब)	---	---	२१३
की चिकित्सा	---	---	२१७
धर्म रोग	---	---	२५७
घाय और काँफ़ी	---	---	३३
घबल का गाँठ	---	---	३३७
चिकित्साएं, प्राकृतिक	---	---	१४३
चिनोपोडियम (Chinopodium) का तेल	---	---	२३०
चना, इस का दाँतों पर दुष्प्रभाव	---	---	४२
का टुकड़ा आँख में	---	---	२६४
चूने का पानी बनाने की विधि	---	---	३३६
चूहे और पिस्तू	---	---	२१२-२१४
चूड़ों का विष, प्रति विष	---	---	३२८
चूँचा-संस्थान	---	---	७१
की स्वास्थ्य-रक्षा	---	---	७३
चूड़े से रक्त बहना	---	---	३१३
छोटे बच्चों की देख-रेख	---	---	१३२
अतिसार (दस्त) में	---	---	१४२
जड़, फकड़, जाने वाली बीमारियों का कारण, अधिक प्रोटीन सेवन	---	---	९६
जननेन्द्रियों, पुरुष की, रचना और क्रिया	---	---	८०
स्त्री की, रचना और क्रिया	---	---	८४
इन के रोग	---	---	२५५
जल-चिकित्सा	---	---	१४६
जला हुआ, उत्पत्तरल से चिकित्सा	---	---	३२६
जले हुए का इलाज	---	---	३२४
जाँघ (उर-सन्धि) की पट्टी	---	---	३०३, ३१०
जकाम (सर्दी, ठण्ड) बच्चों को, चिकित्सा	---	---	१७२
की रोक-थाम	---	---	१७२
जलोपत्ती या आम-धात (Hives, Urticaria)	---	---	२५७
ज्वर	---	---	२५८

मोह ज्वर का कारण—ज्वर	---	---	२०९, २११
सिर की	---	---	२५९
जोड़ों में पीड.१, नोठया	---	---	२७६
ज्वर	---	---	१६१
आंत्रिक ज्वर (मोतीझरा)	---	---	१८६
प्रसव ज्वर	---	---	१२३
मलीरिया ज्वर	---	---	२१४
मोह ज्वर	---	---	२०९
थर्मामीटर का प्रयोग	---	---	१६१
झटका, विजली का	---	---	३२१
झिल्लीक-प्रदाह, लक्षण	---	---	१७७
की चिकित्सा	---	---	१७८
झोली, बांह की (Sling)	---	---	३११
टीका	---	---	१८३
ट्रिचिना (Trichina)	---	---	२३३
हिम्ब-ग्रन्थियों के रोग	---	---	२५६
हूबे हूओं की जान बचना	---	---	३२८
तम्बाकू, एक विष है	---	---	९०
से आयु घटती है	---	---	९१
को छेड़ने का उपाय	---	---	९३
और फेकड़ों के नासूर का सम्बन्ध	---	---	९२
से मोदरा-पान की लत	---	---	९१
का मानसिक छवित पर दुष्प्रभाव	---	---	९१
से श्वास-प्रश्वास के अवयवों को क्षति	---	---	४९
का हृदय पर दुष्प्रभाव	---	---	९१
धूमपान की आदत स्त्रियों में	---	---	९१
त्वचा, के घाव	---	---	२६२
की रचना और कार्य	---	---	५५
के रोग	---	---	२५७
थली, गरम पानी की	---	---	१५५
दन्त-स्वास्थ्य	---	---	४१
दवा	---	---	२४८
दर्द, पीठ में	---	---	२७६
वस्तु या अतिसार, नंदा, दूध, और दूध पिलाने की मली बीतल	---	---	१६७
चारा और की गन्दगी (कारण)	---	---	१६६
चिकित्सा	---	---	१६७
बच्चों के	---	---	१४२, १६५

मस्तिष्कयां फैलाती हैं	१६७
चिकित्सा	२०१, २०३, २०४
दुःख, का काम	४१
का दर्द, चिकित्सा	३३४
का मंजन (नुसरवा)	३३४
की रक्षा कैसे करें	४३
सह, हुए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक	४१
दंतोद्भेद से सम्बन्धित रेखा-चित्र	१३४
दाव	२६१
सिर का	२६२
दीर्घायु, के लिए आवश्यक भोजन और व्यायाम	१०८, १०९
के नियम	११०
दूध, अनियमित खान-पान	१६८
ऊपरी	१३८
टीन का दूध और पानी मिलाने की मात्राएं, तालिका	१४०
पिलाने की शीशियां	१४१, १६७
की मात्राएं, विभिन्न आयु के बच्चों के लिए	१४०
दूर की चीज दिखाई देना (Far sight)	२६७
देख-भाल, बच्चों (शिशु) की	२३३
धाय, दूध पिलाने वाली	१३८
नक्कीर छटना	२७५
निःसंक्रमण	१६३
निगल-जाना, वस्तुओं की	२८०
नाक और गले के गंग	२३४
नाह.१ (नयज) देख की रीति	१६३
आयु के अनुसार नाह.१ की रीति	१६२
नासूर	९२, २६९
और मांस	९५
निर्माणिया	२३९
में रोगी का आहार	२४०
की चिकित्सा, विशेष	२४०
के बाद क्षय-रोग लग जाने का भय	२४१
बच्चों का	२४०
की रोक-थाम (प्रतिबन्धक उपाय)	२३९
पट्टियां, पर की, नट्टे की	३१८
घटने की पट्टी	३०४
बांधना (विधियां)	३०१-३०९

बांह के ऊपरी भाग की पट्टी आदि	३११, ३१४
बांह की झोली	३११
पथरी, चिकित्सा	२७६
परजीवी, आंतों के	२२६-२३३
परिभ्रमण-संस्थान	५०
के अवयव	५१
परिवार-नियोजन	१२४
पीरोक्षिट, इस पुस्तक की	३३३
पलस्तर, राई का, निमोनिया में	२४०
पशुओं, द्वारा फैलने वाले रोग	२२६
में रोग	९६
पाइरिया	२७८
पागल कत्ते आदि का काटा, चिकित्सा	३२८
पाचन-संस्थान	३६
के रोग	१९६
पान-सुपारी, शोथकारक	४२
पानी	१४४
कच्चा से बचने रहने के लिए आवश्यक	४१, १९९
पीना, भोजन करते समय	३४
पानी का महत्व	५२, १४४
पीने का महत्व, 'सल्फ' औषधियों का सेवन करते समय	२०६
का प्रयोग, रोग की चिकित्सा में	१४५
गर्म और ठंडे पानी में पीण्डित अंग को डुबा कर चिकित्सा	१५१
पिचकारी, यौनि की	१५३
पूर्वीय क्षय (Oriental Sore)	२१९
पीचिश, चिकित्सा	२०३
पेट में गड़बड़, ऐसी दशा में आहार	१९७, २०३, २०५
पोलियो (शिशु पक्षाघात)	२९२
'केनी' इलाज	२९५
के टीके	२९९
प्रजनन-संस्थान, यान स्वास्थ्य की रक्षा	७९-८७
प्रसव के समय अधिक रक्त-स्राव की चिकित्सा	१२२
प्राकृतिक चिकित्साएं	१४३
प्राथमिक सहायता या चिकित्सा	३०१
प्रोटीन (Proteins)	१४, ९५
फंस, हाथ में या पैर में	३२६
कीता-कृमि (Tapeworms), लक्षण चिकित्सा	२३१, २३२

फील-पांव (Elephantiasis or Filariasis) ----	221
फीसियों के लिए मछम (नसखा) ----	228
फुफ्फुसविरक झिल्ली- प्रदाह (Pleurisy), चिकित्सा ----	241
फेफड़े. ----	44
को धूल से हानि ----	49
को मींदरा से हानि ----	49, 92
के रोग ----	239
फोड़े और त्वचा के घाव ----	262
बगल से खून बहना ----	213
बच्चों की देख-भाल ----	133
का कब्ज ----	182
का खान-पान ----	134-183
को दस्त ----	182, 184
प्रसम बालक ----	132
जब सांस न ले तो क्या करना चाहिये ----	122
सफाई आवश्यक ----	132
बच्चों के रोग ----	164
का निमोनिया ----	280
मूह आना ----	100
बफारा, की विधि ----	128, 236
के लिए तेल ----	236
बहरापन ----	260
बह-मूत्र-रोग (Diabetes) ----	202
बांझपन ----	246
बाल और त्वचा की तेल-गन्धियां ----	40
बिजली का झटका ----	221
बिच्छू का डंक, चिकित्सा ----	220
बेरी-बेरी (Beri-beri) ----	222
बेहोशी या मूर्छा ----	222
बाढ., उचित, बच्चों की ----	103
भोजन, अनूचित, बच्चों के लिए ----	132, 162
का अभिशोषण ----	80
बच्चों का खान-पान ----	134
बनाने की विधि ----	90
में मांस का स्थान ----	94
रोगी का ----	149
में लोहे की प्रचुर मात्रा ----	94

बुद्ध लोगों का	---	---	१०९
के समय पानी आदि पीना	---	---	३४
दो समय के भोजन के बीच अवकाश आवश्यक	---	---	३५
बकिस्त्रियां, लोगों को, बच्चों को, मारती हैं	---	---	१०६, १३४, १६७
बक्खी को दूर रखने के उपाय	---	---	२२०, २२१
बच्छर और मलैरिया	---	---	२१४-२१८
बादरा और तम्बाकू के सेवन से हानि	---	---	३८, ४९, ८८, १९६
बघासार (सुरासार)	---	---	३८
बछम, आंख के लिए	---	---	२६६
खजली के लिए	---	---	२५८
दाद, फंडे, और त्वचा के घाव के लिए	---	---	२६२
फूसियों, छोटो-छोटो, के लिए	---	---	३३४
बवासीर के लिए	---	---	३३४
सूत्र-कर्मियों द्वारा पंदा की खजली के लिए	---	---	२३१
बलैरिया, चिकित्सा	---	---	२१४, २१८
लक्षण और रोक-थाम	---	---	२१६
बलत्ताओं से हानि	---	---	३३, ३४, ३८, ५३
बांस्तण्ड	---	---	७१
महामारी	---	---	२१२
फुफुसीय (Pneumonic)	---	---	२१४
की रोक-थाम	---	---	२१३
के लक्षण, की चिकित्सा	---	---	२१२, २१३
बांस पीछियां	---	---	५८
पीछियों के विकास के लिए व्यायाम	---	---	६०
बांस्तक धर्म, और याबनावस्था	---	---	८६
अधिक रजःस्राव	---	---	२५४
अस्वाभाविक रजोरोध (amenorrhoea)	---	---	२५३
कष्ट-रजता	---	---	२५४
यौन-स्वास्थ्य की रक्षा के सिद्धान्त	---	---	८६
मिनी	---	---	२७७
मिचों से हानि	---	---	३३, ३८, ५३
मिठई का अधिक प्रयोग	---	---	३२
मुँह आना (sore mouth)	---	---	२७४
बच्चों का	---	---	१७०
मुँह से सांस लेना हानिकारक	---	---	४९
मूलासे, चिकित्सा	---	---	२५९, १६०
मोच, चिकित्सा	---	---	३१७

में गट्टे पर पट्टी बांधना	---	---	३१७, ३१८
पोतिया चंचक की चिकित्सा	---	---	१८१
पोतीझरा (ऑप्रिक ज्वर)	---	---	१८६-१९०
की रोक-थाम	---	---	१८९
में रंगी का आहार	---	---	१८७
याँज (Yaws)	---	---	२६३
यूरोट्रोपिन (Urotropin)	---	---	१८९
यौन की पिचकारी	---	---	१५३
यौन-स्वास्थ्य की रक्षा	---	---	८६
यौवनावस्था और भासिक धर्म	---	---	८६
रक्त-छाप, उच्च	---	---	२७९
रक्त और परिभ्रमण के अवयव	---	---	५०-५२
रक्त-स्राव, प्रसव के समय, अधिक	---	---	१२२
रचाँयता	---	---	४६, ५२, १९६, ३३३
रजोरेध, अस्वाभाविक (Amenorrhœa, absence of menstruation)	---	---	२५३
रसोईघर	---	---	९९
रसाली (Tumours)	---	---	२८१
रोग, के कारण	---	---	२६, १०१
कृमियाँ द्वारा फैलने वाले	---	---	२०९
गुप्त	---	---	२५०
चर्म (त्वचा के)	---	---	२५७
डिम्ब-ग्रन्थियों के	---	---	२५६
नाक और गले के	---	---	२३४
पशुओं द्वारा फैलने वाले	---	---	२२६
पाचन-संस्थान के	---	---	१९६
फेफड़ों के	---	---	२३९
बच्चों के	---	---	१६५
बाह्य जननीन्द्रियों के	---	---	२५५
सामान्य, विविध प्रकार के	---	---	२७४
सामान्य संक्रामक	---	---	१७७
स्त्रियों के	---	---	२५३
हीनान्न	---	---	२२२
हृदय	---	---	२७८
पेगी, की सेवा शुरू	---	---	१४३, १५८
का कमरा	---	---	१४३
का भोजन	---	---	१५९
के लिए विश्राम आवश्यक	---	---	१५८

रोहें (Trachoma)	---	---	२६७
लंगह.1-ज्वर, लक्षण और चिकित्सा	---	---	२११-२१२
लू लग जाना, चिकित्सा	---	---	३२७
लोहा, भोजन में	---	---	९५
वजन-(भार), ऊंचाई तथा आयु की तालिकाएं	---	---	१७४, १७५
वायु, स्वच्छ, शरीर के लिए आवश्यक	---	---	४४
वायु-शोधक स्वांस-यंत्र (Respirator) का प्रयोग पौलियो में	---	---	२९७
विकिरण और विस्प्रेट	---	---	२८१
विटामिन, कहाँ मिलते हैं	---	---	२२४
वीर्य-स्खलन	---	---	८०
विश्राम, रोगी के लिए आवश्यक	---	---	१५८
विष खा लेना, कार्बोलीक एसिड	---	---	३२७
सीखिया या चूहों का	---	---	३२८
की चिकित्सा	---	---	३२८
वृक्क (गुदे)	---	---	५३
पर शराब, तम्बाकू, मिर्च-मसालों का दूष्प्रभाव	---	---	५३
व्याभिचार	---	---	८३
व्यर्थ (सारहीन) पदार्थ, शरीर द्वारा उत्सर्जित	---	---	५३
व्यायाम (कसरत)	---	---	६०-७०, १०९
क्षीत बटाने के लिए भोजन; व्यायाम	---	---	६३; ९४
शराब (सुरासार) का शरीर पर दूष्प्रभाव	---	---	३८, ८८, १९६
मीदरा का मौस्तष्क पर दूष्प्रभाव	---	---	८१
मीदरा का मौस्तष्क पर दूष्प्रभाव	---	---	३३, ८८
मीदरा से श्वास-प्रश्वास के अवयवों के हानि	---	---	४९
शरीर, के अंगों का रेखा-चित्र	---	---	२९
के तीन मुख्य भाग	---	---	२८
को रगड़ना, दस्ताना पहने हाथ को ठंडे पानी में भिगो कर	---	---	१५२
शरीर-रूपी मन्दिर	---	---	३३१
शाकाहार	---	---	९५
शीतला (Smallpox)	---	---	१८१
की चिकित्सा	---	---	१८२
का टीका	---	---	१८३
के लक्षण	---	---	१८२
श्वास-गति, प्रसम	---	---	१६२
श्वास-प्रश्वास	---	---	४४
के अवयव, इन्हें मीदरा और तम्बाकू से हानि	---	---	४४, ४९
गलत तरीके (रीति) से सांस लेने का दूष्प्रभाव	---	---	४८

सं सम्बन्धित महत्वपूर्ण बातें	४७
श्वेत प्रदर (सफेद पानी)	२५५
संकीर्णत घाव, की चिकित्सा	३०५, ३१३
संक्रामक रोग, सामान्य	१७७
संयम (Continence); (Temperance)	८२, १०९
सफेद पानी (श्वेत प्रदर)	२५५
सांप का काटा (सर्प दंष्ट्रा)	३२६
सांस लेना, मुंह से, हानिकारक	४९
सिर दर्द, की चिकित्सा	१५१
सिर की पीट्टियां	३०८-३०९
सिरका, जूओं के लिए	२५९
सिरके का प्रयोग आंख में पड़ने के लिए	२६४
सिरके और नमक मिले पानी से अंगोछना	१५७
स्त्रियों के रोग	२५३
सीधे बैठने और खड़े होने का महत्व	४७, ४८, ६०
सृष्टि के कार्य	७३
सूइयां (Injections)	२९१
सूघने की एक सस्ती दवा	३३५
सूखे का रोग, बच्चों को	१७१
सूजाक (पुष्पमह)	२५०
सूत्र-कृमि (Threadworms), चिकित्सा	२३१
सूर्यप्रकाश, स्वास्थ्य के लिए	१४३
संकेत, पंखों में पानी की	१५०
वास्तविकता के अवयवों के लिए, पानी की	१५१
संकेत, आर्द्र (Fomentations)	१४६
सर्प वर्ष तक कैसे जीवित रहे	१०८
स्नान की आवश्यकता, रोगी के लिए	१६३
स्वास्थ्य के छः नियम	३०
का मूल्य	२५
हीड्रियां और मांस पौष्टिकां	५८
टूटी हुई, चिकित्सा	३१७
हड्डी उखलना	३२१
हाथ की पीट्टियां	३०६-३०७
हिचकियां	२७५
हृदय और रक्त वाहिनीयों	५०
रोग	२७८
हंजा, निदान और चिकित्सा	१९०-१९३

परिचारिका के लिए अधिसूचनाएं	----	----	१९३
से बचने के उपाय	----	----	१९४
बच्चों में	----	----	१९१
के लक्षण	----	----	१९०
स्थ-मथन	----	----	८२

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध रूप जो छपा है	शुद्ध रूप जो होना चाहिये
१३३	१२	झीतल	झीतला
१३४	१ (चित्र का शीर्षक)	दत्तादभरे	दत्तादभेद
	७	सप्राह	सप्रह
१३८	३	चुचली	कचली
१३९	२०	'प्रटीन'	'प्रोटीन'
१४१	१४	पेढे,	पेढ़े,
१४४	३	बिछने	बिछने
१४५	१२	स्कली	सकली
१४६	१२	बच्चों के लगने की	बच्चों के दस्त लगने की
१७१	१४	अरंडी	अरंडी
१७२	१२	या बढे, हए जाना	या बढे, हए
१७३	२	वीद्ध की	वीद्ध के
१७३	६, १२	की, कर्मार्थ, में	को, कर्मार्थ, 'में' नहीं होना चाहिये
१७६	६, २८	पंपाने, कीशारा-	पंपाने, किशारा-
१७७	२१	लगने दो दिन	लगने के दो दिन
१७८	२१	से	सी
१७९	६, ९	पोंछते, अच्छा न जाए	पोंछते, अच्छा न हो जाए
१८०	८	खतनाक	खतरनाक
१८३	६, ३०,	जीनर, "तरल अद्ध",	जेनर, "तरल या अद्ध",
१८३	३२	बेलाडेना	बेलाडेना
१८९	१, ३४	आँद, मक्खों	आँद, मक्खियों
१९१	२३	टंगा	टंगों
१९२	३, ५	एठन	एठन
१९५	३	ने	न
१९७	२२	भोजना	भोजन
१९७-	दाहिने पृष्ठ पर सब	सामान्य संक्रामक रोव	पाचन संस्थान के रोव
१०९	से ऊपर		
२०२-	बाएँ पृष्ठ पर सब	स्वास्थ्य और जीवन	स्वास्थ्य और दीर्घायु
२४८	से ऊपर		
२००	अन्तिम	वीर्णत	वीर्णत
२०१	९	हालिये	हालिये
२०४	२८	'केप्सुल्स'	'केप्सुल्स'
२१४	५	अञ्जका	आञ्जका
२१६	८, १६	विकसित, पालइय	विकसित, पालिय
२१८	२१	कल	कल
२२०	११, २७	पुर्वीय क्षन, हानिकारक होता	पुर्वीय क्षय, कृमियों के दूर रखना

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध रूप जो छपा है	शुद्ध रूप जो होना चाहिये
२२३	२४	एँठन	एँठन
२२६	२३	एपस-साल्ट	एपसन-सॉल्ट
२२७	२०	बिल्लियों	बिल्लियों
२२९	२३	टीट्यों	टीट्यों
२३०	१९	दिखाया	दिखाया
२३२	५	जाएगा	जाएगा
२४३	२७	कबडें	कबडें
२४४	७	फैलाता	फैलाता
२४८	३२	पकवान	पकवान
२५१	१, १४	गोलियां, गर्भशय	गोलियां, गर्भाशय
२५२	७, १७	शरिर, घरेलू (पृष्ठ २५४, २६० पर भी)	शरीर, घरेलू
२५३	१८	रजःस्रव	रजःस्राव
२५४	१६, १७	गर्भभात, रह जाता है	गर्भपात, रह जाते हैं
२५६	१४, अन्तिम	डिम्ब-ग्रन्थियों, हो सकता	डिम्ब-ग्रन्थियों, हो सकता है
२६४	४	प्रयत्न	प्रयत्न
२७०	२	सकती	सकता
२७१	६, १४, १६	उपस्थित, काणों, कारणां	उपस्थित, काणों
२७२	७	भारता	भरता
२७३	३४	घरेलू	घरेलू
२८३	९, ३१,	घटानाएँ, होती	घटानाएँ, होती हैं,
२८३	३२	तात्कालित	तात्कालिक
२८४	९, १७,	जागरूक, दूसरों,	जागरूक, दूसरों,
२८४	२१, ३४	आकीर्णित, अवरोध	आकीर्णक, अवरोध पर
२८५	२७	विस्फोट	विस्फोट
२८६	९	प्रतीक्षा	प्रतीक्षा
२८८	१९	वह	'वह' नहीं होना चाहिये
२८९	६, ३०	मिनटों, जाच	मिनटों, जांच
२९४	२१, अन्तिम	प्रकट, तुरंत	प्रकट, तुरंत
२९६	७, १९	आ जा, क्यों ---	आ जाता, क्यों --- पर
३००	३	हो जाती	हो जाती है।
३२२	१३, १५	चिंह, दोनों	चिह्न, दोनों
३३१	१४, २६	सर्वदा, प्रकृतिक	सर्वदा, प्राकृतिक
३३५	२८	सकती	सकता
गुलाबी	८, १९, २०	अंगछना;	अंगोछना: पंक्तियों का
पृष्ठ			क्रम गलत है
३४३	२५	देख की	देखने की

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० २६ १

लेखक एन. एम.

संलग्न, श. २०००